MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

3 L

INVENTAIRES
DE FAUNE ET DE FLORE

FASCICULE 30 ANNEE 1986

ODILE MOUSSIEGT

ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION
DU LITTORAL MEDITERRANEEN

MOUSTIQUES DE FRANCE

BIBLIOGRAPHIE ET REPARTITION

SECRETARIAT de la FAUNE et de la FLORE

PARIS

Source : MNHN, Paris

Source : MNHN, Paris

MOUSTIQUES DE FRANCE

BIBLIOGRAPHIE ET REPARTITION

Bibliothèque Centrale Muséum
3 3001 00055588 7
Source : MNHN, Paris

Source : MNHN, Paris

Ent 4/26

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

INVENTAIRES
DE FAUNE ET DE FLORE

FASCICULE 30 ANNEE 1986

ODILE MOUSSIEGT

ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA DEMOUSTICATION
DU LITTORAL MEDITERRANEEN

MOUSTIQUES DE FRANCE

BIBLIOGRAPHIE ET REPARTITION

ILLUSTRATIONS DE J. SALGADO



BIBL. DU MUSEUM PARIS

SECRETARIAT de la FAUNE et de la FLORE

PARIS

Source : MNHN, Paris

Edité par le SECRETARIAT DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

Service scientifique national associé par convention permanente au
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

dans la collection : "Inventaire de faune et de flore"

Directeur de la Publication : François de BEAUFORT
Secrétaire de Rédaction : Hervé MAURIN

Comité Permanent du Secrétariat de la Faune et de la Flore

J. ALLARDI, G. BERNARDI, Président, J.-P. GASC, J.-M. GEHU, G. JARRY
J.-C. LEFEUVRE, J.-P. LUMARET, L. OLIVIER, P. QUEZEL, M. RICARD.

Diffusé par la SOCIETE POUR L'INVENTAIRE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
c/o Secrétariat de la Faune et de la Flore

Copyright (C) 1986 by Secrétariat de la Faune et de la Flore
Museum National d'Histoire Naturelle
57, rue Cuvier - 75231 Paris Cédex 05

ISSN 0246 - 3881
ISBN 2 - 86515 - 025 - 9

Dépôt légal 1986 - I

Edité en mars 1986

Source : MNHN, Paris

SOMMAIRE

Avant propos II

Conseils d'utilisation III

NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 1

INDEX

Index des espèces 65

Aedes 65

Anopheles 84

Coquillettidia 95

Culex 97

Culiseta 107

Orthopodomyia 114

Uranotaenia 115

Index géographique 117

Index-matières 157

Le paludisme : répartition par région 160

Index des auteurs 161

Annexe cartographique 175



Source : MNHN, Paris

AVANT PROPOS

Depuis sa création, le Service de Documentation de l'Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen s'est efforcé de recenser la littérature traitant des moustiques de notre région, soit environ les deux tiers des espèces présentes en France métropolitaine. Depuis quelques années, les questions que nous ont posé nos collègues de l'E.I.D.L.M. et, surtout, des chercheurs tant français qu'étrangers, nous ont conduit à rechercher des documents portant sur d'autres espèces présentes en France ainsi que des textes plus anciens et/ou moins connus. Nous avons donc décidé de recenser, le plus exhaustivement possible, ce qui avait été publié sur les moustiques français et les maladies qu'ils transmettent ou qu'ils ont transmises par le passé. Nous y avons inclus la littérature traitant des luttes biologique, génétique et physique mais nous n'avons retenu, dans le cadre de la lutte chimique, que les documents donnant des informations sur les sensibilités de base aux insecticides et sur les résistances existant chez certaines espèces. Ce document est le résultat de cette recherche (dernières entrées : juin 1984).

Ce travail n'aurait pû être mené à bien sans l'aide de nombreux chercheurs, en particulier les professeurs MOULINIER, QUILICI et RIOUX, documentalistes et bibliothécaires que nous avons largement mis à contribution pour nous procurer ou consulter certains documents anciens et/ou peu accessibles.

Nous tenons à remercier tout particulièrement le personnel de la Bibliothèque Universitaire-Section Médecine de Montpellier qui, pendant près d'un an, nous a régulièrement et patiemment aidé dans nos recherches.

Malgré cela notre bibliographie n'est pas complète. Nous avons trouvé, surtout dans des textes anciens, mention de personnes ou de documents dont nous n'avons pas réussi à retrouver la trace faute de références même assez vagues. Nous serions infiniment reconnaissante à toute personne ayant connaissance de documents que nous aurions omis de bien vouloir nous les signaler.

O.MOUSSIEGT
Documentaliste

Source : MNHN, Paris

CONSEILS D'UTILISATION

Cette bibliographie est composée de 1226 notices bibliographiques et de quatre index : espèces, répartition géographique, matières et auteurs.

LES NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES

Pour certains documents que nous n'avons pu consulter, les références ne sont pas toujours très complètes mais devraient l'être suffisamment pour que l'on puisse éventuellement les retrouver.

Certains articles ont été publiés plusieurs fois dans diverses revues; nous les avons tous mentionnés de telle sorte que la personne intéressée ait plus de chance de les retrouver.

Les notices sont classées par ordre alphabétique des noms d'auteurs. Quand l'auteur a produit plusieurs documents, nous avons regroupés ceux-ci en trois groupes : l'auteur est seul signataire (ordre chronologique), puis viennent les notices des documents pour lesquels il y a deux auteurs (ordre alphabétique au deuxième nom d'auteur puis ordre chronologique) et, enfin, celles ayant trois auteurs ou plus (ordre chronologique uniquement).

Par souci d'uniformisation, les noms d'auteurs comportant la particule "van" (van Gaver et van Thiel) ont été classés à la lettre "V".

Chaque notice est précédée d'un numéro d'ordre; c'est ce numéro qui est utilisé dans les index.

LES INDEX

Nous avons volontairement multiplié leur nombre afin d'essayer de répondre à toutes les questions que l'on peut se poser sur les moustiques recensés en France.

- les espèces présentes en France,
- leur répartition,
- les sujets étudiés,
- les chercheurs les ayant étudiés.

Source : MNHN, Paris

Index des espèces

En ce qui concerne la nomemclature (et les synonymies) nous avons suivi celle de Knight et Stone ("A catalog of the mosquitoes of the world (Diptera: Culicidae)" et ses deux suppléments), en particulier pour les membres du complexe Anopheles maculipennis. Dans les documents anciens, le nom des espèces décrites ou étudiées nous a parfois posé de sérieux problèmes de synonymie; il n'a pas toujours été possible de les rattacher à des espèces connues. En règle générale, nous n'avons conservé que celles auxquels des chercheurs ont fait ultérieurement référence.

Aedes aegypti n'étant pas une espèce autochtone nous ne l'avons pas retenu dans cet index. Elle apparaît toutefois dans l'index géographique puisqu'elle a été rencontrée, à diverses reprises, dans certains ports français.

Cet index est présenté sous forme de tableaux (un par espèce) classés par ordre alphabétique de genre et, à l'intérieur de chacun d'eux, d'espèce. Pour chacune d'elles, nous avons mentionné :

- le (ou les) département(s) où elle a été trouvée,
- les données générales sur l'espèce,
- pour chacun des quatre stades (oeuf, larve, nymphe, adulte) les principaux sujets traités,
- un récapitulatif de tous les documents mentionnant l'espèce.

Index géographique

Il est présenté sous forme de tableaux, un par département. Les six départements de la région parisienne (Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise) ont été regroupés dans le dernier tableau, les textes anciens ne permettant pas, dans un certains nombre de cas de faire une répartition plus précise. Chaque tableau donne la liste des espèces recensées et un récapitulatif des textes mentionnant des moustiques dans le département.

La répartition départementale de chaque espèce est présentée en fin d'ouvrage ; ces cartes reprennent et complètent le document de J. RAGEAU et coll. (notice n°773).

La répartition géographique du paludisme par région a été placée en annexe de l'index-matières

Source : MNHN, Paris

Index-matières

Il se présente sous la forme d'une liste alphabétique de descripteurs. Le nombre de documents concernant le paludisme humain étant très important, nous donnons, en annexe à cet index, une répartition par région.

Index des auteurs

Il se présente sous la forme d'une liste alphabétique. Les noms comportant la particule "van" ont été classés à la lettre "V" (van Gaver et van Thiel).



Source : MNHN, Paris



Source : MNHN, Paris

NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES

Source : MNHN, Paris



Source : MNHN, Paris

1. ... .- Etude clinique, thérapeutique et prophylactique du paludisme dans la XVe région .- Paris méd., 1917, 25 (44) 387-388.

2. ... .- Les moustiques .- J. Méd. int., Par., 1902, 6 : 140.

3. ABATUCCI (S.) .- Le paludisme dans ses rapports avec la situation économique de la Corse .- Bull. Soc. Path. exot., 1922, 15 : 92-98.

4. ABATUCCI (S.), ABATUCCI (C.) .- La solution la plus approchée de l'extinction du paludisme en Corse .- Bull. Soc. Path. exot. 1923, 16 (7) 485-490.

5. AIN (G.), PAUTOU (G.) .- Etude écologique du marais de Lavours (Ain) .- Doc. Carte Végét. Alpes, 1969, 7, 25-64, 1 carte h.t.

6. AIN (G.), RISS .- Moustiques des bords du Rhône .- Bull. Soc. nat. Archéol. Ain, 1970, 84 : 57-60.

7. AIN (G.), PAUTOU (G.), VIGNY (F.) .- Documents sur l'utilisation de la carte écologique dans la lutte contre les moustiques du genre Aedes de la région Rhône-Alpes .- Doc. Carte Végét. Alpes, 1969, 7, 65-71, 1 carte h.t.

8. AIN (G.), GILOT (B.), NEUBURGER (M.C.), PAUTOU (G.), TETART (J.), THOMAS (J.) .- Etude écologique des anciens lits du Rhône entre le confluent du Guiers et le confluent de l'Ain .- Grenoble, Université Scientifique et Médicale , 1973, 73 p., 2 cartes h.t.

9. AIRIEAU (L.) .- Etude historique, humaine et écologique du marais Poitevin .- Bordeaux, Faculté de Médecine, 1977 : 76 p. (thèse)

10. AITKEN (T.H.G.) .- The Culicidae of Sardinia and Corsica (Diptera) .- Bull. ent. Res., 1954, 45 (3) 437-494.

11. ALINAT (A.) .- Le danger du paludisme importé (A propos des réveils récents du paludisme autochtone) .- Montpellier, Faculté de Médecine, 1921 : 42 p. (thèse).

12. ALLAIN (G.) .- Recherches préliminaires à l'étude de la faune entomologique estivale des marais salants de la presqu'île de Guérande .- Nantes, Faculté des Sciences, 1967 (D.E.S. Sciences Naturelles).

13. ALLUAUD (C.) .- Matériaux pour l'étude de la faune entomologique du Limousin (Creuse, Haute-Vienne, Corrèze) .- Mém. Soc. Sci. nat. Archéol. Creuse, 1919, 29 (1) 41-48.

14. AMBIT (D.), DANTAGNAN (A.), SIMONNEAU (P.), VOELCKEL (C.) .- Les Sagnes de l'étang de Salses. Observations phyto-écologiques. Campagne 1970 .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1970, Doc. E.I.D. n°16 : 44 p., 4 cartes h.t.

15. AMBIT (D.), DANTAGNAN (A.), SIMONNEAU (P.), VOELCKEL (C.) .- Les Sagnes de l'étang de Salses. Observations phyto-écologiques. Campagne 1969 .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1969 , Doc. E.I.D. n°14 : 28 p., 1 carte h.t.

16. AMBIT (D.), DANTAGNAN (A.), SIMONNEAU (P.), VOELCKEL (C.) .- Les Sagnes de l'étang de Salses. Observations phyto-écologiques. Campagne 1971 .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1971, Doc. E.I.D. n°17 : 32 p., 4 cartes h.t.

17. AMBROISE-THOMAS (P.), QUILICI (M.), RANQUE (P.) .- Réapparition du paludisme en Corse. Intérêt du dépistage séro-épidémiologique .- Bull. Soc. Path. exot., 1972, 65 (4) 533-542.

18. AMOREUX (P.J.) .- Notice sur les insectes de France réputés venimeux, tirée des écrits des naturalistes, des médecins et de l'observation .- Paris, 1789 : 302 p., 2 pl. h.t.

Source : MNHN, Paris

19. AMOURIQ (L.).-Formules hémocytaires de la larve, de la nymphe et de l'adulte de Culex hortensis .- Bull. Soc. ent. France, 1960, 65 (5/6) 135-139.

20. ANDRIEU (J.), DOLL (J.), GARDON (J.D.) .- Paludisme autochtone à Plasmodium falciparum et foie palustre .- Sem. Hôp. Paris, 1982, 58 (32) 1827- 1829.

21 ANTONETTI (M.) .- Lutte contre le paludisme en Corse .- Alger, Faculté de Pharmacie, 1951 (thèse).

22. ANTONIOTTI (J.P.) .- Le paludisme. Prophylaxie individuelle .- Paris, Steinheil ed., 1901 : 45 p.

23. ARNAUD (J.D.), RIOUX (J.A.), CROSET (H.), GUILVARD (E.) .- Aedes (Ochlerotatus) surcoufi (Theobald, 1912). Rétablissement du binôme; analyse morphologique; position au sein du complexe holarctique "excrucians" .- Annls Parasit. hum. comp., 1976, 51 (4) 477-494.

24. ARRIGHI (M.F.) .- Deux cas de mégalérythème infectieux épidémique d'origine virale vraisemblable (arbovirose à Tahyna) .- Bull. Soc. fr. Dermatol. Syphil., 1969, 76 (3) 477-479.

25. ASTROS (L. d') .- La défense contre le paludisme dans les Bouches-du-Rhône .- Marseille méd., 1919, 56 (11) 481-493.

26. ATGER (E.) .- Le paludisme dans la région languedocienne autrefois et aujourd'hui .- Montpellier, Faculté de Médecine, 1931 : 55 p (thèse).

27. AUBERT (P.) .- Discussion sur le paludisme .- Mém. Acad. Sci. Belles-Lettres Arts Lyon, 1907, 9 : 341-366.

28. AUBERTOT (M.) .- Recherches sur les péritrophiques des insectes et en particulier des Diptères .- Nancy, Faculté des Sciences, 1934 : 357 p. (thèse).

29 AUDIBERT-CAILLE DU BOURGET (d') .- Quelques observations sur le paludisme en Corse .- Arch. Méd. Pharm. milit., 1909, 53 : 255.

30. AUVERGNAT (J.C.), MASSIP (P.), ARMENGAUD (M.) .- Actualité du paludisme autochtone à Plasmodium falciparum : à propos d'une observation .- Rev. méd. Toulouse, 1979, 15 : 369.

31. BABAULT (G.) .- Observations sur l'adaptation zoophile des Anophèles en Savoie .- Bull . Soc. Path. exot., 1921, 14 (9) 564-566.

32. BABINOT (M.) .- Promontoir oriental du grand Rhône (embouchure). Etude de la végétation et cartographie écologique des aires culicidogènes à Aedes (O.) caspius en milieu instable .- Marseille, Faculté des Sciences et Techniques St. Jérome, 1982 : 226 p., 1 pl. coul. (thèse d'Université).

33. BAIN (O.) .- Développement en Camargue de la filaire du chien, Dirofilaria repens Railliet et Henry, chez les Aedes halophiles .- Bull. Mus. natn. Hist. nat., Zool., 1978, 510 (351) 19-27.

34. BALARD (G.) .- Un ennemi naturel du moustique .- Gaz. hebd. Sci. méd. Bordeaux, 1921, 42 (30) 359-360.

35. BASTOS (R.) .- Contribution à l'étude de l'action du pH sur la phase larvaire des moustiques. Conséquences morphologiques sur la larve, la nymphe et l'adulte .- Alger, Faculté de Médecine, 1938 : 100 p. (thèse).

36. BATTESTI (F.) .- Observations sur la paludisme en Corse .- C.R. Ass. Avancement Sci., 1901, 30-1 : 177-178.

37. BAUDE (J.E.) .- Le paludisme dans le nord de la France depuis la guerre .- Lille, Leblanc et Duiant, 1923 : 46 p. (thèse).

Source : MNHN, Paris

38. BAUDIERE (A.), DALIBON (L.), SIMONNEAU (P.) .- Les marais d'Olonne. Etude phyto-écologique .- Office Interdépartemental de Lutte contre les Moustiques et les Nuisances pour le Littoral Atlantique, (1974?) : 56 p.

39. BAUDIERE (A.), DALIBON (L.), MAS (J.P.), SIMONNEAU (P.) .- La végétation des marais noirmoutrins et ses relations avec les aires culicidogènes .- Vie Milieu, 1974, 24 (1C) 43-64.

40. BAUDOUIN (M.) .- Fièvre intermittente et moustiques en Vendée : chessons et chessaie .- Gaz. méd. Paris, 1904, 4 (33) 385.

41. BEAUCHAMP (P. de) .- Notes faunistiques : quelques organismes des eaux salées continentales .- Bull. Ass. philomath. Alsace-Lorraine, 1930, 7 : 351-354.

42. BEAUCOURNU (J.C.), MATILE (L.) .- Contribution à l'inventaire faunistique des cavités souterraines de l'ouest de la France .- Annls Spéléol., 1963, 18 (3) 343-357.

43. BELMONTE (A.) .- Contribution à l'étude de la biologie de Culicides vecteurs Aedes (O.) caspius (Pallas, 1771), Aedes (O.) detritus (Haliday, 1833), Culex (C.) pipiens Linné, 1758. Standardisation de l'alimentation larvaire en laboratoire .- Montpellier, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, 1982 : 81 p. (D.E.S. Biologie animale).

44. BELS (J.) .- A propos de quelques cas récents de paludisme autochtone dans la région lilloise .- Lille, Faculté de Médecine, 1947 : 56 p. (thèse).

45. BENECH (J.) .- Paludisme autochtone. Deux cas dont une forme anormale .- Rev. méd. Est, 1923, 51 : 122-124.

46. BENTATA-PESSAYRE (M.), SCHNURMANN (D.), KRIVITZKY (A.), CALLARD (P.), DELZANT (G.) .- Paludisme autochtone et foie palustre. A propos d'une observation .- Bull. Soc. Path. exot., 1978, 71 (6) 417-422.

47. BERGER (A.), CHAMPEAU (A.), GABINAUD (A.), GUILVARD (E.), HEIM (G.), PASTEUR (N.), POINSOT-BALAGUER (N.), RIOUX (J.A.), VERDIER (J.M.) .- Réponses des végétaux et des invertébrés au régime hydrique et aux variations de la salinité dans les communautés halophiles de Camargue .- Terre Vie, 1979, (suppl. 2) 191-217.

48. BERNARD (A.) .- Deux cas de paludisme autochtone .- Progrès méd., 1917 (49) 429-441.

49. BERNARD (A.), ZEGHERS (A.) .- Sur un cas de paludisme autochtone .- J. Sci. méd. Lille, 1939, 57 (1) 37-38.

50. BERNER (L.) .- Le peuplement du bassin ornemental au Palais de Longchamp .- Bull. Mus. Hist. nat. Marseille, 1968, 28 : 205-211.

51. BERNER (L.) .- Liste des moustiques provençaux (avec figures) .- Bull. Mus. Hist. nat. Marseille, 1974, 34:285-296.

52. BERTHEZ (G.) .- Cartographie écologique et démoustication .- Montpellier, Faculté de Médecine, 1962 : pag. mult. (thèse).

53. BERTHEZ (M.) .- Contribution à l'étude de quelques procédés de lutte anticulicidienne .- Montpellier, Faculté de Médecine, 1962 :pag. mult. (thèse).

54. BIGOT (M.J.) .- Trois Diptères nouveaux pour la Corse .- Annls Soc. ent. Fr., 1861, 1 (4) 227-229.

55. BIZARD .- Paludisme autochtone dans la région nazairienne .- Annls Hyg. publ. industr. soc., 1935, 13 : 505-512.

56. BIZARD .- Paludisme autochtone dans la région nazairienne .- C.R. Ass. Avancement Sci., 1935, 59 : 397-400.

Source : MNHN, Paris

57. BLANCHARD (C.) .- Sur un nouveau type larvaire du groupe des Anophélinés .- Bull. Soc. Path. exot., 1918, 11 (7) 669-676.

58. BLANCHARD (E.) .- (Les Culicides) Métamorphoses, moeurs et instincts des insectes Paris, Germer Baillière, 1868 : 637-641.

59. BLANCHARD (R.) .- Les moustiques de Paris, leurs méfaits, mesures de prévention .- Arch. Parasit., 1901, 4 (4) 615-635.

60. BLANCHARD (R.) .- Les moustiques de Paris, leurs méfaits, mesures de prévention .- Bull. Acad. Méd., 1901, 46 : 223-243.

61. BLANCHARD (R.) .- Observations sur quelques moustiques .- C.R. Soc. Biol., 1901, 53 : 1045-1046.

62. BLANCHARD (R.) .- Nouvelle note sur les moustiques. I. Sur quelques moustiques de France .- C.R. Soc. Biol., 1902, 54 : 793-795.

63. BLANCHARD (R.) .- Les moustiques, histoire naturelle et médicale .- Paris, F. de Rudeval, 1905, 673 p.

64. BLANCHARD (R.) .- L'assainissement de la Corse .- Gazette Hôpitaux, 1911 : 1015-1024.

65. BLANCHARD (R.) .- Danger du paludisme en France et moyens de l'éviter .- Bull. Acad. Méd., 1917, 77 (21) 657-669.

66. BLATGER (J.) .- Observations écologiques et étude biométrique des races de Culex pipiens L. (sensu lato) dans la région toulousaine .- Toulouse, Université Paul Sabatier, 1974, 135 p. (thèse 3e cycle).

67. BLATGER (J.), LARROUY (G.) .- Obtention de morphogrammes aberrants dans une souche de Culex pipiens autogenicus .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1975, 111 (1/2) 39-43.

68. BOESIGER (B.) .- Comparaison de plusieurs caractères en fonction du degré de consanguinité chez Culex pipiens .- Arch. Genetik, 1978, 51 : 193-216.

69. BOESIGER (B.) .- Effets de la consanguinité sur les caractères morphologiques quantitatifs chez Culex pipiens autogenicus Roub. .- Genetica, 1982, 59 : 99-111.

70. BOISSEZON (P. de) .- Tumeur mycélienne chez Culex pipiens L. .- Bull. Soc. zool. France, 1929, 54 : 297-300.

71. BOISSEZON (P. de) .- Remarques sur les conditions de la reproduction chez Culex pipiens L. pendant la période hivernale .- Bull. Soc. Path. exot., 1929, 22 : 549-553.

72. BOISSEZON (P. de) .- Expériences au sujet de la maturation des oeufs chez les Culicidés .- Bull. Soc. Path. exot., 1929, 22 : 684-688.

73. BOISSEZON (P. de) .- Contribution à l'étude de la biologie et de l'histo-physiologie de Culex pipiens .- Arch. Zool. exp. gén., 1930, 70 (4) 281-431.

74. BOISSEZON (P. de) .- Sur l'histologie et l'histophysiologie de l'intestin de la larve de Culex pipiens L. .- C.R. Soc. Biol., 1930, 103 : 567-568.

75. BOISSEZON (P. de) .- Sur l'histologie et l'histophysiologie de l'intestin de Culex pipiens L. (imago), et en particulier sur la digestion du sang .- C.R. Soc. Biol., 1930, 103 : 568-569.

76. BOISSEZON (P. de) .- Influence de la température sur la biologie des Culicidés .- Bull. Soc. zool. France, 1930, 55 : 255-261.

77. BOISSEZON (P. de) .- Les réserves dans le corps gras de "Culex pipiens L." et leur rôle dans la maturation des oeufs .- C.R. Soc. Biol., 1930, 103 : 1232-1233.

Source : MNHN, Paris

78. BOISSEZON (P. de) .- Le rôle du corps gras comme rein d'accumulation chez Culex pipiens et Theobaldia annulata .- C.R. Soc. Biol., 1930, 103 : 1233-1235.

79. BOISSEZON (P. de) .- L'hibernation conditionnelle chez Theobaldia annulata Schr. .- Annls Parasit. hum. comp., 1932, 10 : 494-497.

80. BOISSEZON (P. de) .- Localisation du glycogène et du fer chez Culex pipiens L. .- C.R. Soc. Biol., 1932, 111 : 866-867.

81. BOISSEZON (P. de) .- L'accélération des multiplications cellulaires et de la phagocytose sous l'action de l'élévation de la température chez Culex pipiens L. .- Bull. Soc. zool. France, 1933, 58 : 384-388.

82. BOISSEZON (P. de) .- De l'utilisation des protéines et du fer d'origine végétale dans la maturation des oeufs chez Culex pipiens L. .- C.R. Soc. Biol., 1933, 114 : 487.

83. BOISSEZON (P. de) .- Nouvelles expériences sur la biologie de Culex pipiens L. .- Annls Parasit. hum. comp., 1934, 12 (3) 182-192.

84. BONDET .- La remise en eau des étangs de la Dombes et la malaria .- C.R. Ass. Avancement Sci., 1906, 35-1 : 339.

85. BONNIN (H.), MORETTI (G.F.), LEPROUX (P.H.) .- Le paludisme autochtone en Charente-Maritime .- J. Méd. Bordeaux, 1952, 129 (10) 918-923.

86. BORDES (S.) .- Les Culicidae de la ville de Toulouse. Quelques suggestions sur les moyens de lutte .- Toulouse, Faculté de Médecine, 1960, 32 p. (thèse).

87. BOU (C.) .- Faune souterraine du sud-ouest du Massif Central. I. Contribution à la connaissance des invertébrés cavernicoles .- Annls Spéléol., 1966, 21 (3) 689-706.

88. BOUCHET (C.) .- Systématique, biologie naturelle et expérimentale des moustiques de la région bordelaise .- Montpellier, Faculté de Médecine, 1957, 115 p. (thèse).

89. BOUISSET (L.), SICART (M.) RUFFIE (J.) .- Etude de la résistance des Culicides de Corse aux insecticides de contact .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1960, 95 (3/4) 303-320.

90. BOUISSET (L.), SICART (M.), RUFFIE (J.) .- Les Culicinés de l'agglomération toulousaine .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1961, 96 (1/2) 33-39.

91. BOUISSOU, PERRIN .- Un cas de paludisme autochtone .- Archs Méd. Pharm. milit., 1921, 75 : 391-392.

92. BOUREE (P.) .- Le paludisme en France hier et aujourd'hui .- Vie méd., 1981, 62 (15) 1053-1062.

93. BOYER (J.), CORRE (L.) .- La lutte contre les moustiques sur les aérodromes d'Orly et du Bourget .- Annls Hyg. publ. industr. sociale, 1950, 28 (6) 278-285.

94. BOYER (M.) .- La malaria et l'assainissement du littoral corse .- C.R. Ass. Avancement Sci., 1901, 30-1 : 952.

95. BREGOU (M.) .- Trois cas d'infection paludéenne autochtone .- Annls Biol. clin., 1944, 2 (4) 89.

96. BRELET (G.) .- Un cas récent de paludisme dans les Dombes .- Lyon, Faculté de Médecine, 1911, 55 p. (thèse).

97. BRESSLAU (E.) .- Beitrage zur Kenntnis der Lebenweise unserer Stechmücken .- Biol. Zentralblatt, 1917, 37 (11) 507-531.

98. BRIDE (M.), ANTONI (P.) .- Influence de l'assèchement sur le développement des larves d'Aedes mariae et de Culex pipiens .- Méd. trop., 1947, 7 (4) 347-349.

Source : MNHN, Paris

99. BRÖLEMANN (H.W.) .- Sur quelques Culex des Pyrénées et description d'une espèce nouvelle I. Campagne 1917 .- Annls Soc. ent. France, 1918, 87 (8) 425-440.

100. BRÖLEMANN (H.W.) .- Sur quelques Culex des Pyrénées. II. Campagne 1918 .- Annls. Soc. ent. France, 1919, 88 : 65-103.

101. BRÖLEMANN (H.W.) .- Sur quelques Culex des Pyrénées. III .- Annls Soc. ent. France, 1920, 89 : 51-73.

102. BRÖLEMANN (H.W.) .- Encore un mot sur les Culicides (Dipt.) .- Bull. Soc. ent. France, 1920, (16) 269-272.

103. BRONDEL (F.) .- Etude de l'autogenèse et de la sténogamie des populations naturelles du moustique Culex pipiens (Linné, 1758) dans la région de Montpellier .- Montpellier, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, 1975, 27 p., 8 pl. h.t. (DEA Ecologie).

104. BRULE (M.), MAY (E.), LERMOYEZ (J.) .- Un cas à Plasmodium falciparum. Syndrome de cachexie hydroémique primitive .- Bull. Mém. Soc. Hôp. Paris, 1920, 44 : 1436-1440.

105. BRUMPT (E.) .- Ponte et résistance des oeufs d'Anopheles maculipennis .- Annls Parasit. hum. comp., 1925, 3 (4) 396-402.

106. BRUMPT (E.) .- Capture des larves de Culicidés par les plantes du genre Utricularia .- Annls Parasit. hum. comp., 1925, 3 (4) 403-411.

107. BRUMPT (E.) .- Les Anophèles de Corse .- Bull. Acad. Méd., 1925, 94 (3) 811-815

108. BRUMPT (E.) .- Rôle du poisson vivipare américain Gambusia holbrooki dans la lutte contre le paludisme en Corse .- C.R. Acad. Sci., 1928, 186 (13) 909-911.

109. BRUMPT (E.) .- Etude expérimentale du Plasmodium gallinaceum parasite de la poule domestique. Transmission de ce germe par Stegomyia fasciata et échec de la transmission de Plasmodium galliceum par des Culex de Richelieu (Indre-et-Loire) .- Annls Parasit. hum. comp., 1936, 14 (6) 597-620.

110. BRUMPT (E.).- Entomophthorée pathogène pour divers moustiques de la Station expérimentale du domaine de Richelieu .- C.R. Acad. Sci., 1940, 211 (20) 483-485.

111. BRUMPT (E.) .- Mécanisme d'éclosion des moustiques .- Annls Parasit. hum. comp., 1941, 18 (1/3) 75-94.

112. BRUMPT (E.) .- Les Entomophthorées parasites des moustiques. Etude critique. Recherches personnelles .- Annls Parasit. hum. comp., 1941, 18 (1/3) 112-144.

113. BRUMPT (E.) .- Notes parasitologiques concernant l'aménagement agricole de la Crau .- Annls Parasit. hum. comp., 1942, 19 (1/3) 74-84.

114. BRUMPT (E.) .- Anophélisme sans paludisme et régression spontanée du paludisme .- Annls Parasit. hum. comp., 1944-45, 20 (1/2) 67-91.

115. BRUMPT (E.), DAO VAN TY .- Distribution des biotypes d'Anopheles maculipennis en France .- Annls Parasit. hum. comp., 1942, 19 (1/3) 69-73.

116. BRUMPT (L.C.) .- Le paludisme autochtone .- Paris méd., 1941, 119 (23/24) 357-360.

117. BRUMPT (L.C.) .- Paludisme autochtone, ou paludisme accidentel. Contribution à la pathologie de la seringue .- Bull. Mém. Soc. Hôp. Paris, 1949, 65 (9/10) 392-397.

118. BRUMPT (L.C.) .- Quelques remarques à propos de la lutte antipaludique en Corse .- Bull. Acad. nat. Méd., 1950, 134 (21/22) 427-430.

119. BRUMPT (L.C.), PETITHORY (J.C.), GIACOMINI (T.) .- Actualité du paludisme en France .- Bull. Acad. natn. Méd., 1978, 162 (5) 395-400.

Source : MNHN, Paris

120. BRUN (A.) .- La transmission entomologique de la myxomatose du lapin .- Lyon, Bosc frères impr., 1968, 59 p. (thèse Médecine vétérinaire).

121. BRUNET (F.H.) .- Du paludisme à Ajaccio .- Archs Méd. Pharm. navales, 1912, 97 (4) 302-313.

122. BUFFARD (B.), DUONG (T.H.) .- Le paludisme autochtone. Situation actuelle .- Rev. Méd. Tours, 1980, 14 (7) 1180-1182.

123. BUFFARD (B.), DUONG (T.H.), BARRABES (A.) .- Le paludisme en France. Aspects actuels .- Rev. Méd. Tours, 1980, 14 (7) 1172-1177.

124. BURDIN (E.) .- Considérations sur plusieurs cas de paludisme autochtone contractés au front .- Lyon, Faculté de Médecine, 1918, 75 p. (thèse).

125. CABES (J.L.) .- Biologie et génétique du moustique commun, Culex pipiens autogenicus (Diptera, Culicidae). Variabilité génétique portant sur les chromosomes sexuels .- Toulouse, Université Paul Sabatier, 1975 (thèse 3e cycle).

126. CAILLE (E.) .- Cas de paludisme autochtone rennais à Plasmodium falciparum decelé par une injection de néosalvarsan .- Bull. Soc. Path. exot., 1918, 11 (4) 282- 286.

127. CALLOT (J.) .- Sur quelques gîtes et associations larvaires de moustiques .- Annls Parasit. hum. comp., 1939, 17 (1) 86-87.

128. CALLOT (J.) .- Sur quelques malformations observées chez les larves de Culicides .- Bull. Soc. Path. exot., 1942, 35 (11/12) 383-387.

129. CALLOT (J.) .- Sur Culex hortensis et Culex apicalis à Richelieu (Indre-et-Loire) .- Annls Parasit. hum. comp., 1942-43, 19 (4/6) 129-141.

130. CALLOT (J.) .- Culicides des eaux acides d'Auvergne .- C.R. Séances Soc. Phys. biol., France, 1944, 18 (76) 149-150.

131. CALLOT (J.) .- Culicides des eaux acides d'Auvergne. II. A propos de Culex lavieri Larousse .- C.R. Soc. Phys. biol. France, 1944, 18 (80) 196.

132. CALLOT (J.) .- Sur un nouveau moustique arboricole : Aedes (Finlaya) heracleensis sp. nov. .- Bull. Soc. Path. exot., 1944, 37 (1/2) 56-59.

133. CALLOT (J.) .- Localités nouvelles pour quelques nématocères piqueurs .- Annls Parasit. hum. comp., 1944-45, 20 (3/4) 207-208.

134. CALLOT (J.) .- A propos d'Aedes (Finlaya) heracleensis Callot, 1944 .- Annls Parasit. hum. comp., 1944-45, 20 (1/2) 93-94.

135. CALLOT (J.) .- Répartition des moustiques en France et hors de France .- Bull. Soc. Biogéogr., 1945, 22 (188) 17-20.

136. CALLOT (J.) .- Diptères nématocères piqueurs d'Auvergne .- Rev. Sci. nat. Auvergne, 1945, 11 (1/2) 28-36.

137. CALLOT (J.) .- Les papilles anales des larves de Culicides dans les conditions naturelles et expérimentales .- Bull. Soc. Path. exot., 1946, 39 (5/6) 201-206.

138. CALLOT (J.) .- Sur les gîtes larvaires de Culex hortensis et de Culex apicalis .- Annls Paras it. hum. comp., 1947, 22 (1/2) 81-83.

139. CALLOT (J.) .- La réaction de l'homme aux piqûres de moustiques .- Annls Parasit. hum. comp., 1947, 22 (3/4) 233-234.

140. CALLOT (J.) .- Etude sur quelques souches de Culex pipiens (sensu lato) et sur leurs hybrides .- Annls Parasit. hum. comp., 1947, 22 (5/6) 380-393.

141. CALLOT (J.) .- Sur les larves de Culex hortensis Fic. et de Culex deserticola Kirk. .- Annls Parasit. hum. comp., 1947, 22 (5/6) 480-481.

Source : MNHN, Paris

142. CALLOT (J.) .- La régression du paludisme en France .- Annls Soc. Economies Civilisations, 1947, 2 : 328.

143. CALLOT (J.) .- Le paludisme en Alsace et Moselle. A propos d'une enquête récente .- Annls. Parasit. hum. comp., 1948, 23 (5/6) 289-295.

144. CALLOT (J.) .- La vie hivernale de Culex autogenicus Roubaud .- Feuille Naturalistes, 1948, 3 : 79-80.

145. CALLOT (J.) .- Sur Wolbachia pipientis Hertig 1936 .- Annls Parasit. hum. comp., 1950, 25 (4) 354.

146. CALLOT (J.) .- Note faunistique sur quelques espèces de moustiques .- Bull. Ass. philomath. Alsace-Lorraine, 1950, 9 (1) 39-40.

147. CALLOT (J.) .- Notes faunistiques sur quelques espèces de moustiques et de nématocères piqueurs (suite) .- Bull. Ass. philomath. Alsace-Lorraine, 1951, 9 (2) 72-73.

148. CALLOT (J.) .- La question des moustiques en Alsace .- Techn. sanit. municipale, 1951, 46 : 35-37.

149. CALLOT (J.) .- Nouvelles études sur le biotype de Culex pipiens L. .- Anat. Histol. Embryol., 1953, 36 : 47-55.

150. CALLOT (J.) .- Le rapport trompe/palpes dans les biotypes du complexe Culex pipiens et leurs hybrides .- Annls Parasit. hum. comp., 1954, 29 (3) 131-134.

151. CALLOT (J.) .- Culex apicalis d'Europe doit reprendre le nom de Culex territans Walker .- Annls Parasit. hum. comp., 1954, 29 : 325-327.

152. CALLOT (J.) .- Fluctuations dans la faune culicidienne .- Bull. Soc. Path. exot., 1954, 47 (2) 289-292.

153. CALLOT (J.) .- Etude sur les hybrides des biotypes de Culex pipiens L. .- Annls Parasit. hum. comp., 1955, 30 (4) 363-373.

154. CALLOT (J.) .- Notes faunistiques sur les Culicides. IV. Moustiques des tourbières .- Bull. Ass. philomath. Alsace-Lorraine, 1956, 9 : 181-182.

155. CALLOT (J.) .- Sur Culex torrentium Martini .- Annls Parasit. hum. comp., 1957, 32 (4) 438-442.

156. CALLOT (J.) .- Sur quelques malformations ou déformations des larves de Culicides .- Annls Parasit. hum. comp., 1958, 33 (1/2) 145-149.

156. CALLOT (J.) .- Nouvelle localisation continentale française d'Aedes vittatus Bigot .- Annls Parasit. hum. comp., 1962, 37 (1/2) 174.

158. CALLOT (J.) .- Quelques observations sur le comportement de formes préimaginales de Culicidés sous l'influence de la lumière .- Annls Parasit. hum. comp., 1965, 40 (5) 595-603.

159. CALLOT (J.) .- Notes d'entomologie. VII. Culicides nouveaux pour la Charente-Maritime .- Annls Parasit. hum. comp., 1973, 48 (3) 518.

160. CALLOT (J.), DAO VAN TY .- L'Aedes caspius (Pallas) aux environs de Paris .- Bull. Soc. Path. exot., 1942, 35 (9/10) 326-327.

161. CALLOT (J.), DAO VAN TY .- Localités françaises nouvelles pour Culex (Culex) theileri, Culex (Barraudius) modestus et Culex (Neoculex) impudicus .- Annls Parasit. hum. comp., 1942-1943, 19 (4/6) 142-150.

162. CALLOT (J.), DAO VAN TY .- Sur quelques souches françaises de Culex pipiens L. .- Bull. Soc. Path. Exot., 1943, 36 (7/8) 229-232.

Source : MNHN, Paris

163. CALLOT (J.), DAO VAN TY .- Contritution à l'étude des moustiques français. Culicides de Richelieu (Indre-et-Loire) .- Annls Parasit. hum. comp., 1944-1945, 20 (1/2) 43-66.

164. CALLOT (J.), DELECOLLE (J.C.) .- Notes d'entomologie. VI. Localisation septentrionale d'Aedes aegypti .- Annls Parasit. hum. comp., 1972, 47 (4) 665.

165. CALLOT (J.), KREMER (M.) .- Sur quelques Diptères Nématocères du Var, avec la description d'espèces nouvelles de Culicoides (Cératopogonidés) .- Annls Parasit. hum.comp., 1965, 40 (3) 329-339.

166. CALLOT (J.), KREMER (M.) .- Notes d'entomologie.IV. A propos de la vie larvaire d'Orthodomyia pulchripalpis Rond. (Diptera: Culicidae).- Annls Parasit. hum. comp., 1970, 45 (3) 385-386.

167. CALLOT (J.), KREMER (M.) .- Notes d'entomologie. 5. Localisations nouvelles de Culicidés .- Annls Parasit. hum. comp., 1970, 45 (3) 386.

168. CALLOT (J.), RIOUX (J.A.) .- Liste sommaire des Culicidés de France .- Annls Parasit. hum. comp., 1965, 40 (2) 242-245.

169. CALLOT (J.), ROCHEDIEU-ASSENMACKER (V.) .- .- Le paludisme en Alsace; historique, extension, régression .- Rev. Path. gén. comp., 1953, 53 (652) 1153-1185.

170. CALLOT (J.), VERMEIL (C.) .- Pénétration des Aedes dans les maisons .- Annls Parasit. hum. comp., 1948, 33 (5/6) 334-336.

171. CALLOT (J.), HAUSWALD, KEMPF .- Considérations sur quelques cas de paludisme autochtone .- Strasbourg méd., 1954, 5 (12) 636-638.

172. CALLOT (J.), KREMER (M.), VERMEIL (C.) .- Captures d'insectes au New Jersey Mosquito Trap à Strasbourg .- Bull. Ass. philomath. Alsace-Lorraine, 1960, 10 : 221-235.

173. CALLOT (J.), RATIGNIER (A.), KREMER (M.) .- Infection de Culex pipiens autogenicus Roubaud de France par une souche américaine de Wuchereria bancrofti .- Bull. Soc. Path. exot., 1967, 60 (2) 184-187.

174. CALLOT (J.),KREMER(M.),GEISS(J.L.),HIRTZEL(C.).-Etude écologique de quelques Culicoides des Vosges (Diptères, Cératopogonidés).-Annls Parasit. hum. comp., 1974, 49 (5) 649-651.

175. CAMBEFORT (Y.).-Etude écologique des Culicidés de la forêt de Bouconne .- Toulouse, Faculté des Sciences, 1970, 90 p. (thèses 3e cycle).

176. CAMBEFORT (Y.) .- Les Culicides de la région toulousaine. Note préliminaire sur les gîtes culicidiens de la forêt de Bouconne .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1970, 106 (1/2) 179-183.

177. CAMBEFORT (Y.) .- Les Culicides de la région toulousaine. Faune culicidienne de la forêt de Bouconne et période de vie des larves .- Bull. Soc. Hist. nat. Toul., 1970, 106:184-185.

178. CAMBEFORT (Y.) .- Les Culicides de la région toulousaine. Présence de Mansonia (Coquillettidia) richiardii (Fic.)et de M. (C.) buxtoni (Edw.) .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1970, 106 (1/2) 186-190.

179. CAMBEFORT (Y.), LARROUY (G.) .- Les Culicides de la région toulousaine. Etude cytogénétique du complexe Culex pipiens. Note préliminaire .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1971, 107 (1/2) 316-318.

180. CAMPINCHI (S.) .- Du paludisme en Corse. Essai médico-social .- Paris, Faculté de Médecine, 1899, 45 p. (thèse).

181. CARNOT (P.) .- Le paludisme .- Paris méd., 1917, 25 (44) 353-360.

182. CARRERE (L.) .- Etude sur quelques cas de paludisme autochtone dans la région de Montpellier .- Montpellier, Faculté de Médecine, 1918, 51 p. (thèse).

Source : MNHN, Paris

183. CARRIEU .- A propos du paludisme autochtone dans les environs de Montpellier .- Languedoc méd., 1919, 2 (19) 381-385.

184. CARRIEU, SIMEON .- Deux cas de paludisme autochtone .- Montpellier méd., 1920, 41 (1) 139-142.

185. CARRIEU, LAGRIFFOUL, PICARD .- Un cas de paludisme autochtone à Plasmodium falciparum .- Montpellier méd., 1918, 41 (5) 125-133.

186. CASABIANCA (D.P.) .- Le paludisme en Corse .- Paris, Faculté de Médecine, 1914, 108 p.

187. CASSAIGNE (R.), BRUAIRE (M.), LEGER (N.) .- Paludisme autochtone - Cent ans après Laveran le paludisme à Paris. I. Les victimes .- Cah. ORSTOM, sér. Ent. méd. Parasit., 1980, 18 (2) 177-179.

188. CASALTA .- Contribution à l'étude du paludisme en Corse envisagé particulièrement au point de vue de sa prophylaxie et de son traitement .- Paris, Faculté de Médecine, 1904, 62 p.

189. CATANEI (A.) .- Anopheles de hautes régions de Corse. Présence d'A. bifurcatus L. et d'Anopheles plumbeus H. et S. dans l'île .- Bull. Soc. Path. exot., 1925, 18 (8) 655-659.

190. CATANEI (A.) .- Sur les gîtes à larves d'Anophèles des lacs de Savoie .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1936, 14 : 18-21.

191. CAVAILLON (A.), ADAM (J.P.), BERNARD (L.), CAMAIN (R.), JAUJOU (C.), TRINQUIER (E.) .- Deux années de lutte contre le paludisme en Corse : premiers résultats .- Bull. Acad. natn. Méd., 1950, 134 (15/16) 320-325.

192. CAZAL (P.) .- Les glandes endocrines neurocérébrales des insectes .- Bull. Biol. France Belg., 1948 (suppl. 32) 1-227.

193. CAZENEUVE (H.J.) .- Le paludisme indigène de Lanester près de Lorient .- Bull. Soc. Path. exot., 1920, 13 (6) 461-468.

194. CHALLAN DE BELVAL .- A propos du paludisme des plaines orientales de la Corse .- C.R. Ass. Avancement Sci., 1901, 30-1 : 181-182.

195. CHATENOUD (P.) .- L'importation du paludisme macédonien en France du fait de la guerre .- Paris, Faculté de Médecine, 1918, 91 p. (thèse).

196. CHATIN (J.) .- Les moustiques à Paris; moyens d'arrêter leur développement .- Annls Hyg., Paris, 1904, 4 (II) 97-108.

197. CHATIN (J.) .- Les moustiques à Paris .- C.R. Congr. Soc. savantes Paris Départ., 1906 59-72.

198. CHAUDONNERET (J.) .- Reflexion sur les prémandibules des larves de Culicides (Diptères, Nématocères) .- Bull. Soc. zool. France, 1951, 76 : 399-404.

199. CHAUDONNERET (J.) .- Quelques dispositifs remarquables dans les organes de l'ingestion chez la larve de moustique (Diptera, Nematocera) .- Annls Sci. nat., Zool., 1962, 4 (3) 473-488.

200. CHAUVAGNAT (J.C.), MASSIP (P.), ARMENGAUD (M.) .- Actualité du paludisme autochtone à Plasmodium falciparum : à propos d'une observation .- Rev. méd. Toulouse, 1979, 15 (3, suppl.) 369.

201. CHAVANNE (D.), RENARD (J.P.), GROUSSIN (P.), DUONG (T.H.) .- Paludisme autochtone .- Nouv. Presse méd., 1979, 8 (16) 1352.

202. CHIPPAUX (A.), RAGEAU (J.), MOUCHET (J.) .- Hibernation de l'arbovirus Tahyna chez Culex modestus Fic. en France .- C.R. Acad. Sci., D, 1970, 270 (12) 1648-1650.

Source : MNHN, Paris

203. CHOPARD (P.) .- Evolution socio-économique et répercussions écologiques. L'exemple de la démoustication de la région Rhône-Alpes .- Grenoble, Université Scientifique et Médicale, 1975 (thèse 3e cycle).

204. CHURLAUD (J.) .- Lutte contre les moustiques : bilan de deux années d'intervention en Gironde par l'Entente Interdépartementale de Démoustication du Littoral Atlantique .- Bordeaux, Université de Bordeaux II, 1981, 149 p. (thèse).

205. CLAUDE (J.) .- Les moustiques du pays des Dombes, en particulier de la région du nord du Camp de Sathonay .- Caducée, 1907, 7 (11) 145-146.

206. CLEMENT (J.) .- Actualité du paludisme autochtone .- Paris, Faculté de Médecine, 1951, 70 p. (thèse).

207. CLEMENT (R.), GERBEAUX (J.), SATGE (P.) .- Trois observations parisiennes de paludisme acquis du nourrisson. Endomyopéricardite dans un des cas .- Bull. Mém. Soc. Méd. Hôpit. Paris, 1948 24/25: 889-896.

208. CLERC (A.) .- Contribution à l'étude des moustiques qui vivent dans l'eau salée .- C.R. Soc. Biol., 1909, 66 : 120-121.

209. COLAS-BELCOUR (J.) .- Sur les Anophélinés en Basse-Normandie .- Bull. Soc. Path. exot., 1925, 18 (8) 659-660.

210. COLAS-BELCOUR (J.) .- L'oeuf et la ponte de Taeniorhynchus (Coquillettidia) richiardii Ficalbi .- Bull. Soc. Path. exot., 1943, 36 (3/4) 101-105.

211. COLOIGNER (M.), TREGUER (H.) LE GAC (A.), LE BIHAN (G.) .- Paludisme contracté en France .- Nouv. Presse méd., 1978, 7 (21) 1865.

212. COLUZZI (M.), SACCA (G.), FELICIANGELI (D.) .- Il complesso A. claviger nella sotto-regione mediterranea .- Cah. ORSTOM, Sér. Ent. méd., 1965 (3/4) 97-102.

213. CONTE (A.), VANEY (C.) .- Répartition de l'Anopheles maculipennis Meigen dans la région lyonnaise .- C.R. Acad. Sci., 1906, 143 (21) 778-779.

214. CORDIER (E.) .- Capture en Argonne d'Anopheles nigripes Staeger 1839, espèce nouvelle pour la faune française .- Bull. Soc. Path. exot., 1918, 11 (8) 726-727.

215. COSTA DE BASTELICA .- Sur le rôle des moustiques dans la propagation du paludisme et sur l'assainissement de la plaine orientale de la Corse .- Ass. franç. Avanc. Sci., 1901, 2 : 879-887.

216. COULON (G.), SAUTET (J.) .- Diverses formes du paludisme en Corse. Apparition des gamê-tes .- Bull. Soc. Path. exot., 1931, 24 (9) 811-817.

217. COULON (G.), SAUTET (J.) .- Organisation de la lutte antipaludique en Corse. In XIX Congrès d'Hygiène. Paris, octobre 1932 .- Paris, Le Mouvement Sanitaire, sd, 4 p.

218. COULON (G.), SAUTET (J.) .- Gambusia holbrooki et paludisme en Corse. Résultat de six années de lutte antilarvaire au moyen des poissons culiciphages .- Annls Parasit. hum. comp., 1931, 9 (6) 530-545.

220. COUPAYE (E.L.) .- Considérations critiques sur le paludisme autochtone en Lorraine .- Nancy-Laxou, Tollard, 1936 : 59 p.

221. COURMONT (J.) .- La remise en eau des étangs des Dombes .- Lyon méd., 1906 (6 déc.) 963.

222. COUSSERANS (J.) .- Anthropisation et nuisances. Incidences sur l'activité de l'E.I.D. .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditer-ranéen, 1975 (Doc. EID n°24) 30 p.

Source : MNHN, Paris

223. COUSSERANS (J.) .- L'information et la législation dans la lutte contre Culex pipiens pipiens sur le littoral méditerranéen .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1978 (Doc. EID n°39) 6 p.

224. COUSSERANS (J.) .- Zones protégées et démoustication .- Montpellier, Entente Interdépar-tementale pour la Démoustication du Littoral Méditérranéen, 1980 (Doc. EID n° 43) 44 p.

225. COUSSERANS (J.), GUILLE (G.) .- Expérience de lutte génétique contre Culex pipiens dans la région de Montpellier. 2e année d'observations .- Bull. biol., 1972, 106 (4) 337-343.

226. COUSSERANS (J.), GUILLE (G.) .- Expérience de lutte génétique contre Culex pipiens dans la région de Montpellier. Synthèse de quatre années d'observations .- Bull. biol., 1974, 108 (3) 253-257.

227. COUSSERANS (J.), GUILLE (G.) .- Situation actuelle du problème Coquillettidia sur le littoral Languedoc-Roussillon et dans les Bouches-du-Rhône .- Montpellier, Entente Inte rdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1974 (Doc. EID n°23) 42 p. 3 cartes h. t.

228. COUSSERANS (J.), SAL IERES (A.) .- Le moustique indicateur de la pression anthropique .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1976, Doc. EID n°30, 42 + 14 p.

229. COUSSERANS (J.), SIMONNEAU (P.) .- Le substrat dans les biotopes larvaires à Culicidés de la Charente-Maritime .- Annls Soc. Sci. nat. Charente-Maritime, 1972, 5 (4) 209-226.

230. COUSSERANS (J.), GABINAUD (A.), SIMONNEAU (P.), SINEGRE (G.) .- Les base écologiques de la démoustication. Méthode de réalisation et d'utilisation de la carte phyto-écologique .- Vie Milieu, Sér. C, 1969, 20 (1) 1-20.

231. COUSSERANS (J.), GABINAUD (G.), MAS (J.P.), SIMONNEAU (P.) .- Les bases phyto-écologiques actuelles de la lutte anticulicidienne sur le littoral atlantique charentais .- Annls Soc. Sci. nat. Charente-Maritime, 1971, 5 (4) 193-208.

232. COUSSERANS (J.), GABINAUD (A.), GUILLE (G.), ROUZAUD (C.), SINEGRE (G.) .- A propos d'une méthode de lutte antilarvaire contre le genre Coquillettidia .- Cah. ORSTOM, Sér. Ent. méd. Parasit., 1973, 11 (4) 233-236.

233. COUSSERANS (J.), SALIERES (A.), TESSON (R.) .- Note sur la présence d'Anopheles maculipennis maculipennis Hackett et Missiroli 1935, aux environs de Montpellier .- Cah. ORSTOM, Sér. Ent. méd. Parasit., 1974, 12 (1) 49-50.

234. COUSSERANS (J.), GUILLE (G.), SALIERES (A.) .- Anthropisation des eaux de surface. Un indicateur: le moustique .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1976, Doc. EID n°29, 5 p.

235. COUSSERANS (J.), GABINAUD (A.), SINEGRE (G.) .- La démoustication. Réflexion sur une méthodologie .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1977, Doc. EID n°35, 68 p.

236. COUTELEN (F.), BIGUET (J.), DOBY (J.M.) .- La régression du paludisme dans la région du nord de la France .- Rev. Path. gén. comp., 1953, 53 (652) 1209-1239.

237. CRAMPON (P.) .- Un nouveau cas de paludisme autochtone .- Echo méd. Nord, 1923, 27 : 103.

238. CRASTE .- Un cas autochtone de paludisme à Plasmodium vivax .- Bull. Soc. Path. exot., 1930, 23 (7) 726-727.

Source : MNHN, Paris

239. CROSET (H.), PAPIEROK (B.), RIOUX (J.A.), GABINAUD (A.), COUSSERANS (J.), ARNAUD (D.) .- Absolute estimates of larval populations of Culicid mosquitoes: comparison of "capture-recapture", "removal" and "dipping" methods .- Ecol. Ent., 1976, 1 (4) 251-256.

240. CROSET (H.), ARNAUD (D.), GUILVARD (E.), GABINAUD (A.) .- Dispersion, âge chronologique et âge physiologique d'une population marquée d'Aedes (O.) cataphylla Dyar, 1916 (Diptera, Culicidae) .- Vie Milieu, 1980, 30 (1) 65-73.

241. CROSNIER (H.) .- Le paludisme métropolitain .- Annls Méd., 1949, 50 : 133-146.

242. CROSNIER (R.) .- De quelques considérations sur le paludisme métropolitain .- Rev. Path. gén. comp., 1953, 53 (652) 1299-1307.

243. CROSNIER (R.), MERLE (F.), TABUSSE (L.) .- Paludisme autochtone.- Bull. Soc. Path. exot., 1948, 41 (11/12) 681-690.

244. CURTIS (C.F.) .- Male-linked translocation and the control of insect pest population .- Experientia, 1975, 31 (10) 1139-1141.

245. CURTIS (C.F.), PASTEUR (N.) .- Organophosphate resistance in vector populations of the complex of Culex pipiens L. (Diptera, Culicidae) .- Bull. ent. Res., 1981, 71 : 153-161.

246. DAINVILLE (F.) .- Paludisme autochtone dans la région de Créance .- Presse méd., 1924, 32 : 52.

247. DALIBON (L.) .- Le marais noirmoutain. Etude phyto-écologique .- Saint-Crépin, Office Interdépartemental de Lutte contre les Moustiques et les Nuisances pour le Littoral Atlantique, (1972?) 54 p.

248. DALIBON (L.), MAS (J.P.) .- Géomorphologie et hydrologie des aires culicidogènes de l'île de Ré .- Annls Soc. Sci. nat. Charente-Maritime, 1976, 6 (3) 203-217.

249. DALIBON (L.), SIMONNEAU (P.) .- Les marais d'Olonne (Vendée): un exemple d'étude écologique en vue de la lutte contre les moustiques .- Annls Soc. Sci. nat. Charente-Maritime, 1975, 6 (2) 133-155.

250. DALIBON (L.), MAS (J.P.), SIMONNEAU (P.) .- Contribution à l'étude des substrats des phytocénoses fertiles sur le littoral atlantique entre Loire et Gironde .- Annls Soc. Sci. nat. Charente-Maritime, 1974, 6 (1) 36-48.

251. DALLOT (J.Y.) .- Le paludisme autochtone .- Gaz. méd. France, 1978, 85 (36) 4311-4312.

252. DANO (L.) .- Le paludisme autochtone dans la presqu'île de Langle, Morbihan .- Lyon, Faculté de médecine, 1920 : 57 p. (thèse).

253. DASSONVILLE (C.), DASSONVILLE (G.) .- Le pétrole n'exercerait-il pas une influence attractive sur les moustiques et sur d'autres Diptères .- C.R. Soc. Biol., 1905, 59, 334-335.

254. DAURIOS (J.M.J.J.) .- Contribution à l'étude du paludisme. Un centre de paludéens de la 17e région .- Bordeaux, Faculté de Médecine, 1918, 88 p. (thèse).

255. DAVID (A.) .- Un cas de paludisme autochtone .- J. Sci. méd. Lille, 1921, 39 (31) 84-88.

256. DEBOVE (M.) .- Les moustiques de Paris .- Bull. Acad. Méd., 1901, 45 (3) 474-478.

257. DEDUIT (Y.) .- Etudes sur le ponte par autogenèse des Culicides. II. Données numériques sur l'acte de ponte chez la femelle fécondée de Culex pipiens autogenicus Roubaud .- C.R. Soc. Biol., 1957, 151 (5) 974-977.

258. DEDUIT (Y.) .- Etude sur la ponte par autogenèse des Culicides. III. Données numériques sur l'acte de ponte chez la femelle fécondée de Culex pipiens autogenicus Roubaud (plusieurs femelles avec un mâle) .- C.R. Soc. Biol., 1957, 151 (11) 1954-1956.

Source : MNHN, Paris

259. DEDUIT (Y.) .- Contribution à l'étude de l'autogenèse chez Culex pipiens .- Strasbourg, Faculté de Médecine, 1959, 131 p. (thèse)

260. DEDUIT (Y.) .- Etude sur la ponte par autogenèse des Culicides. IV. Données numériques sur l'acte de ponte chez un groupe de femelles fécondées de Culex pipiens autogenicus Roubaud: recherches d'effet de groupe .- C.R. Soc. Biol., 1960, 154 (8/9) 1617-1619.

261. DEDUIT (Y.), CALLOT (J.) .- Etude sur la ponte par autogenèse des Culcides. I. Données numériques sur l'acte de ponte chez la femelle vierge isolée de Culex pipiens autogenicus Roubaud .- C.R. Soc. Biol., 1955, 149 : 1003-1004.

262. DEGLAIRE (D.) .- La régression du paludisme en France, en Corse et en Algérie de 1880 à 1956 .- Paris, Faculté de Médecine, 1957, 44 p. (thèse).

263. DELAMARE (P.) .- L'infection paludéenne en Camargue .- Rev. sci., 1895, 4 (17) 540-541.

264. DENIAUD (J.) .- Etude des causes de disparition du paludisme dans la région de Grand'Lieu .- Rev. Path. gén. comp., 1953, 53 (652) 1320-1327.

265. DEPIEDS (R.), RANQUE (J.), QUILICI (M.), RANQUE (P.) .- Nouvelle technique pour la détermination de l'anthropophilie ou la zoophilie des moustiques .- Bull. Acad. natn. Méd., 1960, 144 (31/32) 714-715.

266. DESBANS (A.) .- Les moustiques: ce qu'on doit connaitre .- Annls Soc. Hist. nat. Toulon, 1923 : 116-161.

267. DESMIER (L.) .- De l'impaludisme dans les marais de la basse Vendée .- Paris, Faculté de Médecine, 1897, 77 p. (thèse).

268. DESOIL (P.) .- Présence du paludisme dans la vallée de la Somme .- C.R. Soc. Biol., 1914, 77 : 357-358.

269. DESOIL (P.) .- Présence de l'anophèle à Lille, Anopheles maculipennis .- Echo méd. Nord, 1924, 28 : 599.

270. DESPUJOLS (B.P.) .- Le paludisme autochtone dans la 18e région .- Rev. Serv. Santé milit., 1936, 104 (3) 419-445.

271. DIBLE (J.H.) .- The transmission of malaria in northern France .- Lancet, 1915, 93-2 : 701-702.

272. DIEMER (J.) .- La méthode de Heincke de combinaison des caractères pour la détermination d'un exemplaire isolé d'Anopheles maculipennis .- Bull. Soc. Path. exot., 1935, 28 (10) 932-937.

273. DOBY (J.M.) .- Localités nouvelles pour quelques espèces de Culicides rarement signalés en France: Uranotaenia unguiculata Edwards 1913, Culex impudicus Ficalbi 1890, Culex mimeticus Noé 1899, Theobaldia litc rea Shute 1928 et Aedes longitubus Cambournac 1938 .- Annls. Parasit. hum. comp., 1955, 30 (1/2) 136-143.

274. DOBY (J.M.) .- Les Culicides des Pyrénées-Orientales. I. Etude faunistique .- Vie Milieu, 1955, 6 (3) 365-382.

275. DOBY (J.M.), DOBY-DUBOIS (M.) .- Les Culicidés des Pyrénées-Orientales. II. Observations sur: A.- L'écologie des stades larvaires des espèces les plus fréquemment rencontrées; B.- Les heures d'activité de leurs stades adultes .- Vie Milieu, 1955, 6 : 383-392.

276. DOBY (J.M.), GUIGUEN (C.) .- A propos de deux cas "bretons" de paludisme autochtone, en réalité premiers cas français de paludisme d'aéroport .- Bull. Soc. Path. exot., 1981, 74 (4) 398-405.

277. DOBY (J.M.), RAULT (B.) .- Aedes (O.) flavescens (Müller 1764) en Charente-Maritime. Etude écologique comparée de l'espèce et de quelques autres, halophiles et semi-halophiles, rencontrées dans la même région .- Bull. Soc. zool. France, 1960, 85 (2/3) 246-253.

Source : MNHN, Paris

278. DOBY (J.M.), RAULT (B.) .- Complément à l'étude des caractères morphologiques différentiels de Culex pipiens Linné, 1758 et de Culex torrentium Martini, 1924 .- Cah. Naturalistes, 1960, 16 : 113-122.

279. DOBY (J.M.), RAULT (B.) .- Présence d'Aedes excrucians Walker, 1856, à Richelieu (Indre-et-Loire). Observations écologiques concernant cette espèce .- Annls Parasit. hum. comp., 1960, 35 (4) 619-621.

280. DOBY (J.M.), DAVID (F.), RAULT (B.) .- Contribution à l'étude faunistique et écologique des Culicidés et Simulidés (Diptera, Nematocera) de Belle-Ile (Morbihan). Présence de Theobaldia (C.) litorea (Shute) 1928, Th. (T.) subochrea Edwards 1921 et Simulium (C.) subexisum (Edwards) 1915 .- Cah. Naturalistes, 1958, 14 (1) 94-98.

281. DOBY (J.M.), RAULT (B.), DAVID (F.) .- Theobaldia (Culicella) litorea (Shute, 1928) et Anopheles (Anopheles) algeriensis Theobald 1903, dans l'Ouest de la France. Contribution à l'étude écologique de ces deux espèces .- Annls Parasit. hum. comp., 1960, 35 (1/2) 174-187.

282. DOLLFUS (R.P.) .- Une espèce de moustique nouvelle pour la faune française, Aedes (Ochlerotatus) zammitti Theobald .- C.R. Soc. Biol., 1921, 84 : 971-972.

283. DOPTER .- Le paludisme autochtone en France .- Annls Hyg. publ. Méd. lég., 1921, 35 (3) 161-180.

284. DORGELO (J.) .- Etude de la végétation dans les anciens lits du Rhône et des moustiques qui lui sont liés de Lyon au confluent de l'Ain .- Grenoble, Université Scientifique et Médicale, 1973, 104 p. (D.E.S. Biologie)

285. DORGELO (J.), GRUFFAZ (R.), PAUTOU (G.) .- La lutte physique en milieu rural. Un essai d'écologie appliquée: la démoustication de la région Rhône-Alpes .- Grenoble, Université Scientifique et Médicale, Biologie Végétale, 1971.

286. DOUCET (M.M.) .- Contribution à l'étude d'Empidomermis riouxi n. sp. (Nematoda: Mermithidae) .- Montpellier, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, 1979, 97 p. (thèse 3e cycle).

287. DOUCET (M.M.), LAUMOND (C.), BAIN (O.) .- Empidomermis riouxi n. sp. (Nematoda, Mermithidae) parasite d'Aedes (Ochlerotatus) detritus (Haliday, 1833)(Diptera, Culicidae) .- Annls Parasit. hum. comp., 1979, 54 (3) 341-351.

288. DOUMER (L.), COUTELEN (F.), MERLEN (J.), LORRIAUX (A.), BIGUET (J.) .- Deux cas de paludisme autochtone dans la banlieu de Lille .- Echo méd. Nord, 1946, 17 : 79.

289. DOVILLE (J.) .- Etude du paludisme autochtone chez le nourrisson .- Paris, Faculté de Médecine, 1939, 76 p. (thèse).

290. DUFOUGERE (W.) .- Un fléau qui s'aggrave : les moustiques. Comment s'en débarrasser.- Paris, Berger-Levrault, 1935 : 42 p.

291. DUPERIE (R.) .- Deux cas de paludisme autochtone chez des enfants .- Gaz. hebd. Sci. méd. Bordeaux, 1920, 41 (33) 389-393.

292. DUPERIE (R.) .- Huit cas de paludisme autochtone .- Presse méd., 1923, 31.2 (79) 840.

293. DUPERIE, PASTUREAU .- Deux nouveaux cas de paludisme autochtone .- Presse méd., 1923, 31.2 (95) 1000.

294. DUPUCH (M.H.) .- La lutte antipaludique en Corse .- Bordeaux méd., 1968, 1 (12) 2391-2398.

295. DUROZOY, PEJU .- Une petite épidémie de paludisme autochtone .- Presse méd., 1918, 26 (10) 94.

296. DYE (L.) .- Les parasites des Culicides .- Arch. Parasit., 1905, 9 (1) 5-77.

Source : MNHN, Paris

297. DYE (L.) .- Sur la recherche de gîtes d'Anopheles dans les Côtes-du-Nord .- Bull. Soc. zool. France, 1922, 47 : 103-106.

298. ECKSTEIN (F.) .- Zur Systematik der einheimischen Stechmücken. Die Weibchen .- Zbl. Bakteriol. I. Abt. Orig., 1918, 82 (2) 57-68.

299. ECKSTEIN (F.) .- Die Überwinterung unserer Stechmücken .- Biol. Zbl., 1919, 38 (12) 530-536.

300. ECKSTEIN (F.) .- Zur Systematik der einheimischen Stechmücken. 2. Vorläufige Mitteilung die Larven .- Zbl. Bakteriol. I. Abt. Orig., 1919, 83 (3) 281-294.

301. ECKSTEIN (F.) .- Witterung und Stechmückenplage .- Z. angew. Ent., 1920, 6 : 93-105.

302. ECKSTEIN (F.) .- Aus einer Feldstation für Stechmücken .- Z. angew. Ent., 1920, 6 : 338-371.

303. ECKSTEIN (F.) .- Zur Systematik der einheimischen Stechmücken. 3. Verläufige Mitteilung: die Männchen .- Zbl. Bakteriol. I. Abt. Orig., 1920, 84 (3) 223-240.

304. ECKSTEIN (F.) .- Beiträge zur Kenntnis der Stechmückenparasiten .- Zbl. Bakteriol. I. Abt. Orig., 1922, 88 (2) 128-135.

305. ECKSTEIN (F.) .- Die Mückenbekämpfung in Feld und in der Etappe .- Z. hyg. Zool., 1938, 30 (7/8) 213-227.

306. EDWARDS (F.W.) .- A revision of the mosquitoes of the palearctic region .- Bull. ent. Res., 1921, 12 : 236-351.

307. EDWARDS (F.W.) .- The nematocerous Diptera of Corsica .- Diptera, 1928 : 157-189.

308. EMILE-WEIL (P.), PLICHET .- Un cas de fièvre tierce maligne autochtone terminé par la mort .- Bull. Mém. Soc. méd. Hôp. Paris, 1920, 44 : 1276-1279.

309. Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen.- Extension de Mansonia richiardii dans le département du Gard .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1966 (Doc. EID n°1) 7 p.

310. Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen .- La lutte contre le moustique des villes .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1973, 12 p.

311. ETIENNE (G.) .- Sur le centre de paludisme de la Seille .- Bull. Soc. Méd. Nancy, 1916, 2 (3) 144-157.

312. ETIENNE (G.) .- Sur la reviviscence d'anciens foyers paludiques en France .- Progrès méd., 1916 (19) 183-185.

313. ETIENNE (G.) .- Reviviscence d'un ancien foyer de paludisme dans la vallée de la Seille .- Bull. Acad. Méd., 1916, 76 (32) 118-120.

314. ETIENNE (G.) .- Sur 29 cas de paludisme autochtone. Extension excentrique des foyers .- Rev. méd. Est, 1923, 51 : 124-126.

315. ETIENNE (G.) .- Deux cas de paludisme autochtone à Plasmodium falciparum .- Rev. méd. Est., 1924, 52 : 626-632.

316. FABREGAS-REAL (M.) .- A propos du service sanitaire dans les Pyrénées-Orientales à l'occasion de la guerre civile et de l'exode espagnol .- Montpellier, Faculté de Médecine, 1941, 73 p. (thèse).

317. FARABEUF .- Sur les moustiques de la banlieu de Paris .- Bull. Acad. Méd. Paris, 1901, 45 (15) 491-492.

Source : MNHN, Paris

318. FARRERAS (E.) .- Contribution à l'étude de la ponte des Culex .- Annls Parasit. hum. comp., 1938, 16 (2) 146-150.

319. FAUCHEUX (M.J.) .- Le dimorphisme sexuel de la trompe des moustiques .- Bull. Soc. Sci. nat. Ouest France, 1973, 71 : 29-36.

320. FAUCHEUX (M.J.) .- Etude ultrastructurale en microscopie électronique à balayage de la trompe du moustique femelle : Culex pipiens L. .- Bull. Soc. Sci. nat. Ouest France, 1973, 71 (4) 19-28.

321. FAUCHEUX (M.J.) .- Recherche sur l'appareil respiratoire des Diptères adultes. III. Evolution du système trachéen .- Annls Soc. ent. France, 1974, 10 (1) 99-121.

322. FAUCHEUX (M.J.) .- Contribution à l'étude de la respiration et de la nutrition chez quelques insectes aquatiques des marais salants : Stratiomyia, Nemotelus, Ephydra, Aedes (Diptères), Berosus (Coléoptère), Sigara (Hétéroptère) : importance des soies hydrofuges et des appareils filtrants .- Bull. Soc. Sci. nat. Ouest France, 1977, 75 (2/3) 56-68.

323. FAYOLLE (J.) .- Le paludisme autochtone épidémique. A propos d'une épidémie dans la Vienne .- Paris, Faculté de Médecine, 1948, 51 p. (thèse)

324. FERE (C.) .- Note sur la persistance des lésions provoquées par la piqûre des moustiques et sur la possibilité de leur réveil à longue échéance .- C.R. Soc. Biol., 1899, 1 : 567-568.

325. FERRABOUC (L.) .- Le paludisme autochtone en France .- Presse méd., 1949 (9) 122-123.

326. FERTON (C.) .- Notes détachées sur l'instinct des hyménoptères, mellifères et ravisseurs avec la description de quelques espèces .- Annls Soc. ent. France, 1901, 70 83-148.

327. FERVAL (E.) .- Contribution à l'histoire du paludisme dans la région parisienne .- Paris, Faculté de Medecine, 1935, 96 p. (thèse)

328. FEYTAUD (J.) .- Sur la présence des moustiques dans la ville de Bordeaux .- P.V. Soc. linn. Bordeaux, 1917, 70 : 1-4.

329. FEYTAUD (J.), GENDRE (E.) .- Sur un procédé pratique de montage des moustiques pour leur examen au microscope .- Actes Soc. linn. Bordeaux, 1918 : 88-91.

330. FEYTAUD (J.), GENDRE (E.) .- Sur la répartition des gîtes d'Anopheles maculipennis et d'Anopheles bifurcatus .- Bull. Soc. Path. exot., 1919, 12 (4) 178-183.

331. FEYTAUD (J.), GENDRE (E.) .- Sur la répartition des gîtes d'Anopheles maculipennis et d'Anopheles bifurcatus .- P.V. Soc. linn. Bordeaux, 1919 : 24-25.

332. FEYTAUD (J.), GENDRE (E.) .- Sur la résistance des larves de Culicides dans les eaux picriquées .- Bull. Soc. Path. exot., 1919, 12 (5) 231-234.

333. FONTAN (A.), VERGER (P.), MOULIES (A.), MARTIN (C.) .- Sur un cas de paludisme autochtone de la région bordelaise, observé chez un nourrisson de 6 mois .- Arch. fr. Pédiatr., 1946, 3 (2) 187.

334. FONTAN (A.), VERGER (P.), MOULIES (A.), MARTIN (C.) .- Sur un cas de paludisme autochtone de la région bordelaise observé chez un nourrisson de 6 mois .- J. méd. Bordeaux, 1947 : 128.

335. FORGE (P.) .- Méthode quantitative d'échantillonnage de la faune aquatique d'une salicornière et d'une jonçaie en petite Camargue (Rapport d'étude, avril-juillet 1976) .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1976 (Doc. EID n°34) 27 p., h.t.

336 FOUGERAT .- Du paludisme autochtone à treize kilomètres de Notre-Dame. Une prophylaxie ... "originale" .- Concours méd., 1941, 63 (43) 1879-1880.

Source : MNHN, Paris

337. FOURCROY (A.F.) .- Entomologia Parisiensis. Pars Secunda .- Paris, 1785, 544 p. (Culex. Le cousin pp. 515-516).

338. FOURNIALS (M.J.V.A.) .- Le paludisme autochtone à Bordeaux depuis la guerre .- Bordeaux, Faculté de Médecine, 1922, 84 p. (thèse)

339. FRAISSIGNES (B.), CHIPPAUX (A.), MOUCHET (J.) .- Captures de moustiques par des pièges lumineux associés à une source de gaz carbonique .- Méd. trop., 1968, 28 (2) 215-221.

340. FRANCHINI (G.) .- Sur un protozoaire nouveau parasite de Anopheles maculipennis .- C.R. Soc. Biol., 1913, 74 : 1196-1198.

341. FRANCOIS (J.) .- Contribution à l'étude du paludisme en Loire-Atlantique .- Nantes, Faculté de Médecine, 1973, 79 p. (thèse)

342. FRANCOIS (J.) .- Le paludisme autochtone à Rochefort-sur-mer .- Paris, Faculté de Médecine, 1935, 52 p. (thèse)

343. FREREBEAU (L.G.) .- Protection des habitations contre les moustiques stercoraires .- Paris, Faculté de Médecine, 1937, 56 p. (thèse)

344. FROMENT (J.), MAZEL (P.) .- Une forme sévère de paludisme des Dombes; hydropisie précoce; constatation de l'hématozoaire dans le sang .- Lyon méd., 1911, 11b : 840-593.

345. GABINAUD (A.) .- Contribution à l'étude des gîtes larvaires du département de l'Aude. Vers une utilisation plus rationnelle de la carte écologique .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1967 (Doc. EID n°3) 10 p.

346. GABINAUD (A.) .- La carte phyto-écologique. Méthodes de réalisation et d'utilisation.- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1969 (Doc. EID n° 13) 17 p., pl. h.t.

347. GABINAUD (A.) .- Ecologie de deux Aedes halophiles méditerranéens français : Aedes (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771), Aedes (Ochlerotatus) detritus (Haliday, 1833) (Nematocera-Culicidae). Utilisation de la végétation comme indicateur biotique pour l'établissement d'une carte écologique. Application en dymamique des populations .- Perpignan, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, 1975, 451, XIV pl. h.t. (thèse)

348. GABINAUD (A.), SIMONNEAU (P.) .- Carte phyto-écologique de l'Aude. Notice sur le grand ensemble écologique littoral de l'étang de Lapalme .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1968 (Doc. EID n°10bis) 16 p., 1 carte coul. h.t.

349. GABINAUD (A.), SINEGRE (G.) .- Présence de Mansonia (Coquillettidia) buxtoni (Edwards, 1923) sur le littoral méditerranéen .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1968 (Doc. EID n°10) 5 p.

350. GABINAUD (A.), CROSET (H.), COUSSERANS (J.), RIOUX (J.A.) .- Ecologie de deux Aedes halophiles, Aedes (O.) caspius (Pallas, 1771) et Aedes (O.) detritus (Haliday, 1833) dans le midi de la France. I. Structure chorionique et critères d'identification des deux espèces au stade de l'oeuf .- Annls Parasit. hum. comp., 1975, 50 (1) 123-130.

351. GALLAIS (G.) .- Le paludisme en France autrefois et aujourd'hui .- Paris, Faculté de Médecine, 1925, 107 p. (thèse).

352. GALLAIS (G.) .- Persistence du paludisme dans le département de la Meuse .- Rev. Méd. Hyg. trop., 1928, 20 (3) 83.

Source : MNHN, Paris

353. GALLIARD (H.) .- Note sur les larves de Culex hortensis Ficalbi et de Culex apicalis Adams .- Bull. Soc. Path. exot., 1927, 20 (7) 609-613.

354. GALLIARD (H.) .- Note sur les Culicinés de Corse .- Annls Parasit. hum. comp., 1927, 5 (2) 97-104.

355. GALLIARD (H.) .- Quelques Culicidés nouveaux pour la Corse en particulier Culex impudicus Ficalbi .- Annls Parasit. hum. comp., 1928, 6 (4) 451-454.

356. GALLIARD (H.) .- Culex brumpti n. sp. moustique nouveau trouvé en Corse .- Annls Parasit. hum. comp., 1931, 9 : 134-139.

357. GALLIARD (H.) .- Notes sur la biologie et l'anatomie de la larve de Taeniorhynchus richiardii Ficalbi .- Annls Parasit. hum. comp., 1934, 12 (6) 465-471.

358. GALLIARD (H.) .- Sur le mécanisme d'éclosion des nymphes de Culicidés .- Annls Parasit. hum. comp., 1941, 18 (4/6) 247-250.

359. GALLIARD (H.), COUTELEN (F.) .- Présence en France de Culex tipuliformis Theobald 1901 .- C.R. Soc. Biol., 1926, 95 : 1025-1026.

360. GALLIARD (H.), SAUTET (J.) .- Note préliminaire sur les races d'Anopheles maculipennis en Corse .- Bull. Soc. Path. exot., 1934, 27 (1) 30-34.

361. GALLIARD (H.), SAUTET (J.) .- Anopheles saccharovi (elutus Edw.) et A. maculipennis var.labranchiae dans leurs rapports avec le paludisme en Corse .- Bull. Soc. Path. exot., 1934, 27 (9) 855-858.

362. GALLIARD (H.), SAUTET (J.) .- Quelques caractères morphologiques d'Anopheles elutus en Corse .- Annls Parasit. hum. comp., 1935, 12 (1) 1-4.

363. GALLIARD (H.), SAUTET (J.) .- Nouvelle contribution à l'étude de l'anophélisme en Corse. Les variations saisonnières de l'indice maxillaire .- Bull. Soc. Path. exot., 1935, 28 (6) 453-456.

364. GALTIER (M.) .- Le paludisme autochtone à type tierce maligne .- Paris, Faculté de Médecine, 1921, 39 p. (thèse).

365. GARIN (C.) .- Etude sur un bacille parasite des larves d'Anophèles, le Bacille de Loutraz .- C.R. Soc. Biol., 1918, 81 : 41-43.

366. GARIN (C.), ROMAN (E.), COUDERT (J.), ZIEGLER (H.) .- Sur quelques parasitoses importées du tissu sanguin (paludisme, kalaazar, filariose, bilharziose), leurs possibités de dissémination par les invertébrés, parmi les populations autochtones de l'agglomération .- J. Méd. Lyon, 1945, 26 : 511-523.

367. GASCHEN (H.) .- Influence de la température et de la nutrition larvaire sur le développement de Culex pipiens (race autogène) .- Bull. Soc. Path. exot., 1932, 25 (6) 577-581.

368. GAYTE (M.J.) .- Recherche sur le paludisme en Provence .- Marseille, Faculté de Pharmacie, 1966, 73 p. (thèse)

369. GAYTE (M.J.), NICOLI (R.M.) .- Le paludisme en Provence occidentale. Esquisse spatio-temporelle d'une affection parasitaire .- Biol. méd., 1969, 58 (1) 1-31.

370. GENTILINI (M.), DANIS (M.) .- Le paludisme autochtone .- Méd. Malad. infect., 1981, 11 (6) 356-362.

371. GENTILINI (M.), DANIS (M.), DALLOT (J.Y.), RICHARD-LENOBLE (D.), FELIX (H.) .- Réapparition du paludisme autochtone ? .- Annls Méd. interne, 1978, 129 (6/7) 405-410.

372. GEORGHIOU (G.P.), PASTEUR (N.) .- Electrophoretic esterase patterns in insecticide-resistant and susceptible mosquitoes .- J. econ. Ent., 1978, 71 (2) 201-205.

Source : MNHN, Paris

373. GHELELOVITCH (S.) .- Etude génétique de deux caractères de pigmentation chez C. autogenicus Roub. .- Bull. biol. France Belg., 1950, 84 (3) 217-224.

374. GHELELOVITCH (S.) .- Sur le déterminisme génétique de la stérilité dans les croisements entre différentes souches de Culex autogenicus Roubaud .- C.R. Acad. Sci. Paris, 1952, 234 : 2386-2388.

375. GHELELOVITCH (S.) .- Deux cas de gynandromorphisme chez Culex autogenicus Roubaud .- Annls Parasit. hum. comp., 1957, 32 (4) 432-437.

376. GHOGOMU TAMOUH (R.) .- Etude biométrique des Culex pipiens L. et quelques aspects de la biologie des formes autogènes (Diptera-Culicidae) .- Toulouse, Université Paul Sabatier, 1977, 114 p. (thèse 3e cycle)

377. GIACOMINI (T.), GOUDAL (H.), BOUDON (P.), RENNES (C.), DUMOUCHEL (P.), PETITHORY (J. C.) .- A propos de deux cas de paludisme à Plasmodium falciparum. Responsabilité probable d'Anophèles importés par voie aérienne .- Bull. Soc. Path. exot., 1977, 70 (4) 375-379.

378. GIACOMINI (T.), GOUDAL (H.), BOUDON (P.) .- Paludisme à Plasmodium falciparum. Rôle probable de moustiques importés par voie aérienne .- Nouv. Presse méd., 1978, 7 (6) 467.

379. GILLET (J.F.) .- Contribution aux recherches de cartographie épidémiologique. Applications aux milieux urbains. La nuisance culicidienne à Grenoble. Le foyer de leishmaniose marseillais .- Grenoble, Université Scientifique et Médicale, 1981, 140 p.

380. GILOT (B.) .- Introduction à l'écologie des Culicinae de la région grenobloise. Etude de la "chorologie verticale" .- Grenoble, Université Mixte de Médecine et de Pharmacie, 1962, 243 p., h.t. (2 volumes)(thèse).

381. GILOT (B.) .- Présence d'Aedes refiki Medschid, 1928, dans la région grenobloise (Dipt. Culicidae) .- Bull. Soc. ent. France, 1968, 73 (7/8) 169-173.

382. GILOT (B.) .- Répartition altitudinale des moustiques (Dipt. Culicidae) : exemple du Dauphiné du Nord (Alpes françaises) .- Cah. ORSTOM, Ent. méd. Parasit., 1969, 7 (3) 213-233.

383. GILOT (B.), JOUBERT (L.) .- Le rôle vectoriel des Culicides dans l'épidémiologie de la myxomatose : bilan critique des études effectuées dans la région Rhône-Alpes de 1975 à 1980. In Lapin de garenne et myxomatose .- Bull. Off. natn. Chasse, 1980 (n° spéc.) 243-263.

384. GILOT (B.), AIN (G.), PAUTOU (G.), VIGHY (F.) .- Répartition d'Aedes refiki Medschid, 1928 (Dipt. Culicidae). Ecologie de cette espèce dans la région Rhône-Alpes .- Cah. ORSTOM, Ent. méd. Parasit., 1971, 9 (2) 183-196.

385. GILOT (B.), PAUTOU (G.), GRUFFAZ (R.), MONCADA (E.) .- Urbanisation et prolifération d'arthropodes hématophages .- C.R. Congr. Ass. franç. Avancement Sci., 1973, 92 : 9 p.

386. GILOT (B.), AIN (G.), PAUTOU (G.), DORGELOT (Y.) .- Données nouvelles sur la répartition de quelques Culicides dans le Sud-Est de la France .- Annls Stn biol. Besse-en-Chandesse, 1973, 7 :295-307.

387. GILOT (B.), AIN (G.), PAUTOU (G.), GRUFFAZ (R.) .- Les Culicides de la région Rhône-Alpes : bilan de dix années d'observation (Dipt.) .- Bull. Soc. ent. France, 1976, 81 (7/8) 235-245.

388. GILOT (B.), PIERMONT (L.), PAUTOU (G.), GRUFFAZ (R.), JOUBERT (L.) .- Contribution à l'étude épidémiologique de la myxomatose dans la région Rhône-Alpes : premières données sur le rôle vectoriel des Culicidés. Equilibre écologique hôte-maladie .- Bull. Soc. Sci. vét. Méd. comp. Lyon, 1977, 79 (2) 77-90.

Source : MNHN, Paris

389. GILOT (B.), JOUBERT (L.), PAUTOU (G.) .- Enquêtes éco-épidémiologiques pluridisciplinaires en vue de la prévision et la prévention des maladies contagieuses dans la région Rhône-Alpes avec recherche d'une expression cartographique : myxomatose, piroplasmose canine, zoonoses rickettsiennes .- Rev. Méd. vét., 1978, 129 (1) 73-99.

390. GILOT (B.), PUECH (M.), ROSSET (J.P.), JOUBERT (L.) .- Premiers isolements en France du virus myxomateux à partir d'un Culicidé (Culiseta annulata Schrank, Diptera-Culicidae) en période hivernale. Sur le rôle de réservoir interépizootique des moustiques hibernants .- Bull. Soc. Sci. vét. Méd. comp., 1979, 81 (2) 99-103.

391. GILOT (B.), PUECH (M.), ROSSET (J.P.), JOUBERT (L.) .- Premiers isolements en France du virus myxomateux à partir d'un Culicidé (Culiseta annulata Schrank, 1776)(Diptera, Culicidae) en période hivernale. Sur le rôle de réservoir interépizootique des moustiques hibernants .- Bull. mens. Off. natn. Chasse, 1979 (24) 13-15.

392. GILOT (B.), PUECH (M.), GIREL (J.) .- Les Culicides exophiles et mammophiles dans le nord de l'Isère : essai de cartographie à visée épidémiologique, à grande échelle, en période estivale .- Bull. Ecol., 1983, 14 (3) 179-192.

393. GINESTOUS (E.), DEPIERRIS (P.) .- La lutte contre les moustiques à Bordeaux .- Gaz. hebd. Sci. méd. Bordeaux, 1938, 59 (3) 39-44.

394. GLASER (F.) .- Über die Vermehrungsfähigkeit von Culex pipiens .- Biol. Zbl., 1917, 37 (11) 531-533.

395. GLAUD (Y.), MARJOLET (M.), MENARD (M.F.) .- Bases écologiques de la présence des moustiques dans les marais de Guérande et conditions de lutte .- Penn Ar Bed, 1975, 10 (81) 107-113.

396. GOIRAN (P.), Le paludisme à Marseille .- Marseille, Faculté de Médecine, 1968, 89 p. (thèse).

397. GOLDSCHMIDT (D.) .- Disparition de la fièvre paludéenne à Strasbourg et dans ses environs .- Rev. Hyg. Police sanit., 1907, 29 : 417-424.

398. GOLVAN (Y.J.), THEODORIDES (J.) .- Le hérisson (Erinaceus europaeus L.) prédateur des larves d'un Culicide : A. rusticus .- Annls Parasit. hum. comp., 1955, 30 (4) 421.

399. GOUGET, THIRY , CHENE .- Un cas de paludisme autochtone .- Presse méd., 1916, 24 (39) 309.

400. GOUGET, THIRY, CHENE .- Nouveau cas de paludisme autochtone .- Presse méd., 1916, 24 (42) 333.

401. GRAS (G.), RIOUX (J.A.), CROSET (H.), TOUR (S.), BROUSSAL (J.) .- "Sensibilité de base" d'Aedes (O.) caspius (Pallas) et d'Aedes (O.) detritus (Haliday) à quelques insecticides organo-phosphorés .- Bull. Soc. Path. exot., 1966, 59 (5) 898-903.

402. GRASSE (P.), BOISSEZON (P.) .- Turchiniella culicis n. g., n. sp. infusoire parasite de l'hémocoele d'un Culex adulte .- Bull. Soc. zool. France, 1929, 54 : 187-191.

403. GRJEBINE (A.), COZ (J.), ELOUARD (J.M.), MOUCHET (J.), RAGEAU (J.) .- La notion d'espèce chez les moustiques : étude de quatre complexes. In Les problèmes de l'espèce dans le règne animal. Tome I .- Société Zoologique de France, 1976 (Mém. n°38) 249-306.

404. GROS (H.) .- Un cas sporadique de paludisme autochtone .- Bull. Soc. Path. exot., 1922, 15 (4) 191-193.

405. GUIART (J.) .- Les moustiques. Importance de leur rôle en médecine et en hygiène .- Annls Hyg. publ. Méd. lég., 1900, 44 (5) 407-442.

406. GUIART (J.) .- Recherche et identification des anophèles .- J. méd. fr., 1917, 7bis (1) 3-12.

Source : MNHN, Paris

407. GUIART (J.) .- Propos sur les moustiques .- J. méd. Lyon, 1928, 9 (204) 373-382.

408. GUICHARD (M.) .- Etude in vivo du développement embryonnaire de Culex pipiens. Comparaison avec Calliphora erythrocephala (Diptera) .- Annls Soc. ent. France, 1971, 7 (2) 325-341.

409. GUILLAUME (A.) .- La lutte contre les moustiques en Alsace .- Rev. Palud. Méd. trop., 1947 (35) 101-104.

410. GUILLAUME (A.), MEYER (A.) .- Contribution à la lutte contre les moustiques d'Alsace : plan d'assainissement du ried alsacien et revalorisation des terres .- Rev. Palud. Méd. trop., 1952, 10 (94) 73-78.

411. GUILLAUSSEAU (P.J.), DROUET (L.), GARIN (Y.), RIBRIOUX (R.), WARNET (A.), MALBEC (D.), LARIVIERE (M.), LUBETSKI (J.) .- Paludisme autochtone à Plasmodium falciparum. Une nouvelle observation parisienne .- Nouv. Presse méd., 1980, 9 (7) 456-457.

412. GUILLE (G.) .- Observations écologiques et biologiques sur Mansonia (Coquillettidia) richiardii du littoral Languedoc-Roussillon .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1969 (Doc. EID n°15) 6 +13 p.

413. GUILLE (G.) .- Existence de l'autogenèse chez le moustique Mansonia (Coquillettidia) richiardii du littoral méditerranéen .- C.R. Acad. Sci., Sér. D, 1972, 274 (9) 1335-1336.

414. GUILLE (G.) .- Mode d'alimentation de la larve de Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii. Une nouvelle technique d'élevage .- Bull. Biol., 1973, 107 (3) 265-269.

415. GUILLE (G.) .- Recherches éco-éthologiques sur Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii (Ficalbi) 1889 (Diptera-Culicidae) du littoral méditerranéen français. I. Techniques d'étude et morphologie .- Annls Sci. nat. Zool., 1975, 17 (3) 229-272.

416. GUILLE (G.) .- Recherches éco-éthologiques sur Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii (Ficalbi) 1889 (Diptera-Culicidae) du littoral méditerranéen français. II. Milieu et comportement .- Annls Sci. nat.Zool., 1976, 18 (1) 5-112.

417. GUILLOTEAU (J.), MAS (J.P.) .- Moustiques et démoustication en milieu urbain .- Annls Soc. Sci. nat. Charente-Maritime, 1980, 6 (7) 767-773.

418. GUILVARD (E.) .- Modalités et déterminisme de la vitellogenèse chez les moustiques (Diptera-Culicidae). Hématophagie et autogenèse dans le complexe Aedes (O.) detritus (Haliday, 1833). Etude écophysiologique .- Montpellier, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, 1977, 149 + 6 p. (thèse 3e cycle).

419. GUILVARD (E.) .- Le complexe Aedes (Ochlerotatus) detritus (Haliday, 1833) en Camargue. Contribution à l'étude écophysiologique de l'autogenèse dans l'espèce A .- Montpellier, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, 1983, 252 + 39 p. (thèse)

420. GUILVARD (E.), RAABE (M.), RIOUX (J.A.) .- Autogenèse et neurosécrétion cérébrale chez Aedes detritus (Haliday, 1833)(Diptera-Culicidae) .- C.R. Acad. Sci., Sér. D, 1976, 283 : 1217-1220.

421. GUILVARD (E.), RIOUX (J.A.), MANIER (J.F.), PECH-PERIERES (J.) .- Coelomomyces psorophorae Couch, 1945 (Blastocladiales-Coelomomyceticeae) parasite d'Aedes detritus (Haliday, 1833)(Diptera-Culicidae) en Camargue .- Annls Parasit. hum. comp., 1977, 52 (2) 211-227.

422. GUILVARD (E.), RIOUX (J.A.), BELMONTE (A.) .- Influence de la nourriture larvaire sur la fécondité des femelles autogènes et anautogènes dans le complexe Aedes (Ochlerotatus) detritus (Haliday, 1833)(Diptera-Culicidae) .- Annls Paraist. hum. comp., 1979, 54 : 375-380.

Source : MNHN, Paris

423. GUILVARD (E.), RIOUX (J.A.), VERDIER (J.M.) .- Coexistence des comportements autogène et anautogène au cours du premier cycle gonotrophique chez l'espèce jumelle A du complexe Aedes (O.) detritus (Haliday, 1833)(Diptera-Culicidae) .- C.R. Acad. Sci., Sér. D., 1979, 288 : 763-766.

424. GUILVARD (E.), REGGI (M. de), RIOUX (J.A.) .- Changes in ecdysteroid and juvenile hormone titers correlated to the initiation of vitellogenesis in two Aedes species (Diptera, Culicidae) .- Gen. comp. Endocrinol., 1984, 53: 218-223.

425. GUY (Y.) .- La sténogamie et l'eurygamie des moustiques en tant qu'indicateur d'autres caractères éthologiques. In Mécanismes éthologiques de l'évolution .- Paris, Masson, 1977 : 132-133.

426. GUY (Y.) , LARROUY (G.) .- Au sujet de l'association de certains caractères éthologiques chez le moustique .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1976, 112 (3/4) 289-313.

427. GUY (Y.), SALIERES (A.), BOESIGER (E.) .- Contribution à l'étude du "complexe maculipennis" (Diptera-Culicidae-Anophelinae). Mise au point en 1975 .- Annls Biol., 1976, 15 (5/6) 228-282.

428. GUY (Y.), SALIERES (A.), LUMARET (R.) .- Polymorphisme de l'ornementation des oeufs chez Anopheles melanoon subalpinus (complexe maculipennis, Diptera-Culicidae-Anophelinae) .- C.R. Acad. Sci., Sér. D, 1977, 285 : 809-811.

429. GUY (Y.), BRONDEL (F.), SUZZONI-BLATGER (J.), TESSON (R.) .- Essai sur la dynamique des populations d'un gîte urbain et hypogé de Culex pipiens L. 1758 (Diptera : Culidae) .- Annls Parasit. hum. comp., 1978, 53 (2) 235-240.

430. HACKETT (L.W.), MISSIROLI (A.) .- The varieties of Anopheles maculipennis and their relation to the distribution of malaria in Europe .- Riv. Malariol., 1935, 14 (1) 45-109.

431. HAMEL (A.).-Paludisme dans le canton d'Evran .- Paris, Faculté de Médecine, 1893-1894.

432. HAMON (J.), REMMERT (H.) .- Capture dans les Pyrénées-Orientales d'Aedes (Stegomyia) vittatus Bigot et d'Aedes (Ochlerotatus) pullatus Coquillett .- Vie Milieu, 1953, 3:441-443.

433. HAMON (J.), GRJEBINE (A.), COZ (J.), KLEIN (J.M.), MICHEL (R.) .- Observations sur le niveau de sensibilité aux insecticides de quelques moustiques du littoral méditerranéen. Présence d'une souche de Culex pipiens L. résistante au Dieldrin .- Bull. Soc. Path. exot., 1959, 52 (2) 199-208.

434. HANNOUN (C.) .- West Nile fever in the South of France .- 8th internat. Congr. trop. Med. Malaria, Teheran 1968 : 667-668.

435. HANNOUN (C.) .- Progrès récents dans l'étude des arbovirus .- Bull. Inst. Pasteur, 1971, 69 (3) 241-278.

436. HANNOUN (C.), PANTHIER (R.), CORNIOU (B.) .- Epidemiology of West Nile infections in the South of France. In Arboviruses of the California complex and the Bunyamwera group. Proceeding of the Symposium held at Smolenice near Bratislava, Oct. 18-21, 1966 .- Bratislava, Publication House of the Slovak Academy, 1969 : 379-387.

437. HANNOUN (C.), PANTHIER (R.), MOUCHET (J.), EOUZAN (J.P.) .- Isolement en France du virus West Nile à partir de malades et du vecteur Culex modestus Ficalbi .- C.R. Acad. Sci. 1964, 259 (22) 4170-4172.

438. HANNOUN (C.), BEYTOUT (D.), JOUBERT (L.), MOUCHET (J.), ABONNENC (E.) .- Rapport général sur la deuxième mission d'étude des arbovirus en Camargue et en Bas-Languedoc .- Paris, Institut Pasteur, (1964?) 37 p.

Source : MNHN, Paris

439. HANNOUN (C.), PANTHIER (R.), CORNIOU (B.) .- Isolation of Tahyna virus in the South of France .- Acta Virol., 1966, 10 : 362-364.

440. HARANT (H.), RIOUX (J.A.) .- Le paludisme autochtone en Languedoc-Roussillon .- Rev. Path. gén. comp., 1953, 53 (652) 1240-1251.

441. HARANT (H.), RIOUX (J.A.) .- Notes écologiques sur les Diptères Culicidés. I. La fiche biocénotique .- Bull. Soc. Pharm. Montpellier, 1953 : 66-70

442. HARANT (H.), RIOUX (J.A.) .- Note sur l'écologie des Diptères Culicidés. II. Biotopes des Aedes halophiles .- Annls Ecole natn. Agric. Montpellier, 1954 , 29 (3/4) 71-76.

443. HARANT (H.), RIOUX (J.A.) .- Theobaldia (Culicella) litorea (Shute), Culicide nouveau pour la France .- Cah. Naturalistes, 1954, 9 (3) 57-58.

444. HARANT (H.), ATTISSO (M.), RIOUX (J.A.) .- Sur l'étude des Diptères Culicides. III. Les espèces limnodendrophiles et leurs biotopes .- C.R. Soc. Biol., 1955, 149 : 1626 - 1631.

445. HARANT (H.), CASTEL (P.), PAPPAS (J.) .- Les problèmes pratiques de la démoustication en Languedoc-Roussillon .- Bull. Soc. Pharm. Montpellier, 1951 (25 juin) 18-28.

446. HARANT (H.), RIOUX (J.A.), UZAC (S.) .- Un Culicide nouveau pour la France : Uranotaenia unguiculata Edw. Etude écologique .- Annls Parasit. hum. comp., 1952, 27 (4) 407-418.

447. HARANT (H.), RIOUX (J.A.), JARRY (D.) .- Les Culicides autochtones et anémochores de la ville de Montpellier .- Montpellier méd., 1956 (5) 450-471.

448. HARANT (H.), RIOUX (J.A.), ATTISSO (M.), RUFFIE (J.) .- Variabilité génétique chez Anopheles atroparvus atroparvus .- C.R. Soc. Biol., 1957, 151 : 2158 -2162.

449. HARVIER (P.), CLAISSE (R.) .- Paludisme autochtone à Pl. falciparum contracté à Antony .- Bull. Mém. Soc. Méd. Hôp. Paris, 1940, 56 (41/44) 722-726.

450. HASAN (S.), VAGO (C.) .- The pathogenicity of Fusarium oxysporum to mosquito larvae .- J. Invert. Path., 1972, 20 (3) 268-271.

451. HASAN (S.), CROIZIER (G.), VAGO (C.), DUTHOIT (J.L.) .- Infection à virus irisant dans une population naturelle d'Aedes detritus Haliday en France .- Annls Zool. Ecol. anim., 1970, 2 (2) 295-299.

452. HASAN (S.), VAGO (C.), KUHL (G.) .- Infection of Aedes detritus Hal. with mosquito iridescent virus .- Bull. Org. mond. Santé, 1971, 45 : 268-269.

453. HEDEEN (R.A.) .- The discovery of a member of the Anopheles maculipennis complex breeding in treeholes in France .- Mosq. News, 1955, 15 (3) 161-162.

454. HEDEEN (R.A.) .- A note on the occurence of Anopheles algeriensis Theobald in Western France .- Mosq. News, 1957, 17 (2) 97-98.

455. HEDEEN (R.A.) .- A review of the mosquito larvae of France. I. Genera Culiseta, Mansonia, Orthopodomyia and Uranotaenia .- Mosq. News, 1958, 18 (4) 308-321.

456. HEDEEN (R.A.) .- A review of the mosquito larvae of France. II. The genus Aedes .- Mosq. News, 1959, 19 (3) 179-183.

457. HELLUY (J.R.) .- Le paludisme en Lorraine .- Rev. Path. gén. comp., 1953, 53 (652) 1273-1291.

458. HENNINOT (E.), ALEXANDRE (E.) .- Un cas de paludisme autochtone à Lille .- J. Sci. méd. Lille, 1945, 63 : 398.

459. HENRI (G.) .- L'action sanitaire dans les maladies parasitaires à travers le timbre-poste .- Rennes, Faculté de Médecine, 1978, 107 +17 p. (thèse).

Source : MNHN, Paris

460. HENRY (C.) .- Etude biocénotique d'un marais du centre de la France .- Bull. Ecol., 1981, 12 (1) 9-28.

461. HESSE (E.) .- Thelohania Legeri, n. sp. microsporidie nouvelle, parasite des larves d'Anopheles maculipennis Meig. .- C.R. Soc. Biol., 1904, 57 : 570-571.

462. HESSE (E.) .- Sur la présence, dans le Dauphiné, de l'Anopheles nigripes Staeger .- Arch. Zool. exp. gén., 1918, 57 (2) 32-35.

463. HESSE (E.) .- Caulleryella anophelis n. sp., Schizogrégarine parasite des larves d' Anopheles bifurcatus L. .- C.R. Acad. Sci., 1918, 166 (14) 569-572.

464. HESSE (E.) .- Sur les "Caulleryella", schizogrégarines parasites des larves de moustiques .- C.R. Ass. Avancement Sci., 1926, 49 : 403-409.

465. HIDROT (D.) .- La lutte contre la nuisance des moustiques en France. Cinq années d'activité de l'Office Interdépartemental du Littoral Atlantique .- Bordeaux, U.E.R. des Sciences Médicales et Pharmaceutiques, 1974, 169 p. (thèse).

466. HORN (S.) .- Contribution à l'histoire ancienne du paludisme en rapport avec les doctrines de Montpellier .- Montpellier, Faculté de Médecine, 1919-1920, 35 p. (thèse).

467. HOSSELET (C.) .- Le comportement du chondriome au cours de la différenciation musculaire dans la nymphe de Culex annulatus .- C.R. Soc. Biol., 1928, 98 : 301-303.

468. HOSSELET (C.) .- Le chondriome dans la production de la striation transversale et des grains interstitiels dans les muscles du vol de Culex annulatus .- C.R. Soc. Biol., 1928, 98 : 304-305.

469. HOSSELET (C.) .- Deux modes d'évolution du chondriome dans les disques imaginaux chez Culex annulatus .- C.R. Soc. Biol., 1928, 98 : 1108-1110.

470. HOSSELET (C.) .- Quelques aspects remarquables du chondriome dans la spermatogenèse de Culex annulatus .- C.R. Soc. Biol., 1928, 98 : 1174-1176.

471. HOSSELET (C.) .- Chondriome à formes d'éléments golgiens dans la cellule nerveuse des insectes .- C.R. Soc. Biol., 1929, 100 : 1075-1077.

472. HOSSELET (C.) .- Une phase réticulaire du chondriome dans les spermatocytes I de Culex annulatus .- C.R. Soc. Biol., 1929, 101 : 737-739.

473. HOSSELET (C.) .- Le chondriome et les enclaves de la cellule adipeuse chez Culex et quelques Phryganides .- C.R. Soc. Biol., 1930, 104 : 150-153.

474. HOSSELET (C.) .- Observations cytologiques sur le tube de Malpighi de Culex et de quelques Phryganides .- C.R. Soc. Biol., 1930, 104 : 270-274.

475. HOSSELET (C.) .- Aspects du chondriome dans les cellules folliculaires, les cellules nourricières et l'ovocyte chez les Culicides et les Setodes .- C.R. Soc. Biol., 1930, 104 : 354-357.

476. IBRAHIM (O.F.) .- Contribution à l'étude biométrique et biologique (nutrition et développement) du moustique commun Culex pipiens (Linné 1758)(Diptera Culicidae) .- Toulouse, Université Paul Sabatier, 1979, 106 p.(thèse 3e cycle).

477. IZARD (M.) .- Moustiques urbains à Toulouse .- Concours méd., 1937, 59 (5) 287.

478. JACOTOT (H.), TOUMANOFF (C.), VALLEE (A.), VIRAT (B.) .- Sur le rôle des moustiques dans la transmission de la myxomatose .- C.R. Acad. Sci., 1954, 239 (15) 909-911.

479. JACOTOT (H.), TOUMANOFF (C.), VALLEE (A.), VIRAT (B.) .- Transmission expérimentale de la myxomatose au lapin par Anopheles maculipennis atroparvus et Anopheles stephensi .- Annls Inst. Pasteur, 1954, 87 (4) 477-485.

Source : MNHN, Paris

480. JACOTOT (H.), TOUMANOFF (C.), VALLEE (A.), VIRAT (B.) .- Etude de l'aptitude d'Anopheles maculipennis atroparvus à inoculer au lapin les souches atténuées de virus de myxome infectieux .- Annls Inst. Pasteur, 1957, 92 (2) 166-175.

481. JARRY (D.M.), JARRY (D.T.) .- Remarques sur quelques insectes piqueurs domiciliaires de la ville de Montpellier .- Languedoc méd., 1960, 44 (4) 21-34.

482. JAUJOU (C.) .- La lutte antipaludique en Corse .- Bull. Org. mond. Santé, 1954, 11 : 635-677.

483. JAUJOU (C.), TOUMANOFF (C.) .- Compte rendu d'un sondage malariologique effectué en Corse (16-30 août 1947) .- Bull. Inst. natn. Hyg., 1948, 3(3) 468-481.

484. JAUJOU (C.), CAMAIN (R.), ADAM (J.P.) .- Plan de mise en valeur de la Corse. Rapport sur l'activité du service anti-paludique en 1949 .- Ajaccio, Siciliano impr., 1950, 75 p.

485. JAUJOU (C.), FABRE (J.), ANTONETTI (M.) .- Rapport sur l'activité du Service antipaludique en 1951 .- Direction Départementale de la Santé (de Corse), 1952, 51 p., h. t. coul.

486. JAUJOU (C.), MICHEL (L.), HAMON (J.) .- Plan de mise en valeur de la Corse. Rapport sur l'activité du Service antipaludique en 1950 .- Paris, Alepée et Cie, 1951, 63 p.

487. JEANSELME (E.) .- Cas de paludisme autochtone contracté en France au contact de troupes indigènes .- Bull. Soc. Path. exot., 1916, 9 : 693-694.

488. JOBLOT .- Observations d'histoire naturelle faites avec le microscope. Tome premier. Seconde partie .- Paris, Briasson, 1754, 124 p., 15 pl. h.t.

489. JOFFRE (F.) .- Contribution à l'étude de la transmission de la myxomatose par les moustiques : transmission par Culex pipiens d'un virus d'infectiosité maximale. Tentative de transmission d'un virus atténué .- Alfort, Ecole Nationale Vétérinaire, 1978, 67 p. (thèse).

490. JOUBERT (L.) .- L'arbovirus West Nile, zoonose du midi méditerranéen de la France .- Bull. Acad. natn. Méd. Paris, 1975, 156 (6) 499-503.

491. JOUBERT (L.) .- Les ententes interdépartementales pour la démoustication (E.I.D.). Cartographie des équipotentialités sectorielles phyto-écologiques, entomologiques et épidémiologiques .- Rev. Méd. vét. Toulouse, 1978, 129 (3) 513-516.

492. JOUBERT (L.) .- La pathologie du lapin de garenne, Oryctolagus cuniculus. La myxomatose et sa prophylaxie .- Bull. mens. Office natn. Chasse, 1980 (34) 15-19.

493. JOUBERT (L.), OUDAR (J.) .- Les zoonoses arbovirales. Leur présence en France. II. La méningo-encéphalomyélite équine West Nile du Midi méditerranéen français .- Rev. Méd. vét., 1970, 121 (3) 221-245.

494. JOUBERT (L.), OUDAR (J.) .- La méningoencéphalite à virus West Nile du cheval dans le midi méditerranéen de la France .- Bull. Soc. Sci. vét. Méd. comp., 1974, 76 (4) 255-260.

495. JOUBERT (L.), OUDAR (J.), MOUCHET (J.), HANNOUN (C.) .- Transmission de la myxomatose par les moustiques en Camargue. Rôle prééminent de Aedes caspius et des Anopheles du groupe maculipennis .- Bull. Acad. vét., 1967, 40 (7) 315-322.

496. JOUBERT (L.), CHIPPAUX (A.), MOUCHET (J.), OUDAR (J.) .- Entretien hivernovernal du virus myxomateux dans les terriers. Myxomatose d'inoculation par la puce du lapin et myxomatose de fouissement .- Bull. Acad. vét., 1969, 42 : 93-101.

Source : MNHN, Paris

497. JOURDAIN (S.) .- Note sur le mouvement de rotation singulier de la tête chez une larve de Culicide .- C.R. Soc. Biol., 1893, 45 : 249-250.

498. JOYEUX (C.) .- Le paludisme, extension et régression .- Bull. Soc. Neufch. Sci. nat., 1942, 67 : 5-97.

499. JOYEUX (C.), SAUTET (J.) .- Nouvelles recherches sur Dirofilaria immitis (Leidy) .- Bull. Soc. Path.exot., 1938, 31 : 122-123.

500. KLEIN (J.M.), MICHEL (R.) .- Observations sur le niveau de sensibilité aux insecticides des larves de l'Aedes (Ochlerotatus) detritus (Haliday), 1833 du littoral méditerranéen .- Bull. Soc. Path. exot., 1959, 52 (3) 295-299.

501. KREMER (M.), VERMEIL (C.), CALLOT (J.) .- Sur quelques nématocères vulnérants des eaux salées continentales de l'est de la France .- Bull. Ass. philomath. Alsace-Lorraine, 1961, 11 (1) 1-7.

502. KULA (H.) .- Les moutiques dans les grandes villes .- Paris, Faculté de Médecine, 1935, 34 p. (thèse).

503. KUNLIN (H.) .- Die Malaria in Elsass-Lothringen .- Strasbourg, Faculté de Médecine, 1903, 50 p. (thèse).

504. LACARRIERE .- Le paludisme dans la défense mobile de la Corse .- Arch. Méd. nav., 1900, 73 : 203-216.

505. LACOUR (P.) .- Etude biologique de la race rurale de Culex pipiens L. .- Clermont-Ferrand, Faculté des Sciences, 1937, 125 p. (thèse).

506. LAGRIFFOUL (A.), PICARD (F.) .- Remarques sur le paludisme dans la XVIe région. Cas autochtone à Plasmodium praecox .- Bull. Soc. Path. exot., 1917, 10 (10) 883-885.

507. LAGRIFFOUL (A.), PICARD (F.) .- Mode d'action du climat sur la répartition géographique du paludisme .- Bull. Soc. Path. exot., 1918, 11 (2) 73-77.

508. LALESQUE (J.), SIGALAS (R.) .- Le Gambusia, poisson antilarvaire . Son utilisation dans la lutte contre les moustiques. Sa présence dans l'étang de Cazaux .- Bull. Stat. biol. Arcachon, 1936 (2) 235-238.

509. LANGERON (M.) .- Remarques sur les larves de Culex geniculatus et sur les larves de Culicinés pourvues d'un long siphon .- Bull. Soc. Path. exot., 1916, 9 (7) 438-442.

510. LANGERON (M.) .- Remarques sur l'évolution larvaire de Theobaldia annulata (Schrank, 1776) .- Bull. Soc. Path. exot., 1916, 9 (9) 704-709.

511. LANGERON (M.) .- La présence d'Anopheles nigripes (Staeger, 1839) dans la région parisienne .- Bull. Soc. Path. exot., 1918, 11 (8) 728.

512. LANGERON (M.) .- Sur l'anophélisme et le paludisme en France .- Bull. Soc. Path. exot., 1922, 15 (1) 30-36.

513. LANGERON (M.) .- Hibernation de Theobaldia annulata .- Annls Parasit. hum. comp., 1925, 3 : 325-326.

514. LANGERON (M.) .- Présence en Corse de l'Aedes (Stegomyia) argenteus (Poiret) 1787 .- Bull. Soc. Path. exot., 1925, 18 (9) 723-725.

515. LANGERON (M.) .- Notes sur les moustiques de la région parisienne. Localités nouvelles et espèces mal connues .- Annls Parasit. hum. comp., 1926, 4 (2) 199-202.

516. LANGERON (M.) .- Sexualité des larves de moustiques .- Annls Parasit. hum. comp., 1926, 4 (2) 126-135.

517. LANGERON (M.) .- Les larves anormales de moustiques ou larves à collier et à cerceaux .- Annls Parasit. hum. comp., 1928, 6 (3) 273-283.

Source : MNHN, Paris

518. LANGERON (M.) .- Mycose d'une larve de Culex hortensis en Corse .- Annls Parasit. hum. comp., 1929, 7 (2) 107-111.

519. LANGERON (M.), GALLIARD (H.) .- Deux types de larves d'Anopheles nouveaux pour la France .- Annls Parasit. hum. comp., 1933, 11 (1) 93-95.

520. LANZALAVI (P.) .- Recherches sur les Culicidae (Nematocera) de la Corse .- Marseille, Faculté de Médecine, 1965, 97 p. (thèse).

521. LANZENBERG (A.) .- Un cas de paludisme autochtone à Plasmodium praecox .- Bull. Soc. Path. exot., 1921, 14 (5) 266-268.

522. LAPEYSSONNIE (L.) .- Le paludisme de primo-invasion en Roussillon .- Montpellier, Faculté de Médecine, 1941, 49 p. (thèse).

523. LARCAN (A.), LAPREVOTE-HEULLY (M.C.), VOYDEVILLE (G.), BASTOS (P.) .- Une nouvelle observation de paludisme autochtone avec contamination probable dans un aéroport international de la région parisienne .- Annls Méd. interne, 1978, 129 (6/7) 411-412.

524. LARROUSSE (F.) .- Larves de Culex à branchies très développées nouvelles pour la faune française (Culex lavieri n. sp.) .- Annls Parasit. hum. comp., 1925, 3 (1) 68-70.

525. LAVEN (H.), COUSSERANS (J.), GUILLE (G.) .- Expérience de lutte génétique contre Culex pipiens dans la région de Montpellier .- Bull. Biol., 1971, 105 (4) 357-367.

526. LAVEN (H.), COUSSERANS (J.), GUILLE (G.) .- Eradicating mosquitoes using translocations : a first field experiment .- Nature, 1972, 236 (5348) 456-457.

527. LAVERAN (A.) .- Paludisme et moutiques .- Janus, 1900, 5 : 269-276.

528. LAVERAN (A.) .- Paludisme et moustiques. Quelques faits recueillis dans le midi de la France et en Corse .- C.R. Soc. Biol., 1900, 52 (897) 987-989.

529. LAVERAN (A.) .- Au sujet des Anopheles et de leur rôle dans la propagation du paludisme .- C.R. Soc. Biol., 1901, 53 : 388-390.

530. LAVERAN (A.) .- Sur la prophylaxie du paludisme en Corse .- Bull. Acad. Méd., 1901, 46 (43) 883-897.

531. LAVERAN (A.) .- Note sur des Culicides de France, de la Guyane et de Grand-Bassam .- C.R. Soc. Biol., 1903, 55 : 1156-1158.

532. LAVERAN (A.) .- Anophèles et paludisme .- Bull. Inst. Pasteur, 1903, 1 (8) 313-323.

533. LAVERAN (A.) .- Anopheles et paludisme .- C.R. Acad. Sci. Paris, 1903, 136 (14) 853-858.

534. LAVERAN (A.) .- Sur les Culicides de Rochefort-sur-mer et de Camargue .- C.R. Soc. Biol., 1904, 56 : 325-326.

535. LAVERAN (A.) .- Sur la destruction des moustiques .- Rev. Hyg. Police sanit., 1913, 35 :1207-1216.

536. LAVIER (G.) .- Les parasites des invertébrés hématophages. Parasites qui leur sont propres, parasites qu'ils transmettent aux vertébrés .- Paris, Faculté de Médecine, 1921, 218 p. (thèse).

537. LAVIER (G.), CALLOT (J.) .- Gîtes larvaires de Culicides en eau fortement minéralisée. Présence dans le centre de la France de Culex theileri Theob. (= C. tipuliformis Theob.) .- Bull. Soc. Path. exot., 1939, 32 (9) 876-880.

538. LAVIER (G.), DAO VAN TY .- Comportement anormal de certains Aedes pendant l'été 1943 .- Bull. Soc. Path. exot., 1944, 37 (7/8) 245-250.

Source : MNHN, Paris

539. LEACH (W.E.) .- Description of thirteen species of Formica and three species of Culex, found in the environs of Nice .- Zool. J., 1825, 2 : 289-293.

540. LECAILLON (A.) .- Sur les rapports de la larve et de la nymphe du cousin (Culex pipiens L.) avec le milieu ambiant .- Bull. Soc. Philom. Paris, 1898-99, 1 (4) 125-138.

541. LECAILLON (A.) .- Sur les prolongements ciliformes de certaines cellules du cousin adulte, Culex pipiens L. (Dipt.) .- Bull. Soc. ent. Fr., 1899 (18) 353-354.

542. LECAILLON (A.) .- Recherches sur la structure et le développement postembryonnaire de l'ovaire des insectes. I . Culex pipiens L. .- Bull. Soc. ent. Fr., 1900 (4) 96-100.

543. LE DANTEC .- La lutte contre les moustiques à Rochefort-sur-mer .- J. Méd. Bordeaux, 1918, 89 (6) 151-158.

544. LEGENDRE (J.) .- Note sur la biologie de Stegomyia fasciata et de Culex pipiens .- Bull. Soc. Path. exot., 1909, 2 (7) 425-427.

545. LEGENDRE (J.) .- Sur la destruction des culicines à l'aide de gîte-piège .- Bull. Soc. Path. exot., 1910, 3 : 455-457.

546. LEGENDRE (J.) .- Destruction des Culicidés à l'aide de pièges gîtes .- Bull. Soc. Path. exot., 1913, 6 : 513.

547 LEGENDRE (J.) .- Sur un nouveau mode de transport des larves de moustiques .- C.R. Soc. Biol., 1916, 79 : 26-27.

548. LEGENDRE (J.) .- Rôle du bétail et de la basse-cour dans la défense contre la malaria .- C.R. Acad. Sci., 1920, 170 (12) 766-769.

549. LEGENDRE (J.) .- Rôle du lapin et autres animaux domestiques dans la défense contre les moustiques .- Nature, 1921, 49 (2487) 367-368.

550. LEGENDRE (J.) .- Anophélisme et cuniculiculture .- C.R. Acad. Sci., 1921, 173 (15) 600-602.

551. LEGENDRE (J.).- Sur la zoophilie de certains moustiques et son application à la prophylaxie .- C.R. Acad. Sci., 1923, 177 (17) 790-793.

552. LEGENDRE (J.) .- Des variations dans le trophisme des Culicides .- C.R. Acad. Sci., 1924, 178 (4) 423-425.

553. LEGENDRE (J.) .- La zoophilie chez les moustiques et son application à la prophylaxie .- C.R. Acad. Sci., 1924, 179 : 1351-1353.

554. LEGENDRE (J.) .- La lutte contre les moustiques par la concurrence entre zoophiles et androphiles .- C.R. Acad. Sci., 1927, 185 (25) 1520-1522.

555. LEGENDRE (J.) .- La psychologie de Culex pipiens .- C.R. Acad. Sci., 1928, 187 (18) 774-776.

556. LEGENDRE (J.) .- La concurrence entre moustiques zoophiles et anthropophiles .- C.R. Acad. Sci., 1929, 188 (1) 95-97.

557. LEGENDRE (J.) .- Le moustique cavernicole ou l'adaptation de Culex pipiens à l'urbanisme moderne .- Bull. Acad. Méd., 1931, 106 : 86-89.

558. LEGENDRE (J.) .- Le moustique stercoraire .- Bull. Acad. Méd., 1931, 106 : 276-280.

559. LEGENDRE (J.) .- Anthropophilie ou zoophilie chez le moustique commun Culex pipiens .- Bull. Acad. Méd., 1932, 107 : 317-320.

560. LEGENDRE (J.) .- Le moustique anthropophile ou zoophile .- Presse méd., 1932, 40 (22) 427-428.

561. LEGENDRE (J.) .- La lutte contre le moustique stercoraire ou moustique des trois saisons .- Presse méd., 1932, 40 (87) 1633.

Source : MNHN, Paris

562. LEGENDRE (J.) .- Les moustiques arboricoles du centre-ouest .- Bull. Acad. Méd., 1933, 109 : 605-607.

563. LEGENDRE (J.) .- Hibernation du moustique commun .- Bull. Acad. Méd., 1933, 109 (23) 802-805.

564. LEGENDRE (J.) .- La défense mécanique contre les mouches et les moustiques stercoraires .- Bull. Acad. Méd., 1933, 110 (38) 589-591.

565. LEGENDRE (J.) .- Entre Charybde et Scylla ou entre la mouche et le moustique .- Presse méd., 1934, 42 (21) 430-431.

566. LEGENDRE (J.) .- Le moustique maritime .- C.R. Acad. Sci., 1934, 199 (22) 1243-1245.

567. LEGENDRE (J.) .- La longévité chez la larve d'un moustique arboricole .- C.R. Acad. Sci., 1934, 198 (13) 1263-1265.

568. LEGENDRE (J.) .- Le moustique maritime .- C.R. Acad. Sci., 1935, 201 (1) 96-98.

569. LEGENDRE (J.) .- La tactique dans la lutte contre les moustiques .- Conc. méd., 1935, 57 (35) 2485-2486.

570. LEGENDRE (J.) .- Le moustique maritime .- La Nature, 1935, 63 (1er août) 130.

571. LEGENDRE (J.) .- La pénétration continentale du moustique maritime .- C.R. Acad. Sci., 1936, 202 (10) 874-876.

572. LEGENDRE (J.) .- Fosses septiques et moustiques .- Bull. Acad. Méd., 1936, 115 : 956-959.

573. LEGENDRE (J.) .- Fosses septiques et moustiques .- Presse méd., 1936, 44 (69) 1363.

574. LEGENDRE (J.) .- La défense contre le moustique de fosse d'aisance .- Bull. Acad. Méd., 1937, 117 (16) 471-473.

575. LEGENDRE (J.) .- La suppression du moustique maritime .- La Nature, 1937, 65 : 321-322.

576. LEGENDRE (J.) .- La défense contre le moustique de fosse d'aisance .- Presse méd., 1937, 45 (38) 726.

577. LEGENDRE (J.) .- La longévité chez la larve d'un moustique arboricole .- C.R. Acad. Sci., 1934, 198 (13) 1263-1265.

578. LEGENDRE (J.), OLIVEAU (A.) .- Rôle du lapin domestique dans l'attraction et la nutrition d'Anopheles maculipennis .- C.R. Acad. Sci., 1921, 172 (13) 822-823.

579. LEGER (L.) .- Sur la présence dans la région grenobloise des moustiques considérés comme propagateurs du paludisme .- Dauphiné méd., 1901, 25 (9) 193-195.

580. LEGER (L.) .- Sur un flagellé parasite de l'Anopheles maculipennis .- C.R. Soc. Biol., 1902, 54 : 354-356.

581. LEGER (L.) .- Grandes lignes de la répartition géographique des zones anophéliques dans le Sud-Est de la France et méthode d'étude .- C.R. Acad. Sci., 1918, 167 (11) 399-401.

582. LEGER (L.) .- Moustiques de Camargue. Un Anopheline nouveau pour la faune française le Myzorhynchus sinensis Wied. .- C.R. Soc. Biol., 1920, 83 : 1609-1610.

583. LEGER (L.), ARLO .- Le paludisme en Corse, 2e campagne antipaludique .- Laval, Barnéoud, 1914.

584. LEGER (L.), DUBOSC (O.) .- Sur les larves d'Anopheles et leurs parasites en Corse .- C.R. Ass. fr. Avanc. Sci., 1902, 31 : 703-704.

585. LEGER (L.), MOURIQUAND (G.) .- Sur l'hibernation des Anophèles en Dauphiné .- Progrès méd., 1917, 78 (49) 49-51.

586. LEGER (L.), MOURIQUAND (G.) .- Sur l'hibernation des anophèles en Dauphiné .- Bull. Acad. Méd., 1917, 78 (38) 357-359.

Source : MNHN, Paris

587. LEGER (L.), MOURIQUAND (G.) .- Sur la répartition des stations d'Anophèles dans le secteur médical Grenoble-Gap-Briançon et indications prophylactiques qui en découlent .- Bull. Mém. Soc. méd. Hôpit. Paris, 1917, 41 : 16-22.

588. LEGER (L.), MOURIQUAND (G.) .- Sur la répartion des stations d'anophèles dans le secteur médical Grenoble-Gap-Briançon et indications prophylactiques qui en découlent .- Annls Univ. Grenoble, 1917, 29 (1) (15 p.).

589. LEGER (L.), MOURIQUAND (G.) .- Anophèles et anciens foyers paludiques dans les Alpes .- C.R. Acad Sci., 1918, 167 : 461-463.

590. LEGER (L.), MOURIQUAND (G.), KERDREL (A. de) .- Manifestation du paludisme en France depuis la guerre .- Annls Univ. Grenoble, 1918, 30 (1) 5-17.;

591. LEGER (M.) .- Sur la présence dans la région grenobloise des moustiques considérés comme propagateurs du paludisme .- Grenoble, Allier impr., 1901.

592. LEGER (M.) .- Le paludisme en Corse. Recherches microbiologiques. Etudes prophylactiques .- Laval, Barnéoud et Cie, 1913, 60 p.

593. LEGER (M.) .- Le paludisme en Corse .- Annls Inst. Pasteur, 1913, 27 (9) 765-793.

594. LEGER (M.) .- Les indications prophylactiques à tirer de l'anophélisme sans paludisme .- Presse méd., 1934, 42 (50) 1027-1028.

595. LEGER (N.), TIMBAL (J.), PESSON (R.) .- Cent ans après Laveran : le paludisme à Paris. III. Les prévenus, anophèles importés. Réquisitoire et plaidoyer .- Cah. ORSTOM, Sér. Ent. méd. Parasit., 1980, 18 (2) 180.

596. LEGER (N.), PESSON (B.), BRUAIRE (M.), CASSAIGNE (R.), FERRAND (G.), VAN DAMNE (R.), TIMBAL (J.) .- Le paludisme des aéroports. Résultats d'une enquête sur les aéroports parisiens .- Méd. trop., 1981, 41 (4) 431-441.

597. LEMOINE (G.) .- Formes méconnues du paludisme .- Nord méd., 1910, 17 : 57.

598. LEPINE (J.) .- Immunité contre les piqûres de moustiques acquise par la mère et transmise au foetus .- C.R. Soc. Biol., 1902, 54 : 986-987.

599. LEPROUX (P.H.) .- Le paludisme autochtone en Charente-Maritime .- Bordeaux, Faculté de Médecine, 1952, 58 p (thèse).

600. LESIEUR , ROKECKA .- Deux cas à Plasmodium vivax .- Paris méd., 1918, 29 (29) 64.

602. LONJARET (R.) .- Regression et disparition du paludisme en France .- Lyon, Faculté de Médecine, 1939, 80 p. (thèse).

603. LOUBRIEU (G.) .- Contribution à l'étude du paludisme autochtone à Plasmodium praecox .- Paris, Faculté de Médecine, 1921, 60 p. (thèse).

604. LOUMAGNE (C.) .- La végétation, indicateur des aires culicidogènes dans le complexe lagunaire Capitoul-Campignol-Ayrolle-Gruissan (Aude) .- Perpignan, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Centre Universitaire de Perpignan, 1978, 608 p. (thèse d'université).

605. LUONG DINH GIAP (G.) .- Organisation de la lutte contre les moustiques en Gironde. Enquêtes bio-phyto-écologiques préliminaires. Mise en place d'une structure opérationnelle .- Bordeaux, U.E.R. Sciences médicales , 1980, 207 p + 1 volume de cartes.

606. MACQUART (J.) .- Histoire naturelle des insectes. Diptères. Tome premier .- Diptera, 1834, 1, 578 p.

607. MAIGRE (P.) .- Le paludisme autochtone dans la région de Beauvoir-sur-mer (Vendée).- Paris, Faculté de Médecine, 1932, 56 p.

Source : MNHN, Paris

608. MAIRE (A.) .- Incidence des opérations de démoustication sur les biotopes larvaires à Aedes dans la région Rhône-Alpes .- Grenoble, Université Scientifique et Médicale, 1971, 89 p. (thèse 3e cycle).

609. MAIRE (A.) .- Une nouvelle technique pour prélever quantitativement des populations d'arthropodes en eau stagnante .- Trav. Lab. Hydrobiol. Piscicult. Univ. Grenoble, 1971, 62 : 7-15.

610. MAIRE (A.), GILOT (B.), PAUTOU (G.), AIN (G.) .- Ecologie des biotopes larvaires à Aedes (Ochlerotatus) rusticus (Rossi, 1790) dans la région Rhône-Alpes .- Bull. Soc. Ecol., 1972, 3 (4) 421-434.

611. MALEVILLE (J.A.) .- Une épidémie de paludisme à Plasmodium vivax dans le centre de dirigeables de Cuers-Pierrefeu (Var) en septembre-octobre 1919 .- Bordeaux, Faculté de Médecine, 1920, 48 p. (thèse).

612. MALLOIZEL (M.) .- Le paludisme d'Orient peut se contracter en France. Un cas de malaria à parasites crescentiformes contracté à Vannes .- Soc. méd. Hôp. Paris, 1917, 41 168-174.

613. MALLOIZEL, BONNARD .- Note sur le paludisme autochtone dans la presqu'île de Langle (golfe du Morbihan) .- Bull. Soc. Path. exot., 1917, 10 : 805.

614. MALRIEU-JOFFRE (F.) .- Contribution à l'étude de la transmission de la myxomatose par les moustiques : transmission par Culex pipiens d'un virus d'infectiosité maximale. Tentative de transmission d'un virus atténué .- Maisons-Alfort, Ecole Nationale Vétéritnaire d'Alfort, 1968, 67 p. (thèse).

615. MANDOUL (H.) .- Une mission antipaludique dans la XVIIe région (1917-1918) .- Bull. Soc. Path. exot., 1919, 12 (10) 779-798.

616. MANDOUL (H.) .- Guerre et paludisme .- J. méd. Bordeaux, 1932, 109 (34) 957-960.

617. MANDOUL (H.) .- La guerre aux moustiques .- J. méd. Bordeaux, 1933, 110 (34) 911-914.

618. MANDOUL (M.), DUBOS (M.), MOULINIER (C.), COURNUAUD (M. de) .- Une enquête sur les Culicides de Charente-Maritime. Présence du genre Mansonia Blanchard 1901 : M. (Coquillettidia) richiardii (Ficalbi) 1896 et M. (C.) buxtoni (Edwards) 1923 .- Bull. Soc. Path. exot., 1968, 61 (2) 282-288.

619. MARCHALANT (L.) .- Les moustiques à Bordeaux. Essai de prophylaxie culicifuge .- Bordeaux, Faculté de Médecine, 1938, 47 p. (thèse).

620. MARCHOUX .- Le paludisme dans les Dombes et en Camargue .- Rev. Hyg. Méd. prévent., 1919, 41 : 720-721.

621. MARCHOUX (E.) .- Influence du bien-être sur la régression du paludisme .- Bull. Soc. Path. exot., 1921, 14 (8) 455-459.

622. MARCHOUX (E.) .- Le paludisme en Corse y est fonction de la misère .- Bull. Soc. Path. exot., 1921, 14 : 654-658.

623. MARCHOUX (E.) .- Enquête sur le paludisme en Corse .- Rev. Hyg. Méd. prévent., 1925.

624. MARCHOUX (E.) .- Modes divers d'hibernation de l'Anopheles maculipennis .- Bull. Soc. Path. exot., 1925, 18 (5) 405-407.

625. MARCHOUX (E.) .- Le paludisme dans les Dombes et en Camargue .- Bull. Acad. Méd., 1927, 97 (2) 67-89.

626. MARCOU (H.) .- Les causes de l'aggravation du paludisme en Corse : les réfugiés et soldats .- Presse méd., 1922, 30.2 (66) 1380.

627. MARJOLET (M.) .- Les Culicides des zones humides de Loire Atlantique. Aspects écologiques et nuisances .- Nantes, U.E.R. de Médecine et Techniques Médicales, 1977, 168 + XII p. (thèse).

Source : MNHN, Paris

628. MARJOLET (M.) .- Une enquête sur les Culicides (Diptera, Nematocera) de Loire-Atlantique : présence au stade larvaire d'Aedes (Ochlerotatus) flavescens (Muller, 1764) et d'Aedes (Ochlerotatus) sticticus (Meigen, 1838) .- Bull. Soc. Sci. nat. Ouest France, 1978, 76 (1) 41-45.

629. MARJOLET (M.) .- Moustiques et nuisances en presqu'île guérandaise .- Bull. Soc. Sci. nat. Ouest France, 1980 (suppl. h.s.) 285-288.

630. MARTIAL, LAGRIFFOUL, CAVAILLON .- Rapport sur la prophylaxie du paludisme .- Montpellier méd., 1918, 40 (6) 154-165.

631. MARTIN (R.), CHASSIGNEUX, ROUESSE .- Un cas de paludisme autochtone au voisinage de Maison-Blanche .- Bull. Acad. Méd., 1934.

632. MARTINE (J.) .- Démoustication et écologie .- Méd. trop., 1982, 42 (5) 483-490.

633. MARZOCCHI (J.B.) .- Le paludisme en Corse : historique et aspects actuels de la lutte antipalustre .- Marseille, Faculté de Pharmacie, 1982, 208 p. (thèse).

634. MAS (J.P.) .- Etude phyto-écologique des aires culicidiennes de l'Ile de Ré .- Bordeaux, Université de Bordeaux I, 1971, 120 p. (thèse d'Université).

635. MAS (J.P.) .- Etude des milieux culicidogènes littoraux atlantiques des marais noirmoutrins à l'estuaire de la Gironde .- Bordeaux , Université de Bordeaux III, Institut de Géographie, 1976, 90 p.

636. MAS (J.P.) .- Les moustiques et leurs biotopes .- Annls Soc. Sci. nat. Charente-Maritime, 1977 (suppl. janvier) 153-159.

637. MAS (J.P.), SIMONNEAU (P.) .- Les groupements végétaux et les culicides sur le littoral charentais et vendéen .- Annls Soc. Sci. nat. Charente-Maritime, 1973, 5 (5/9) 351-378.

638. MAS (J.P.), SIMONNEAU (P.) .- Considérations sur l'établissement de la carte des aires culicidogènes sur le littoral atlantique .- Annls Soc. Sci. nat. Charente-Maritime, 1979, 6 (6) 533-544.

639. MASSOT (E.) .- Etude des gîtes d'Anophèles dans le Roussillon .- Montpellier, Faculté de Pharmacie, 1923, 86 p. (thèse).

640. MATHIS (M.) .- Biologie d'un moustique côtier du Var. Aedes desbansis Séguy 1923 .- Bull. Soc. Path. exot., 1929, 22 (3) 179-183.

641. MATHIS (M.) .- Influence du NaCl sur le déterminisme de la ponte chez le moustique côtier du Var Aedes desbansi Séguy 1923 .- Bull. Soc. Path. exot., 1934, 27 (8) 757-759.

642. MATHIS (M.) .- Biologie d'une souche de Culex pipiens autogenicus Roubaud 1933, au cours d'un élevage de vingt générations en série .- Bull. Soc. Path. exot., 1940, 33 : 201-207

643. MATHIS (M.) .- Rythme biologique saisonnier d'un moustique d'eau de mer, Aedes desbansi Séguy, 1923 .- C.R. Acad. Sci., 1940, 211 (16) 337-339.

644. MATHIS (M.) .- Considérations sur le problème de la lutte antipaludique en Corse .- Bull. Soc. Path. exot., 1960, 53 (6) 1023-1029.

645. MATTEI (M.C.) .- Un cas de paludisme autochtone .- Presse méd., 1923, 31.1 (12) 137.

646. McROUGHT .- Primary benign tertian malaria among British troops in Normandy .- Brit. med. J., 1946, 1 : 236-237.

647. MERY (A.) .- Etude de trois locus codant des enzymes chez Aedes caspius Pallas, 1771 : génétique formelle et liaisons .- Montpellier, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, 1976, 57 p. (D.E.A. Evolution et Biosystématique).

Source : MNHN, Paris

648. MERY (A.), PASTEUR (N.), GUILVARD (E.) .- Glutamate-oxaloacétate transaminase et α-glycérophosphate déshydrogénase chez le moustique Aedes (Ochlerotatus) caspius : génétique formelle et étude des populations .- Can. J. Genet. Cytol., 1979, 21 (1) 25-32.

649. METGE (G.) .- Etude synécologique de la dépression du Viguierat (Bouches-du-Rhône). Essai d'écologie quantitative en milieu hydromorphe et halophile .- Marseille, Faculté des Sciences et Techniques de St. Jérome, 1977, 464 p. (thèse d'Université).

650. METGE (G.) .- Recherche d'une méthodologie adaptée à l'étude quantitative des biocénoses appartenant aux milieux submergés permanents à Phragmites communis .- Marseille , Faculté des Sciences de St. Jérome, 1978, 93 p. (D.E.A. Ecologie méditérranéenne).

651. METGE (G.) .- Recherches sur les biocénoses hydromorphes et halophiles en milieu rural, sur l'habitat potentiel de Culex pipiens en milieu urbain dans les Bouches-du-Rhône. Essai de synthèse cartographique .- Marseille, Faculté des Sciences et Techniques de St. Jérome, 1980, 193 p. (thèse de spécialité).

652. MEUNIER (F.) .- Culicidae de l'ambre .- Rev. sci. Bourbonnais Centre France, 1902, 15.

653. MEUNIER (F.) .- Nouvelles recherches sur quelques insectes de platrières d'Aix en Provence .- Verh. Akad. Wet. Amst., 1915, 18 (5) 1-17.

654. MIARA (M.) .- Le paludisme dans le Bas-Lnaguedoc .- Montpellier, Faculté de Médecine, 1938, 64 p.

655. MIARA (M.) .- Le paludisme dans le Bas-Languedoc .- Languedoc méd., 1939, 31 (5) 195-205.

656. MIR MOAYEDI (A.N.) .- Etude histologique post-embryonnaire de l'évolution de la genèse sexuelle chez Culex pipiens autogenicus (Diptera - Culicidae) .- Toulouse, Université Paul Sabatier, 1977, 65 p.

657. MOREAU (J.P.), BIHAN-FAOU (P.), SINEGRE (G.) .- Essais de transmission transovarienne du virus Tahyna chez Aedes (O.) caspius (Pallas, 1771) .- Méd. trop., 1976, 36 (5) 441-442.

658. MORIN (C.), DUBOIS (P.), DEMAS (M.), LAHSINAT (K.), HAYET (M.), VIVIER (A.) .- Paludisme autochtone chez l'enfant .- Nouvelle Presse méd., 1980, 9 : 1241-1242.

659. MOSNY .- Paludisme d'origine parisienne .- J. Praticiens, 1899, 13 : 509.

660. MOUCHET (J.), RAGEAU (J.) .- Observations sur les moustiques de la Camargue et du Bas-Rhône. I. L'hibernation d'Uranotaenia unguiculata Edwards, 1913 (Diptère, Culicidae) .- Bull. Soc. Path. exot., 1965, 58 (2) 246-250.

661. MOUCHET (J.), RAGEAU (J.), BRENGUES (J.), SUBRA (R.) .- Observations sur la biologie et la sensibilité aux insecticides d'Anopheles melanoon subalpinus Hackett et Lewis 1935 en Camargue .- Bull. Soc. Path. exot., 1962, 55 (6) 1171-1179.

662. MOUCHET (J.), RAGEAU (J.), CHIPPAUX (A.) .- Hibernation de Culex modestus Ficalbi (Diptera, Culicidae) en Camargue .- Cah. ORSTOM, Sér. Ent. méd., 1969, 7 (1) 35-37.

663. MOUCHET (J.), RAGEAU (J.), LAUMOND (C.), HANNOUN (C.), BEYTOUT (D.), OUDAR (J.), CORNIOU (B.), CHIPPAUX (A.) .- Epidémiologie du virus West Nile : étude d'un foyer en Camargue. V. Le vecteur : Culex modestus Ficalbi (Diptera, Culicidae) .- Annls Inst. Pasteur Paris, 1970, 118 (6) 839-855.

664. MOULINIER (C.), MASS (J.P.), DUCHATELIER (B.) .- Résumé de l'étude réalisée en 1977 à la demande de l'Entente Interdépartementale par l'équipe constituée par le Professeur Moulinier, le Docteur Mass et Monsieur Duchatelier, pour la démoustication du bassin d'Arcachon .- Audenge, Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple des Communes Riveraines du Bassin d'Arcachon, 1980, 26 p.

Source : MNHN, Paris

665. MOUSSIEGT (O.) .- Culex (Barraudius) modestus Ficalbi, 1889. Bibliographie .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1978 (Doc. 38) 32 p.

666. MOUSSIEGT (O.) .- Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830). Bibliographie .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1979 (Doc. 42) 104 p.

667. MOUSSIEGT (O.) .- Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii (Ficalbi, 1889). Bibliographie .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1980 (Doc. 44) 24 p.

668. MOUSSIEGT (O.) .- Aedes (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771). Bibliographie .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1981 (Doc. 45) 58 p.

669. MOUSSIEGT (O.) .- Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830). Bibliographie - Supplément .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1982 (Doc. 46) 94 p.

670. MUNERA (M.) .- Le paludisme en France, les causes de sa disparition .- Alger, Faculté de Médecine, 1925, 125 p. (thèse).

671. MUSELLI (P.) .- Les permissionnaires d'Orient et les réveils du paludisme. Le paludisme en Corse .- Montpellier, Faculté de Médecine, 1917-18, 39 p. (thèse).

672. NADJAH (S.) .- Les problèmes pratiques de la démoustication dans le Languedoc-Roussillon .- Montpellier, Faculté de Médecine, 1951, 48 p. (thèse).

673. NEBBIA (F.) .- Etat actuel de la question du paludisme en Corse .- Marseille, Faculté de Médecine, 1935 (thèse).

674. NEVEU-LEMAIRE (M.) .- Classification de la famille des Culicides .- Mém. Sco. Zool. France, 1902, 15 : 195-227.

675. NEVEU-LEMAIRE (M.) .- Sur les réceptacles séminaux de quelques Culicides .- Bull. Soc. Zool. France, 1902, 27 : 172-177.

676. NEVEU-LEMAIRE (M.) .- Instructions relatives à la récolte des moustiques .- Arch. Méd. navale, 1903, 79 : 281-285.

677. NEVEU-LEMAIRE (M.) .- Les Anophèles et le paludisme dans les Dombes .- C.R. 35e Session Ass. Avancem. Sci., 1906, 1 ; 343-346.

678. NEVEU-LEMAIRE (M.), GRANDIDIER (G.) .- Sur la présence de Diptères Culicides (Anopheles maculipennis) dans les galeries du Muséum .- Bull. Mus. Hist. nat., 1908, 14 : 39-40.

679. NEVEU-LEMAIRE (M.), ZEMBOULIS (E.) .- Paludisme et dysenterie amibienne autochtones .- Bull. Mém. Soc. Méd. Hôp. Paris, 1919, 43 : 428-432.

680. NGUYEN (T.X.), CABES (J.L.) .- Réceptivité sexuelle de la femelle et puissance d'insémination du mâle du Culex pipiens autogenicus (Diptera, Culicidae). Cas de monogamie stricte et de polygamie occasionnelle .- C.R. Acad. Sci. D, 1977, 284 : 929-931.

681. NGUYEN (T.X.), LAUGA (J.), IBRAHIM (O.F.) .- Mise en évidence d'un gradient morphologique continu entre les formes autogène et anautogène du complexe Culex pipiens (Diptera: Culicidae) .- C. R. Acad. Sci. Paris, D, 1980, 291 : 553-556.

682. NICLOT (V.) .- Un chapitre de l'histoire du paludisme à Bordeaux; sols marécageux; population palustre; faune anophélienne .- Bull. Soc. Path. exot., 1910, 3 (9) 663-670.

Source : MNHN, Paris

683. NICLOT (V.) .- Anophélisme et paludisme en Haute Alsace .- Bull. Soc. Path. exot., 1918, 11 (10) 848-853.

684. NICOLI (R.M.), NICOLI (J.) .- Contribution à l'étude du peuplement de la Corse (12e note). Extension en Corse d'Anopheles claviger (Meigen 1804) .- Bull. Soc. ent. France, 1963, 68 (5/6) 136-140.

685. NICOLI (R.M.), NICOLI (J.) .- Extension en Corse de Culex mimeticus G. Noé, 1899 .- Bull. Soc. ent. France, 1964, 69 : 38-39.

686. NICOLI (R.M.), QUILICI (M.) .- Histoire du paludisme sur le côte orientale de la Corse .- Bull. Soc. corse Biol. hum., 1964, 2 : 37-48.

687. NICOLI (R.M.), NICOLI (J.), RIOUX (J.A.), QUILICI (M.) .- Contribution à l'étude du peuplement de la Corse (8e note). L'étude des gîtes culicidiens larvaires dans la montagne corse (Dipt.) .- Bull. Soc. ent. France, 1960, 65 (3/4) 79-84.

688. NICOLI (R.M.), NICOLI (J.), RIOUX (J.A.), QUILICI (M.) .- Les biocénoses dulcaquicoles de la Corse cristalline. Introduction à la connaissance des gîtes culicidiens dans la pièvre de Salice (Cruzzini 100-1500 m) .- Terre et Vie, 1963, 110 (2) 140-163.

689. NICOLI (R.M.), NICOLI (J.), RANQUE (J.), QUILICI (M.), LANZALAVI (P.) .- Classification des gîtes culicidiens larvaires en Corse .- Bull. Soc. ent. France, 1966, 71 (1/2) 14-17.

690. NOELDNER (E.) .- Moustiques rares ou peu connus d'Alsace .- Diptera, 1953, 11 : 5-45.

691. NOIR (J.) .- La prophylaxie du paludisme. Le rôle des poissons larvivores et en particulier de la gambusie .- Concours méd., 1934, 56 (29) 2075-2076.

692. NOIR (J.) .- Le danger des moustiques. Un marais à assainir dans la région parisienne .- Concours méd., 1935, 57 (17) 1241-1242.

693. OETTINGER (W.), DEGUIGNAND (L.) .- Un cas de fièvre tierce maligne autochtone .- Bull. Mém. Soc. Méd. Hôp. Paris, 1920, 44 : 1193-1196.

694. OHM (P.), REMMERT (H.) .- Etudes sur les rockpools des Pyrénées-Orientales .- Vie et Milieu, 1955, 6 (2) 194-209.

695. OLIVEAU (A.) .- Sur un petit foyer de paludisme reconnu pendant les années 1919-20 au centre d'aviation maritime de Saint-Raphaël (Var) .- Bull. Soc. Path. exot., 1920, 13 (9) 729-732.

696. OLIVIER (G.A.) .- Encyclopédie méthodique. Histoire naturelle. Insectes. Vol. 6 (part 1) .- Paris, Panckoucke, 1791, 368 p.

697. ORTICONI (A.) .- Les ravages du paludisme en Corse .- Bull. Soc. Path. exot., 1922, 15 (8) 683-686.

698. OUDAR (J.), JOUBERT (L.) .- Les arboviroses humaines et animales. Leurs incidences dans le midi méditerranéen de la France .- Concours méd., 1969 (19) 4051-4064.

699. OZENDA (P.) .- La cartographie écologique .- Courrier CNRS, 1977 (24) 2-10.

700. OZENDA (P.), PAUTOU (G.) ed. .- Un essai d'écologie appliquée : la démoustication de la région Rhône-Alpes .- Grenoble, Unité Scientifique et Médicale, Laboratoire de Biologie Végétale, 1971, 63 p.

701. PAGES (M.V.) .- Statut du lapin de garenne Oryctolagus cuniculus L. 1758, dans certains milieux du Languedoc .- Mém. Trav. Inst. Montpellier, 1980 (12) 112 p.

702. PAISSEAU (G.), LOUBRIEU (G.) .- Paludisme autochtone à Plasmodium praecox .- Bull. Soc. Path. exot., 1921, 14 (5) 268-273.

Source : MNHN, Paris

703. PAISSEAU (G.), LOUBRIEU (G.) .- Paludisme autochtone à Plasmodium praecox .- Paris méd., 1922, 43 (6) 117-119.

704. PANNETON (B.) .- Le paludisme en Corse : historique et actualité .- Lyon, Université Claude Bernard - Lyon I, UER Faculté de Pharmacie, 1983, 79 + V p. (thèse)

705. PANTHIER (R.), HANNOUN (C.), BEYTOUT (D.), MOUCHET (J.) .- Epidémiologie du virus West Nile. Etude d'un foyer en Camargue. III. Les maladies humaines .- Annls Inst. Pasteur, 1968, 115 (3) 435-445.

706. PAPIEROK (B.) .- Dénombrement de populations larvaires de culicides (Diptera, Culicidae). Estimations comparées de l'effectif de populations larvaires d'Aedes cataphylla Dyar et d'Aedes detritus (Haliday) dans le sud de la France, à l'aide de la méthode de "capture-marquage-recapture" et de la méthode utilisant le coup de louche ou "dipping" .- Paris, Université de Paris VI, 1972, 133 p. (thèse 3e cycle).

707. PAPIEROK (B.), CROSET (H.), RIOUX (J.A.) .- Estimation de l'effectif des populations larvaires d'Aedes (O.) cataphylla Dyar, 1916 (Diptera-Culicidae). I. Méthode de "capture-marquage-recapture" .- Cah. ORSTOM, Sér. Ent. méd. Parasit., 1973, 11 (4) 243-249.

708. PAPIEROK (B.), CROSET (H.), RIOUX (J.A.) .- Estimation de l'effectif des populations larvaires d'Aedes (O.) cataphylla Dyar, 1916 (Diptera, Culicidae). II. Méthode utilisant le "coup de louche" ou "dipping" .- Cah. ORSTOM, Sér. Ent. méd. Parasit., 1975, 13 (1) 47-51.

709. PARIS (P.) .- Quelques mots sur les moustiques et le paludisme en France .- J. Méd. Chirurg., 1917, 88 : 401-404.

710. PASCAL (L.) .- Contribution à l'étude du paludisme à Rochefort .- Bordeaux, Faculté de Médecine, 1919, 41 p. (thèse).

711. PASTEUR (N.) .- Les leucino-amino-peptidases du moustique Culex pipiens : génétique formelle d'un locus chez l'imago .- C.R. Acad. Sci., D, 1975, 280 (1) 113-116.

712. PASTEUR (N.) .- Recherches de génétique chez Culex pipiens pipiens L. Polymorphisme enzymatique, autogenèse et résistance aux insecticides organophosphorés .- Montpellier, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, 1977, VI + 170 p. (thèse).

713. PASTEUR (N.), GEORGHIOU (G.P.) .- Analysis of esterases as a mean of determining organophosphate resistance in field populations of Culex pipiens mosquitoes .- Proc. ann. Conf. Calif. Vect. Contr. Ass., 1980, 48 : 74-77.

714. PASTEUR (N.), GEORGHIOU (G.P.) .- Filter paper test for rapid determination of phenotypes with high esterase activity in organophosphate resistant mosquitoes .- Mosq. News, 1981, 41 (1) 181-183.

715. PASTEUR (N.), SINEGRE (G.) .- Esterase polymorphism and sensitivity to Dursban organophosphorus insecticide in Culex pipiens pipiens populations .- Biochem. Genet., 1975, 13 (11/12) 789-803.

716. PASTEUR (N.), SINEGRE (G.) .- Chlorpyrifos (Dursban^{R}) resistance in Culex pipiens pipiens L. from Southern France : inheritance and linkage .- Experientia, 1978, 34 : 709-710.

717. PASTEUR (N.), SINEGRE (G.) .- Autogenesis vs. esterase polymorphism and chlorpyrifos (Dursban) resistance in Culex pipiens pipiens .- Biochem. Genet., 1978, 16 (9/10) 941-943.

718. PASTEUR (N.), STORDEUR (E. de) .- L'α-glycerophosphate déshydrogénase du moustique Culex pipiens : génétique formelle, linkage et étude des populations .- Genetica, 1976, 46 : 319-326.

Source : MNHN, Paris

719. PASTEUR (N.), RIOUX (J.A.), GUILVARD (E.), PECH-PERIERES (J.) .- Nouvelle mention pour le "Midi" méditerranéen, de populations naturelles anautogènes et sténogammes de Culex pipiens pipiens L. .- Annls Parasit. hum. comp., 1977, 52 (2) 205-210.

720. PASTEUR (N.), RIOUX (J.A.), GUILVARD (E.), PECH-PERIERES (M.J.), VERDIER (J.M.) .- Existence chez Aedes (Ochlerotatus) detritus (Haliday, 1833)(Diptera-Culicidae) de Camargue de deux formes sympatriques et sexuellement isolées (espèces jumelles) .- Annls Parasit. hum. comp., 1977, 52 (3) 325-337.

721. PASTEUR (N.), SINEGRE (G.), GABINAUD (A.) .- Est-2 and Est-3 polymorphism in Culex pipiens L. from Southern France in relation to organophosphate resistance .- Biochem. Genet., 1981, 19 (5/6) 499-508.

722. PASTEUR (N.), ISEKI (A.), GEORGHIOU (G.P.) .- Genetic and biochemical studies of the highly active esterases A' and B associated with organophosphate resistance in mosquitoes of the Culex pipiens complex .- Biochem. Genet., 1981, 19 (9/10) 909-919.

723. PASTEUR VALERY-RADOT, GENIN, DURUY .- Un cas de paludisme à Paris chez un enfant de 5 ans n'ayant jamais quitté la France .- Arch. franç. Pédiatr., 1948, 5 (4) 383-385.

724. PASTICIER (A.), MECHALI (D.), SAIMOT (G.), COULAUD (J.P.), PAYET (M.) .- Paludisme autochtone. Problèmes diagnostiques .- Bull. Soc. Path. exot., 1974, 67 (1) 57-63.

725. PAUTOU (G.) .- Contribution à l'étude écologique de la plaine alluviale du Rhône entre Seyssel et Lyon .- Grenoble, Université Scientifique et Médicale, 1975, 375 p. (thèse).

726. PAUTOU (G.), AIN (G.), GILOT (B.) .- Identification et cartographie des biotopes larvaires. In Un essai d'écologie appliquée : la démoustication de la région Rhône-Alpes .- Grenoble, Université Scientifique et Médicale, Laboratoire de Biologie Végétale, 1971 : 13-29, 17 pl. h.t.

727. PAUTOU (G.), GILOT (B.), AIN (G.) .- Recherche écologique, démoustication et protection de la nature .- Nat. belge, 1973, 54 (3) 105-115.

728. PAUTOU (G.), VIGNY (F.), GRUFFAZ (R.) .- Carte des groupements végétaux de la Chautagne (Savoie) .- Doc. Carte Végét. Alpes, 1971, 9 : 79-108.

729. PAUTOU (G.), AIN (G.), GILOT (B.), NEUBURGER (M.C.) .- La prévision des mises en eau; son intérêt dans la lutte antilarvaire contre les Culicides .- Annls Station biol. Besse-en-Chandesse, 1973 (8) 311-326.

730. PAUTOU (G.), AIN (G.), GILOT (B.), COUSSERANS (J.), GABINAUD (A.), SIMONNEAU (P.) .- Cartographie écologique appliquée à la démoustication .- Doc. Cartogr. écol., 1973, 11 : 1-16, 1 carte coul. h.t.

731. PAUTOU (G.), THOMAS (J.), AIN (G.), MERIAUDEAU (R.), GILOT (B.), NEUBURGER (M.C.) .- Etude écologique des îles du Rhône entre Seyssel et Lyon. Organisation opérationnelle de la démoustication .- Grenoble, Université Scientifique et Médicale, Laboratoire de Biologie Végétale, 1972 : 54 p., h.t.

732. PAYET (M.), COULAUD (J.P.), SAIMOT (G.) .- Les arboviroses .- Gaz. méd., 1971, 78 (10) 1483-1487.

733. PAYRE (H.) .- Le paludisme en Roussillon .- Montpellier, Faculté de Médecine, 1922, 42 p.

734. PEJU (G.) .- Culicides dans les Ardennes (avec présentation d'une carte des foyers d'Anophèles) .- C.R. Soc. Biol., 1919, 82 : 1267-1269.

Source : MNHN, Paris

735. PEJU (G.) .- Foyers d'Anophèles dans les Ardennes .- Bull. Soc. Path. exot., 1920, 13 (1) 75-92.

736. PEJU (G.), CORDIER (E.) .- Epidémie palustre et conditions de l'anophélisme en Argonne .- C.R. Soc. Biol., 1918, 81 : 1039-1041.

737. PEJU (G.), CORDIER (E.) .- Paludisme et topographie anophélienne en Argonne à propos d'une épidémie de paludisme autochtone .- Bull. Soc. Path. exot., 1919, 12 : 23-24.

738. PENE (P.), BOURGEADE (A.) .- Les arboviroses observées en France .- Rev. Praticien, 1979, 29 (27) 2229-2235.

739. PENE (P.), DELMONT (J.) .- Les paludismes observés en France .- Concours méd., 1981, 103 (21) 3469-3482.

740. PERDRIEL (G.F.J.) .- Sur un essai de lutte contre les moustiques de la base aéronavale d'Hyères .- Bordeaux, Faculté de Médecine, 1946, 33 p. (thèse).

741. PERRIER .- Paludisme autochtone .- J. Pratic., 1917 : 672.

742. PERRIER (R.) .- La faune de France illustrée. VIII. Diptères .- Paris, Delagrave, 1963, 216 p. (Culicidés, pp. 61-63).

743. PERRIN .- Paludisme autochtone à Plasmodium falciparum .- Rev. Méd. Est, 1923, 51 : 120-122.

744. PESSON (B.), LEGER (N.), FERRAND (G.), VANDAMME (R.) .- Cent ans après Laveran : le paludisme à Paris. II. Les prévenus, anophèles autochtones .- Cah. ORSTOM, Sér. Ent. méd. Parasit., 1980, 18 (2) 179.

745. PETIT (G.), SCHACHTER (D.) .- La Camargue. Etude écologique et faunistique .- Annls Biol., 1954, 30 : 192-253.

746. PETIT (G.), TOURNAIRE (P.) .- Sur la répartition des gîtes d' Anophèle dans l'arrondissement de Bergerac (Dordogne) .- Bull. Soc. Path. exot., 1919, 12 (6) 332-339.

747. PICHERAL (H.) .- Le dernier foyer français de paludisme. In Espace et Santé. Géographie médicale du Midi de la France .- Montpellier, Paysans du Midi, 1976 : 111-115.

748. PICHOT (J.) .- Recherches sur les Culicidae de la Dombes. Etude faunistique - Ecologie larvaire .- Saint-Etienne, Université Claude Bernard, U.E.R. de Biologie Humaine, 1978, 271 p. (thèse)

749. PICHOT (J.), DERUAZ (D.) .- Les Anopheles du complexe maculipennis dans la région lyonnaise .- Lyon méd., 1981, 245 (n° hors série) 117-121.

750. PIERANGELI (H.) .- Le paludisme en Corse .- Paris, Rousseau ed., 1907, 61 p.

751. PIERMONT (L.) .- Problèmes écologiques liés au contrôle des populations de Culicidés dans la région Rhône-Alpes .- Grenoble, Université Scientifique et Médicale, 1976, 65 p. (thèse).

752. PIERRET (R.) .- Le paludisme autochtone en France depuis la guerre .- Echo méd. Nord, 1921, 25 : 334.

753. PIET (P.) .- Quelques chiffres à propos du paludisme indigène .- J. Sci. méd. Lille, 1921, 39 (18) 321.

754. PIPONNIER (M.) .- Le petit peuple des ruisseaux .- Paris, Bourrelier ed., 1950, 131 p. (moustiques p. 51-58).

755. PITON (L.) .- Addition à la faune entomologique des cinerites du lac Chambon (Puy-de-Dôme) .- Rev. sci. Bourbonnais, 1936 : 16-24.

756. PITTI-FERRANDI (F.) .- Le paludisme et l'assainissement des régions palustres en Corse .- Paris, Faculté de Médecine, 1901, 62 p. (thèse).

Source : MNHN, Paris

757. PITTI-FERRANDI (F.), SAUTET (J.) .- Anophélisme sans paludisme dans un village corse en montagne .- Rev.Méd. Hyg. trop., 1934, 26 (novembre) (6 p.).

758. PLICQUE (A.F.) .- Les moustiques transmetteurs de maladies et la destruction des oiseaux .- Gaz. hebd. Sci. méd. Bordeaux, 1924, 45 : 683-685.

759. PLOMB (C.M.L.) .- De la transmission du paludisme à l'homme par les moustiques (revue générale) .- Bordeaux, Faculté de Médecine, 1899, 72 p.

760. POLAILLON (H.) .- Contribution à l'histoire naturelle et médicale des moustiques .- Paris, Faculté de Médecine, 1901, 126 p. (thèse).

761. PORRY .- L'index du paludisme en France et dans les colonies françaises .- Paris, Faculté de Médecine, 1919-20, 89 p. (thèse).

762. POUCHET (F.A.) .- Sur l'appareil digestif du cousin (Culex pipiens L.) .- C.R. Acad. Sci., 1847, 25 (17) 589-591.

763. PRINGAULT (E.) .- Les Culicidés de la région marseillaise .- Marseille méd., 1918, 55 912-916.

764. PRINGAULT (E.) .- Capture dans les Bouches-du-Rhône de Theobaldia spathipalpis (Rondani) .- Bull. Soc. Path. exot., 1921, 14 (3) 163-164.

765. PRINGAULT (E.) .- Paludisme et anophélisme dans les Bouches-du-Rhône .- Marseille méd., 1921, 58 (6) 241-247.

766. PUECH (M.) .- Contribution aux recherches de cartographie épidémiologique : étude écologique des populations de Culicides adultes en rapport avec la myxomatose dans la région Rhône-Alpes .- Grenoble, Université Scientifique et Médicale, 1980, 162 p. (thèse 3e cycle).

767. PUECH (M.), GILOT (B.), GIREL (J.) .- Cartographie appliquée à la détection des populations de Culicides adultes au moment de leur activité trophique (Courtenay, Isère, juillet 1979). In Les milieux aquatiques de lisière dans la vallée du Rhône en amont de Lyon.- Paris, Ministère de l'Environnement, Comité "Faune et Flore", Tome II 1981.

768. QUILICI (M.) .- Contribution à l'étude de la sensibilité aux insecticides d'Anopheles maculipennis dans la région de Porto-Vecchio .- Bull. Soc. Path. exot., 1959, 52 (6) 733-736.

769. QUILICI (M.) .- Les méthodes de contrôle de l'endémie palustre. L'exemple de la Corse pays de régression .- Marseille, Faculté de Médecine, 1961, 53 p. (thèse).

770. QUILICI (M.), NICOLI (R.M.) .- Les méthodes de contrôle de l'endémie palustre .- Bull. Soc. corse Biol. hum., 1964, 2 : 67-69.

771. QUILLIOT .- Le paludisme en Corse .- Paris, Faculté de Médecine, 1952 (thèse).

772. RAGEAU (J.), MOUCHET (J.) .- Les arthropodes hématophages de Camargue .- Cah. ORSTOM, Sér. Ent. méd., 1967, 5 (4) 263-281.

773. RAGEAU (J.), MOUCHET (J.), ABONNENC (E.) .- Répartition géographique des moustiques (Diptera: Culicidae) en France .- Cah. ORSTOM, Sér. Ent. méd. Parasit., 1970, 8 (3) 289-316.

774. RAGEAU (J.), MOUCHET (J.), ABONNENC (E.) .- Répartition géographique des moustiques (Diptera: Culicidae) en France. In XIII International Congress of Entomology. Moscow, 2-9 August 1968. Proceedings. Volume III .- Leningrad, Nauka, 1972 : 230-232.

775. RAMBAUD (J.P.) .- Etude météorologique du site de Mauguio (Hérault) appliquée à la dynamique des populations culicidiennes .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1977 (Doc. 37) 55 p.

Source : MNHN, Paris

776. RANKIN (A.C.), McGILL (C.M.) .- Simple tertian malaria in French Flanders .- Lancet, 1916, 190 (4839) 1079-1080.

777. RANQUE (J.), DEPIEDS (R.), MOIGNOUX (J.B.) .- Comparaison entre les foyers actuels de filariose canine à Dirofilaria immitis et les anciennes zones de paludisme humain de la côte provencale .- Rev. Path.gén. comp., 1953, 53 (652) 1313-1316.

778. RANQUE (J.), RIOUX (J.A.), QUILICI (M.), RANQUE (P.), NICOLI (R.M.) .- Anophélisme et indice splénique dans le site de Porto-Vecchio (Corse) durant l'été 1959 .- Bull. Soc Path. exot., 1959, 52 : 808-819.

779. RATHERY (F.), MICHEL (R.) .- Le paludisme dans un coin des Flandres .- Paris méd., 1916, 19 (17) 394-402.

780. RATHERY (F.), DEROT (M.), BRUMPT (L.C.), SIGUIER (F.) .- Deux cas de fièvre tierce bénigne. Etude épidémiologique d'un foyer de paludisme autochtone à la Croix de Berny .- Bull. Mém. Soc. Méd. Hôp., 1940, 56 : 780-787.

781. RAVAUT (P.) .- Comment peut se développer en France un foyer de paludisme autochtone ? .- Paris méd., 1918, 27 (12) 232-234.

782. RAYMOND (V.) .- Paludisme autochtone .- Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, 1917, 41 : 1167-1169.

783. RAYMOND (V.), GRYSEZ (V.) .- Paludisme autochtone, 4 cas .- Presse méd., 1917, 25 (50) 523.

784. REAUMUR (R. de) .- Histoire des cousins. In Mémoires pour servir à l'histoire des insectes. Tome quatrième .- Paris, Imprimerie Royale, 1738 : 573-636.

785. REGNAULT (F.) .- La propagande contre le paludisme en Corse .- J. Praticiens, 1918, 32 : 74-76.

786. REGNAULT (F.) .- La capture des lentilles d'eau dans la lutte contre le paludisme .- Bull. Soc. Path. exot., 1919, 12 (10) 735-736.

787. REGNAULT (F.) .- A propos du paludisme en Corse .- Bull. Soc. Path. exot., 1922, 15 (10) 935-936.

788. REGNAULT (F.) .- Le paludisme en Corse .- Bull. Soc. Méd. Hyg. trop., 1923.

789. REID (J.M.H.), HUMPHRYS (H.E.) .- Malaria contracted in Flanders .- Brit. med. J., 1915, 2 : 603.

790. REMMERT (H.) .- Les diptères des côtes méditerranéennes de France et d' Espagne .- Vie et Milieu, 1953, 4 (3) 540-546.

791. REMMERT (H.) .- Diptères provenant de la France méridionale et de l'Espagne, récoltés du 1er septembre au 10 octobre 1952 .- Vie et Milieu, 1953, 4 (3) 561-563.

792. RICHE (F.) .- Evaluation du risque paludéen en France .- Marseille, Faculté de Médecine, 1979 (thèse).

793. RIEUX (M.) .- Le paludisme autochtone .- Arch. Méd. Pharm. milit., 1918, 69 : 559-569.

794. RIMBAUD (L.), ANSELME-MARTIN (G.), MAS (P.) .- Considérations sur quelques cas de paludisme autochtone .- Arch. Soc. Sci. méd. biol. Montpellier Languedoc médit., 1933-34 (3) 129-135.

795. RIOUX (J.A.) .- Extension de l'aire de répartition d'Anopheles hyrcanus Pallas 1771 en Camargue .- Annls Parasit. hum. comp., 1953, 28 (1/2) 127-128.

796. RIOUX (J.A.) .- Uranotaenia unguiculata Edw. et Anopheles hyrcanus Pall. en Bas Languedoc .- Cah. Naturalistes, 1954, 9 (4) 73-74.

Source : MNHN, Paris

797. RIOUX (J.A.) .- Les Culicides du "Midi" méditerranéen. Etude systématique et écologique .- Paris, Lechevalier, 1958, 304 p.

798. RIOUX (J.A.) .- Présence d'Aedes (Ochlerotatus) refiki Medschid 1928 dans le Midi de la France .- Annls Parasit. hum. comp., 1965, 40 (1) 125-126.

799. RIOUX (J.A.), ACHARD (F.) .- Entomophytose mortelle à Saprolegnia diclina Humphrey 1892 dans un élevage d'Aedes berlandi .- Vie et Milieu, 1956, 7 (3) 326-337.

800. RIOUX (J.A.), ARNOLD (M.) .- Les moustiques du Jardin des Plantes de Montpellier .- Annls Soc. Hort. Hist. nat. Hérault, 1954, 94 : 73-75.

801. RIOUX (J.A.), ARNOLD (M.) .- Les Culicides de Camargue (étude systématique et écologique) .- Terre et Vie, 1955, 102 (4) 242-286.

802. RIOUX (J.A.), MAISTRE (O.) .- Une nouvelle station française d'Aedes pulchritarsis Rondani 1872 (Diptera, Culicidae) .- Cah. Natur., 1960, 16 (4) 87-89.

803. RIOUX (J.A.), NICOLI (M.) .- Anopheles maculipennis subalpinus et Orthopodomyia pulchripalpis, Culicides nouveaux pour la Corse (Diptera, Culicidae) .- Cah. Natur., 1959, 15 (3) 73-74.

804. RIOUX (J.A.), NICOLI (M.) .- Sur l'écologie des Diptères Culicides. IV. Tolérance des larves d'Aedes mariae Sergent aux variations de concentration haline .- Bull. Soc. Hist. nat. Hérault, 1960 : 21-25.

805. RIOUX (J.A.), PECH (J.) .- A propos de la biosystématique du complexe Culex pipiens. Perspectives nouvelles .- C.R. Congr. Soc. savantes, 1958, 83 : 597-609.

806. RIOUX (J.A.), PECH (J.) .- Le biotype autogène de Culex pipiens L. ne doit pas être nommé Culex molestus Forskal (Diptera, Culicidae) .- Cah. Natur., 1959, 15 : 115-117.

807. RIOUX (J.A.), PECH (J.) .- Apparition de l'autogenèse dans un élevage de Culex pipiens berbericus Roubaud .- C.R. Soc. Biol., 1961, 155 (2) 343-344.

808. RIOUX (J.A.), ROUX (J.) .- Aedes (Stegomyia) vittatus (Bigot) 1861 dans les basses Cévennes .- Vie et Milieu, 1957, 8 (3) 336.

809. RIOUX (J.A.), RUFFIE (J.) .- Présence d'Anopheles maculipennis (sp. subalpinus)(Hackett et Lewis, 1937) en Bas-Languedoc. Intérêt des méthodes caryosystématiques et statistiques .- Bull. Soc. Path. exot., 1957, 50 (5) 831-837.

810. RIOUX (J.A.), RUFFIE (J.), JARRY (D.) .- Contribution à l'étude biométrique de Theobaldia (Culicella) litorea Shute (1928) .- Montpellier méd., 1956, 99 (5) 473-479.

811. RIOUX (J.A.), SICART (M.), RUFFIE (J.) .- Etude cytogénétique des Anophèles du "complexe maculipennis" dans le sud de la France .- C.R. Séances Soc. Biol., 1958, 152 (1) 181-182.

812. RIOUX (J.A.), RUFFIE (J.), PECH (J.) .- Evolution des idées en entomologie médicale (le problème du "complexe maculipennis") .- Biol. méd., 1959, 48 (3) 215-237.

813. RIOUX (J.A.), LLORY (J.), PECH (J.) .- Sur l'écologie des Diptères Culicidés. V. Typologie des milieux dendrolimniques .- C.R. Congr. Soc. savantes, 1961, 86 : 751-756.

814. RIOUX (J.A.), PECH (J.), BRES (A.) .- Transmission et conservation expérimentales du virus myxomateux par Culex pipiens berbericus Roubaud .- Arch. Inst. Pasteur Tunis, 1963, 40 (2) 111-114.

815. RIOUX (J.A.), SINEGRE (G.), CROSET (H.) .- Un Culicide nouveau pour la France, Culex (Neoculex) martinii Medschid 1930 (Diptera: Culicidae) .- Vie et Milieu, Sér. C, 1965, 16 (2) 1007-1011.

Source : MNHN, Paris

816. RIOUX (J.A.), CROSET (H.), GRAS (G.), JUMINER (B.), TESSON (G.) .- Les problèmes théoriques et pratiques posés par la lutte contre Culex pipiens L. dans le sud de la France .- Arch. Inst. Pasteur Tunis, 1965, 42 (3/4) 473-502.

817. RIOUX (J.A.), CROSET (H.), SINEGRE (G.) .- Présence de Mansonia (Coquillettidia) richiardii (Ficalbi) dans le "Midi" méditerranéen (Diptera-Culicidae) .- Cah. Natur., 1966, 22 (3) 94-96.

818. RIOUX (J.A.), SINEGRE (G.), CROSET (H.), GABINAUD (A.) .- Anopheles (A.) algeriensis Theobald, 1903 en Languedoc méditerranéen .- Annls Parasit. hum. comp., 1966, 41 (1) 91-100.

819. RIOUX (J.A.), CROSET (H.), CORRE (J.J.), SIMONNEAU (P.), GRAS (G.) .- Les bases phytoécologiques de la lutte anticulicidienne. Cartographie des biotopes larvaires. Ses applications opérationnelles dans le "Midi" méditerranéen .- Annls Parasit. hum. comp., 1967, 42 (6) 665-680.

820. RIOUX (J.A.), CROSET (H.), CORRE (J.J.), SIMONNEAU (P.) .- Les bases phytoécologiques de la lutte anticulicidienne dans le Midi méditerranéen .- Arch. Inst. Pasteur Tunis, 1967, 44 : 429-442.

821. RIOUX (J.A.), CROSET (H.), SUQUET (P.), TOUR (S.) .- Essai de marquage par le phosphore radioactif P32 pour l'estimation absolue des populations larvaires de Culicides (Diptera-Culicidae) .- Vie et Milieu, 1968, 19 (1C) 55-62.

822. RIOUX (J.A.), CROSET (H.), CORRE (J.J.), SIMONNEAU (P.), GRAS (G.) .- Phyto-ecological basis of mosquito control : cartography of larval biotopes .- Mosq. News, 1968, 28 (4) 572-582.

823. RIOUX (J.A.), CROSET (H.), GABINAUD (A.), PAPIEROK (B.), BELMONTE (A.) .- Hérédité monofactorielle de l'autogenèse chez Aedes (Ochlerotatus) detritus (Haliday, 1833)(Diptera-Culicidae) .- C.R. Acad. Sci., 1973, 276 (6) 991-994.

824. RIOUX (J.A.), COUSSERANS (J.), CROSET (H.), GABINAUD (A.) .- Présence du caractère autogène dans les populations d'Aedes (O.) detritus (Haliday, 1833) du midi méditerranéen et de la Corse .- Annls Parasit. hum. comp., 1974, 49 (1) 129-130.

825. RIOUX (J.A.), COUSSERANS (J.), CROSET (H.), BEN OSMAN (F.), GABINAUD (A.), SINEGRE (G.), BELMONTE (A.) .- Présence du caractère autogène chez Aedes pullatus (Coquillett, 1904) et nouvelles localisations géographiques pour Aedes caspius (Pallas, 1771), Aedes mariae (Sergent et Sergent, 1903), Aedes detritus (Haliday, 1833) et Culiseta subochrea Edwards, 1921) .- Annls. Parasit. hum. comp., 1975, 50 (1) 131-142.

826. RIOUX (J.A.), CALLOT (J.), LAMBERT (M.), PERIERES (J.), BELMONTE (A) .- Présence du caractère autogène dans une population d'Aedes (O.) dorsalis (Meigen, 1830) de Lorraine .- Annls Parasit. hum. comp., 1980, 55 (6) 730.

827. RIST, ROLLAND .- Un cas de paludisme autochtone .- Presse méd., 1915, 23 (51) 422.

828. RIVET (L.) .- Sur quelques cas de paludisme autochtone .- Presse méd., 1923, 31.2 (76) 805-866.

829. ROBERT (J.) .- Le paludisme autochtone dans la région parisienne .- Paris, Faculté de Médecine, 1940, 35 p.

830. ROBINEAU-DESVOIDY (J.B.) .- Essai sur la tribu des Culicines .- Mem. Soc. Hist. nat. Paris, 1827, 3 : 390-413.

831. ROBLIN .- Foyer de paludisme autochtone en Seine-et-Marne .- Bull. Soc. Path. exot., 1919, 12 (9) 605-607.

832. ROCHAIX (A.) .- La régression et l'extinction spontanée de l'endémie palustre dans la plaine du Forez .- Rev. Hyg., 1935, 57 (3) 161-172.

Source : MNHN, Paris

833. ROCHE (L.) .- Les maladies qui se transforment et les maladies qui s'en vont. La paludisme en Puysaye .- Bull. Acad. Méd., 1899, 41 (21) 524-529.

834. ROCHEDIEU (J.V.) .- Le paludisme en Alsace .- Strasbourg, Faculté de Médecine, 1952.

835. RODHAIN (F.), CHARMOT (G.) .- Evaluation des risques de reprise de transmission du paludisme en France .- Med. Malad. infect., 1982, 12 (4) 231-236.

836. RODHAIN (F.), HANNOUN (C.).- Present status of arboviruses in France .- Zentbl. Bakteriol. Mikrobiol. Hyg. I. Abt., 1980 (suppl. 9) 111-114.

837. RODHAIN (F.), ROZE (J.M.) .- La répartition géographique actuelle du paludisme .- Rev. Pratic., 1977, 27 : 2347-2372.

838. ROGER (H.) .- Paludisme autochtone et paludisme importé .- Marseille méd., 1918, 55 824.

839. ROMAN (E.) .- Les moustiques de l'hopital de Grange-Blanche. Rapport présenté au Conseil Général d'Administration des hospices civils de Lyon à l'occasion des recherches effectuées durant l'été 1934 .- Lyon, Bosc et Riou imp., 1935, 28 p.

840. ROMAN (E.) .- Sur l'amplitude de vol chez Culex pipiens .- Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1936, 5 (2) 24-25.

841. ROMAN (E.) .- Le problème hygiénique des moustiques urbains .- Rev. Hyg., 1936, 58 (2) 102-112.

842. ROMAN (E.) .- Sur les premiers états (larve et nymphe) d'Aedes sticticus Meig. .- Bull. Soc. ent. France, 1936, 41 (10) 199-202.

843. ROMAN (E.) .- Les moustiques du quartier de la Préfecture .- Lyon, Bosc et Riou impr., 1936, 16 p.

844. ROMAN (E.) .- Sur quelques Arthropodes vulnérants récoltés en Camargue .- Bull. Soc. ent. France, 1937, 42 (9) 131-136.

845. ROMAN (E.) .- Sur la biologie des moustiques fluviatiles. Considérations sur les méthodes de lutte à leur opposer .- Avenir méd., 1938 (7) 211-216.

846. ROMAN (E.) .- Moustiques arboricoles de la région lyonnaise. La larve et la nymphe d'Aedes pulchritarsis .- J. Méd. Lyon, 1939, 20 (460) 153-160.

847. ROMAN (E.) .- Sur quelques moustiques rares de la région lyonnaise .- Bull. Soc. ent. France, 1940, 45 (6) 69-72.

848. ROMAN (E.) .- Un Aedes nouveau pour la France. Localités inédites de moustiques peu répandus .- Bull. Soc. ent. France, 1944, 49 (3) 35-36.

849. ROMAN (E.) .- Compte rendu d'une excursion linnéenne en Bas Dauphiné .- Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1948, 17 (7) 142.

850. ROMAN (E.) .- Compte rendu de l'excursion en Dombes du 23 mai 1948. Communes de St Marcel et de Birieux (Ain). Excursion dans les monts du lyonnais le 13 juin 1948 .- Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1949, 18 (1) 12-13.

851. ROMAN (E.) .- Compte rendu d'une excursion linnéenne .- Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1950, 19 (5) 108.

852. ROMAN (E.) .- Observations biologiques sur quelques moustiques du genre Aedes de la région lyonnaise (Diptères Culicidae) .- Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1952 (3) 54-56.

853. ROMAN (E.) .- Eclosion sur substrat humide des pontes de moustique citadin .- C.R. Soc. Biol., 1952, 146 : 1336.

Source : MNHN, Paris

854. ROMAN (E.) .- Pullulation anormale dans le bassin de la Drome de moustiques d'automne agressifs en plein air (Diptères Culicidés) .- Bull. Soc. linn. Lyon, 1954, 23 (8) 214-216.

855. ROMAN (E.) .- Contribution à la répartition en France des Diptères de la famille des Culicidae. Gîtes larvaires particuliers de quelques uns d'entre eux .- Annls Parasit. hum. comp., 1958, 33 (1/2) 115-130.

856. ROMAN (E.) .- Elevage en série du moustique citadin, Culex pipiens autogenicus (Diptère-Culicidae) .- Bull. Soc. ent. France, 1960, 65 (9/10) 281-287.

857. ROMAN (E.) .- Biologie des adultes d'Anopheles maculipennis messeae en Dombes .- Bull. Soc. Path. exot., 1963, 56 (3) 512-519.

858. ROMAN (E.) .- Présence d'Aedes (Ochlerotatus) cataphylla Dyar (Diptères Culicidae) dans le Jura plissé .- Bll. mens. Soc. linn. Lyon, 1963, 32 (5) 148-149.

859. ROMAN (E.) .- Sensibilité au DDT des larves du moustique citadin à Lyon de 1945 à aujourd'hui; durée de résistance de ces formes jeunes maintenues à l'abri des insecticides .- Bull. Soc. Path. exot., 1966, 59 (3) 376-384.

860. ROMAN (E.) .- Sensibilité au stade larvaire des souches lyonnaises de Culex pipiens autogène à quelques insecticides organophosphorés actuels .- Bordeaux méd., 1968, (10) 1951-1952.

861. ROMAN (E.) .- Observations sur les préférences trophiques de l'anophèle le plus fréquent en Dombes .- Bull. Soc. Sci. vét. Méd. comp., 1971, 73 (3) 281-290.

862. ROMAN (E.) .- Comportement de repos des adultes du moustique Anopheles maculipennis messeae en Dombes, au cours de la belle saison et de l'hibernation .- Cah. Natur., 1971, 27 (4) 73-85.

863. ROMAN (E.), AHRARY (F.A.) .- Les moustiques à Lyon et dans ses environs. Perspectives de lutte pour les années à venir .- J. Méd. Lyon, 1969, 50 (1168-1169) 1113-1119.

864. ROMAN (E.), AHRARY (F.A.) .- Le genre Mansonia dans la région lyonnaise (Diptères Culicidae) .- Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1970, 39 (7) 236-238.

865. ROMAN (E.), MOREL (P.) .- Moustiques de l'ouest savoyard .- Bull. Soc. Path. exot., 1946, 29 (9/10) 372-376.

866. ROMAN (E.), NETIEN (G.) .- Action physiologique sur les larves de moustiques du Derris elliptica Benth .- Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1939, 8 (3) 74-79.

867. ROMAN (E.), PICHOT (J.) .- Variations, pendant un quart de siècle, de la sensibilité au DDT des larves de Culex pipiens autogène à Lyon et dans les environs .- C.R. Acad. Sci. Paris, D, 1972, 274 : 1187-1189.

868. ROMAN (E.), PICHOT (J.) .- Variation de la sensibilité aux insecticides chlorés des larves du moustique citadin lyonnais depuis leur utilisation pour la lutte contre cet insecte .- Rev. Inst. Pasteur Lyon, 1972, 5 (4) 387-401.

869. ROMAN (E.), PICHOT (J.) .- Le moustique Culiseta alaskaensis alaskaensis (Diptera-Culicidae) en Dombes .- Annls Parasit. hum. comp., 1974, 49 (4) 501-504.

870. ROMAN (E.), PICHOT (J.) .- Gynandromorphisme chez Culiseta morsitans .- Bull. Soc. ent. France, 1976, 81 (3/4) 75-83.

871. ROMAN (E.), PICHOT (J.) .- Dipteres Culicidae de la faune lyonnaise : moustiques nouveaux, renseignements complémentaires sur certains déjà signalés .- Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1976, 45 (2) 57-60.

872. ROMAN (E.), PICHOT (J.) .- Procédé de double-montage pour l'obtention de belles préparations de moustiques desséchés .- Entomologiste, 1977, 33 : 183-185.

Source : MNHN, Paris

873. ROMAN (E.), VIOLET (P.), DUMARCHEY (G.) .- Principes de lutte contre le moustique citadin .- Rev. Hyg. Méd. sociale, 1962, 10 (8) 640-651.

874. ROMAN (E.), VIOLET (P.), DUMARCHEY (G.) .- La lutte contre le moustique citadin à Lyon .- Lyon méd., 1963 (13) 748-757.

875. ROMAN (E.), VIOLET (P.), RINAUDO .- Existence à Lyon de moustiques citadins à larves D.D.T.-résistantes .- Lyon méd., 1954, 192 (30) 89-92.

876. ROSENTHAL (G.), BLOCH (S.) .- Paludisme autochtone. Aortite subaigue paludienne. Injections intraveineuses de quinine. Régression des symptomes .- Bull. Mém. Soc. méd. Hôp. Paris, 1918, 42 : 166.

877. ROUBAUD (E.) .- Présentation d'un Anopheles maculipennis capturé à Paris .- Bull. Soc. Path. exot., 1916, 9 (4) 203.

878. ROUBAUD (E.) .- Cas de paludisme autochtone contracté dans l'Aisne .- Bull. Soc. Path. exot., 1917, 10 (3) 171.

879. ROUBAUD (E.) .- Capture .- Bull. Soc. Path. exot., 1917, 10 (8) 679.

880. ROUBAUD (E.) .- Nouveau cas de paludisme contracté sur le front français .- Bull. Soc. Path. exot., 1917, 10 : 706.

881. ROUBAUD (E.) .- Les Anophèles des régions non palustres sont-ils aptes à la transmission du paludisme .- C.R. Acad. Sci., 1917, 165 (12) 401-403.

882. ROUBAUD (E.) .- Disparition du pouvoir infectant chez l'Anophèle paludéen au cours de l'hibernation .- C.R. Acad. Sci., 1918, 166 (6) 264-266.

883. ROUBAUD (E.), Rythmes physiologiques et vol spontané chez l'A. maculipennis .- C.R. Acad. Sci., 1918, 167 (24) 967-969.

884. ROUBAUD (E.) .- Recherches sur la transmission du paludisme par les Anophèles français de régions non palustres (Yonne et région parisienne) .- Annls Inst. Pasteur, 1918, 32 (9) 430-462.

885. ROUBAUD (E.) .- Antagonisme du bétail et de l'homme dans la nutrition de l'Anopheles maculipennis. Le rôle antipaludique du bétail domestique .- C.R. Acad. Sci., 1919, 169 (10) 483-486.

886. ROUBAUD (E.) .- Les conditions de nutrition des Anophèles en France (Anopheles maculipennis) et le rôle du bétail dans la prophylaxie du paludisme .- Annls Inst. Pasteur, 1920, 34 (4) 181-228.

887. ROUBAUD (E.) .- La différenciation des races zootropiques d'Anophèles et la régression spontanée du paludisme .- Bull. Soc. Path. exot., 1921, 14 (9) 577-595.

888. ROUBAUD (E.) .- Le bien-être dans le paludisme et les maladies à Tripanosomes .- Bull. Soc. Path. exot., 1921, 14 (10) 662-665.

889. ROUBAUD (E.) .- Les Anophèles de Corse .- C.R. Soc. Biogéogr., 1923, 1 : 69.

890. ROUBAUD (E.) .- Les désharmonies de la fonction rénale et leurs conséquences biologiques chez les moutiques. Les faits et leurs applications .- Annls Inst. Pasteur, 1923, 37 (7) 627-679.

891. ROUBAUD (E.) .- Sur les conditions physiologiques du zootropisme chez les moustiques .- C.R. Acad. Sci., 1923, 177 (21) 1066-1068.

892. ROUBAUD (E.) .- Sur quelques phénomènes peu connus de la vie du moustique .- Bull. Soc. Path. exot., 1926, 19 (4) 259-260.

893. ROUBAUD (E.) .- L'emploi des poudres larvicides légères dans la lutte contre les moustiques .- Bull. Soc. Path. exot., 1927, 19 (4) 287-302.

Source : MNHN, Paris

894. ROUBAUD (E.) .- Les formes diverses de l'hétérodynamie chez les insectes à plusieurs générations .- Bull. Soc. ent. France, 1927 (4) 61-64.

895. ROUBAUD (E.) .- Nouvelles recherches sur l'évolution zoophile des faunes d'Anopheles en Europe (A. maculipennis) d'après les données de l'armement maxillaire .- Annls Inst. Pasteur, 1928, 42 : 553-619.

896. ROUBAUD (E.) .- Sur l'inaptitude du Plasmodium praecox à l'évolution hivernale chez Anopheles maculipennis et ses conséquences épidémiologiques pour l'Europe septentrio - nale .- C.R. Acad. Sci. Paris, 1928, 186 (5) 329-331.

897. ROUBAUD (E.) .- Cycle autogène d'attente et générations hivernales suractives inapparentes chez le moustique commun, Culex pipiens L. .- C.R. Acad. Sci., D, 1929, 188 735-738.

898. ROUBAUD (E.) .- Suspension évolutive et hibernation larvaire obligatoire, provoquées par la chaleur, chez le moustique commun, Culex pipiens L. Les diapauses vraies et les pseudo-diapauses chez les insectes .- C.R. Acad. Sci., D, 1930, 190 (5) 324-326.

899. ROUBAUD (E.) .- Sur l'existence des races biologiques génétiquement distinctes chez le moustique commun, Culex pipiens .- C.R. Acad. Sci., D, 1930, 191 (25) 1386-1388.

900. ROUBAUD (E.) .- Recherches expérimentales sur les générations et les phases biologiques de l'Anopheles maculipennis .- Riv. Malariol., 1931, 10 (1) 3-44.

901. ROUBAUD (E.) .- Nouvelle contribution à l'étude du zootropisme anophélien (A. maculipennis) .- Bull. Soc. Path. exot., 1931, 24 (3) 229-246.

902. ROUBAUD (E.) .- Sur l'autogenèse chez Culex pipiens .- Bull. Soc. Path. exot., 1931, 24 (13) 383-387.

903. ROUBAUD (E.) .- Les phénomènes d'histolyse larvaire post-nymphale et d'alimentation imaginale autotrophe chez le moustique commun, Culex pipiens .- C.R. Acad. Sci., 1932 , 194 (4) 389-391.

904. ROUBAUD (E.) .- Les races trophiques de l'Anopheles maculipennis décelées par les élevages expérimentaux comparés .- C.R. Acad. Sci., 1932, 194 (19) 1694-1696.

905. ROUBAUD (E.) .- Essai synthétique sur la vie du moustique commun (Culex pipiens) .- Annls Sci. nat., Zool., 1933, 16 : 5-168.

906. ROUBAUD (E.) .- Aperçus expérimentaux sur les races trophiques et biologiques de l' Anopheles maculipennis. In Ve Congrès International d'Entomologie. Paris, 18-24 juillet 1932. II Travaux .- Paris, 1933 : 715-733.

907. ROUBAUD (E.) .- Etude du comportement sexuel comme caractère génétique chez l'Anopheles maculipennis (2e note) .- Bull. Soc. Path. exot., 1934, 27 (4) 339-341.

908. ROUBAUD (E.) .- Un type racial nouveau de l'Anopheles maculipennis .- Bull. Soc. Path. exot., 1934, 27 (8) 737-740.

910. ROUBAUD (E.) .- Observations sur la fécondité des Anophélinés .- Bull. Soc. Path. exot., 1934, 27 (9) 853-854.

911. ROUBAUD (E.) .- Au sujet des différenciations raciales chez le moustique commun, Culex pipiens L. .-Annls Parasit. hum. comp., 1934, 12 : 337-339.

912. ROUBAUD (E.) .- Races et sous-espèces physiologiques chez le moustique commun Culex pipiens. Titres et travaux scientifiques .- Laval, Barnéoud impr., 1935 : 137-141.

913. ROUBAUD (E.) .- La microstructure du flotteur de l'oeuf dans les races biologiques de Culex pipiens L. .- Bull. Soc. Path. exot., 1935, 28 : 443-445.

914. ROUBAUD (E.) .- Le nettoiement des surfaces d'eau par les larves d'Anopheles .- Bull. Soc. Path. exot., 1936, 29 (6) 688-691.

Source : MNHN, Paris

915. ROUBAUD (E.) .- Principes et possibilités de la prophylaxie animale du paludisme .- Arch. Inst. Pasteur Tunisie, 1937, 26 (4) 625-664.

916. ROUBAUD (E.) .- Variations de l'oeuf chez l'Anopheles maculipennis (biotype atroparvus) .- Bull. Soc. Path. exot., 1937, 30 (4) 279-283.

917. ROUBAUD (E.) .- Des conditions expérimentales de la fertilisation et de la ponte chez Aedes geniculatus .- Bull. Soc. Path. exot., 1939, 32 : 502-505.

918. ROUBAUD (E.) .- Phénomènes d'amixie dans les intercroisements de Culicides du groupe pipiens .- C.R. Acad. Sci., 1941, 212 (7) 257-259.

919. ROUBAUD (E.) .- Sur les variations évolutives observées chez les larves de Culicides. Ralentissement et deuto-diapause chez l'Aedes detritus Hal. .- Bull. Soc. Path. exot., 1943, 36 : 274-279.

920. ROUBAUD (E.) .- Etude sur les moustiques de la Crau. IV. Facteurs d'éclosion de l'oeuf chez l'Aedes caspius .- Bull. Soc. Path. exot., 1944, 37 : 153-158.

921. ROUBAUD (E.) .- Sur la fécondité du moustique commun Culex pipiens .- Bull. Soc. Path. exot., 1944, 37 (1/2) 51-56.

922. ROUBAUD (E.) .- L'hybridation, facteur de régulation naturel des populations culicidiennes chez le moustique commun .- C.R. Acad. Sci., 1945, 220 (8) 229-231.

923. ROUBAUD (E.) .- Influence du développement plasmodien sur la fécondité des moustiques hotes .- Bull. Soc. Path. exot., 1945, 38 (9/10) 300-304.

924. ROUBAUD (E.) .- Le problème de l'espèce chez le moustique commun, Culex pipiens L. .- Bull. Soc. Path. exot., 1945, 38 (1/2) 47-60.

925. ROUBAUD (E.) .- Résistance au jeûne hivernal chez le moustique commun, Culex pipiens L. .- Bull. Soc. Path. exot., 1945, 38 (3/4) 105-111.

926. ROUBAUD (E.) .- Notes biologiques sur l'Aedes detritus Hal. .- Bull. Soc. Path. exot., 1946, 39 (1/2) 61-64.

927. ROUBAUD (E.) .- Présence en Vendée littorale de Culex (Barraudius) modestus Fic. .- Bull. Soc. Path. exot., 1947, 40 (11/12) 462-464.

928. ROUBAUD (E.) .- Variations raciales et variations individuelles du comportement spatial d'accouplement chez l'Anopheles claviger (bifurcatus).- C.R. Acad. Sci., 1948, 226 (25) 2036-2039.

929. ROUBAUD (E.) .- Oeufs dormants chez un biotype européen de l'Anopheles claviger Meig. (bifurcatus) .- C.R. Acad. Sci., 1948, 226 : 1867-1869.

931. ROUBAUD (E.) .- Fécondité et reproduction en insectarium du culicide eurygame Theobaldia annulata Schr. .- Bull. Soc. Path. exot., 1952, 45 (4) 469-472.

932. ROUBAUD (E.) .- Sur certaines fluctuations culicidiennes observées en Vendée littorale, depuis l'occupation allemande .- C.R. Acad. Sci., 1953, 236 : 645-648.

933. ROUBAUD (E.) .- Fluctuations spontanées dans la dispersion des Culicides, observées dans la Vendée côtière depuis l'occupation allemande. Interprétation du problème .- Bull. Soc. Path. exot., 1953, 46 (4) 595-604.

934. ROUBAUD (E.) .- Les larves léthales et leur signification dans le complexe Culex pipiens .- Riv. Parassit., 1954, 15 (4) 621-638.

935. ROUBAUD (E.) .- Sur le comportement spatial d'accouplement et ses variations dans le complexe biologique du moustique commun Culex pipiens L. .- C.R. Acad. Sci., D, 1955, 240 (11) 1171-1173.

Source : MNHN, Paris

936. ROUBAUD (E.) .- Biologie des moustiques. Sur l'existence de deux entités biologiques distinctes dans la définition du moustique commun rural, Culex pipiens pipiens .- C.R. Acad. Sci., 1957, 244 : 3115-3116.

937. ROUBAUD (E.) .- Diapauses hivernales atténuées (sub-diapauses) chez les Culicides .- Bull. Soc. Path. exot., 1958, 51 : 520-524.

938. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.) .- La torpeur hivernale obligatoire et ses manifestations diverses chez nos moustiques indigènes .- C.R. Acad. Sci., 1926, 182 (13) 871-873.

939. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.) .- Observations sur la biologie de l'Anopheles plumbeus. I. Le comportement larvaire .- Bull. Soc. Path. exot., 1932, 25 (7) 763-770.

940. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.) .- Adaptation à la vie submergée hivernale chez les larves d'Anopheles plumbeus .- C.R. Acad. Sci., 1932, 194 (24) 2178-2180.

941. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.) .- Notes sur un culicide méditérranéen, Theobaldia longeareolata Macq. .- Bull. Soc. Path. exot., 1933, 26 (7) 934-936.

942. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.) .- Observations sur l'Anopheles plumbeus. II. L'asthénobiose cyclique hivernale .- Bull. Soc. Path. exot., 1933, 26 (7) 965-972.

943. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.) .- Observations sur la biologie de l'Anopheles plumbeus. III. Le chevauchement des générations dans le cycle hivernal .- Bull. Soc. Path. exot., 1934, 27 (6) 546-551.

944. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.) .- Influence favorable d'une légumineuse fixatrice d'azote sur le développement d'un plankton nitrophile propice aux larves d'Anopheles .- Bull. Soc. Path. Exot., 1936, 29 (7) 798-805.

945. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.) .- Nouvelles recherches sur l'évolution expérimentale de Dirofilaria immitis chez quelques culicides indigènes .- Bull. Soc. Path. exot., 1937, 30 : 480-484.

946. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.) .- Comportement de l'oeuf de l'Aedes geniculatus Oliv. soumis aux influences alternantes d'humidité et de sècheresse, en conditions naturelles et expérimentales .- Bull. Soc. Path. exot., 1938, 31 (10) 924-929.

947. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.) .- Des conditions expérimentales de la fertilisation et de la ponte chez l'Aedes geniculatus .- Bull. Soc. Path. exot., 1939, 32 : 502-505.

948. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.) .- Gîtes larvaires observés dans l'agglomération parisienne de deux moustiques arboricoles .- C.R. Acad. Sci., 1941, 213 : 102-104.

949. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.) .- Présence dans la région parisienne d'un gîte larvaire d'Aedes pulchritarsis .- Bull. Soc. Path. exot., 1941, 34 (4/7) 175-178.

950. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.) .- Le froid et les facteurs d'éclosion de l'oeuf chez l'Aedes geniculatus .- Bull. Soc. Path. exot., 1945, 38 (3/4) 111-118.

951. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.) .- Sur le complexe paléarctique du moustique commun Culex pipiens L. Les besoins de sang hivernaux et post-hivernaux de C. disjunctus .- C.R. Acad. Sci., 1958, 246 (6) 857-859.

952. ROUBAUD (E.), GASCHEN (H.) .- Concurrence larvaire et peuplement anophélien .- Bull. Soc. Path. exot., 1932, 25 (5) 428-431.

953. ROUBAUD (E.), GASCHEN (H.) .- Différenciation des races biologiques de Culex pipiens par l'adaptation larvaire aux milieux ammoniacaux .- Bull. Soc. Path. exot., 1932, 25 (10) 1053-1058.

Source : MNHN, Paris

954. ROUBAUD (E.), GASCHEN (H.) .- Insuffisance des caractères de l'oeuf pour la distinction des races trophiques et biologiques de l'Anopheles maculipennis .- Bull. Soc. Path. exot., 1933, 26 (3) 447-452.

955. ROUBAUD (E.), GHELELOVITCH (S.) .- Observations sur plusieurs souches naturelles hybridées de Culex autogène (C. autogenicus Roub.) .- C.R. Acad. Sci., 1950, 230 (4) 341-343.

956. ROUBAUD (E.), GHELELOVITCH (S.) .- Observations sur le moustique anthropophile méditerranéen du groupe pipiens, Culex berbericus Roub. .- C.R. Acad. Sci., 1956, 242 (25) 2900-2903.

957. ROUBAUD (E.), GHELELOVITCH (S.) .- Sur la différenciation des éléments du complexe par la morphologie du phalosome, chez le moustique commun paléarctique Culex pipiens .- C.R. Acad. Sci., 1957, 245 (1) 7-9.

958. ROUBAUD (E.), GRENIER (P.) .- Quelques observations sur l'alimentation des Culicidés (facteurs B et substances protéiques) .- Bull. Soc. Path. exot., 1942, 35 (6/8) 215-219.

959. ROUBAUD (E.), LEGER (M.) .- Observations sur le paludisme en Corse (mars-avril 1921) .- Bull. Soc. Path. exot., 1921, 14 (6) 340-351.

960. ROUBAUD (E.), MEZGER (J.) .- Sur la sensibilité au paludisme des oiseaux (Plasmodium relictum) des divers peuplements raciaux du moustique commun Culex pipiens L. .- C.R. Acad. Sci., 1934, 199 (2) 170-172.

961. ROUBAUD (E.), MEZGER (J.) .- Influence du sang d'oiseau sur la fécondité du moustique commun, Culex pipiens L. .- Bull. Soc. Path. exot., 1934, 27 (7) 666-668.

962. ROUBAUD (E.), MEZGER (J.) .- La nourriture larvaire n'influe pas sur le développement de l'autogenèse chez les races de Culex pipiens spécifiquement anautogènes .- Annls Parasit. hum. comp., 1934, 12 (5) 340-342.

963. ROUBAUD (E.), TOUMANOFF (C.) .- Intoxication d'encombrement chez les larves de Culex vivant en milieu non renouvellé .- Bull. Soc. Path. exot., 1930, 23 (9) 978-986.

964. ROUBAUD (E.), TOUMANOFF (C.) .- Sur une race physiologique suractive du moustique commun Culex pipiens L. .- Bull. Soc. Path. exot., 1930, 23 (2) 196-204.

965. ROUBAUD (E.), TOUMANOFF (C.) .- Essai d'infection expérimentale de larves de Culicides par quelques champignons entomophytes .- Bull. Soc. Path. exot., 1930, 23 (10) 1025-1027.

966. ROUBAUD (E.), TOUMANOFF (C.) .- Déplacement des Anophèles consécutif aux traitements larvicides .- Bull. Soc. Path. exot., 1954, 47 (1) 91-97.

967. ROUBAUD (E.), TREILLARD (M.) .- Influence de la nourriture larvaire sur le développement et le comportement agressif des anophèles. Note préliminaire .- Bull. Soc. Path. exot., 1934, 27 (5) 461-467.

968. ROUBAUD (E.), TREILLARD (M.) .- L'engraissement hivernal par l'alimentation sanguine chez l'A. maculipennis .- Bull. Soc. Path. exot., 1937, 30 (1) 31-37.

969. ROUBAUD (E.), TREILLARD (M.) .- Observations biologiques sur le biotype cambournaci de l'Anopheles maculipennis .- Bull. Soc. Path. exot., 1937 (5) 383-387.

970. ROUBAUD (E.), TREILLARD (M.) .- Diversités biologiques et différenciations raciales chez l'Anopheles claviger Meig. (bifurcatus) .- Bull. Soc. Path. exot., 1940, 33 (1) 21-25.

971. ROUBAUD (E.), TREILLARD (M.) .- L'assèchement des étangs de la Brenne et l'antipaludisme .- Bull. Soc. Path. exot., 1941, 34 (4/7) 97-101.

Source : MNHN, Paris

972. ROUBAUD (E.), TREILLARD (M.) .- Observations sur les moustiques de la Crau. II. L'Aedes (Ochlerotatus) detritus Hal. .- Bull. Soc. Path. exot., 1943, 36 : 94-101.

973. ROUBAUD (E.), TREILLARD (M.) .- Etudes sur les moustiques de la Crau. III. Recherches expérimentales sur les peuplements halophiles du delta du Rhône .- Bull. Soc. Path. exot., 1943, 36 (5/6) 150-154.

974. ROUBAUD (E.), TREILLARD (M.) .- Etudes sur les moustiques de la Crau. V. L'Aedes caspius .- Bull. Soc. Path. exot., 1944, 37 (5/6) 159-168.

975. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.), GASCHEN (H.) .- Etude du comportement sexuel comme caractère génétique chez l'Anopheles maculipennis .- Bull. Soc. Path. exot., 1933, 26 (1) 27-29.

976. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.), TREILLARD (M.) .- Influence de la concentration en sel marin sur le développement larvaire d'Anopheles maculipennis (var. atroparvus, fallax et labranchiae) .- Bull. Soc. Path. exot., 1935, 28 (7) 568-571.

977. ROUBAUD (E.), TREILLARD (M.), TOUMANOFF (C.) .- Nouvelles expériences d'intercroisement de biotypes chez l'Anopheles maculipennis .- Bull. Soc. Path. exot., 1936, 29 (8) 898-901.

978. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.), TOUMANOFF (C.), TREILLARD (M.) .- Recherches sur la transmission de Dirofilaria immitis Leidy .- Bull. Soc. Path. exot., 1936, 29 (10) 1111-1120.

979. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.), STEPHANOPOULOS (G.J.) .- Transmission de la fièvre jaune par un moustique paléarctique répandu dans la région parisienne, l'Aedes geniculatus .- C.R. Acad. Sci., 1937, 205 (2) 182-183.

980. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.), TREILLARD (M.) .- Hybridation naturelle de deux biotypes considérés comme amixiques de l'Anopheles maculipennis (var. typicus et atroparvus) .- Bull. Soc. Path. exot., 1937, 30 (7) 577-580.

981. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.) , MATHIS (M.) .- Transmission de Plasmodium gallinaceum par Aedes geniculatus .- Bull. Soc. Path. exot., 1939, 32 (1) 28-30.

982. ROUBAUD (E.), LEPINE (P.), TREILLARD (M.), SAUTTER (V.) .- Infection expérimentale de Culicides (Aedines) européens avec le virus de l'encéphalomyélite équine américaine type Vénézuela .- Bull. Soc. Path. exot., 1941, 34 (4/7) 130-133.

983. ROUBAUD (E.), COLAS-BELCOUR (J.), GHELELOVITCH (S.) .- Sur un peuplement du moustique commun paléarctique Culex pipiens pipiens dépourvu de diapause hivernale .- C.R. Acad. Sci., 1957, 244 (25) 3001-3003.

984. ROUCHE .- Deux années de lutte contre les moustiques au centre d'aviation de Rochefort .- Arch. Méd. Pharm. navale, 1935, 125 : 545-582.

985. ROUSSEAU (P.) .- Reviviscence d'un foyer de paludisme en Beauce .- Acad. Méd., 1916, 76 (44) 367-368.

986. ROUX (G.) .- La question des moustiques à Lyon; lieux d'éclosion; prophylaxie .- C.R. Ass. Avancem. Sci., 1906, 35-1 : 116.

987. ROUX (G.) .- Les moustiques à Lyon .- C.R. Ass. Avancem. Sci., 1906, 35-1 : 348.

988. ROUZAUD (C.) .- Les groupements végétaux du bassin de l'étang de Pissevaches (Aude) et leurs relations avec les aires culicidogènes .- Perpignan, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Centre Universitaire de Perpignan, 1975, 440 p. (thèse d'Université).

989. ROYER (M.) .- Etude épidémiologique sur le paludisme à Troyes .- Troyes, ?, 1917, 19 p.

Source : MNHN, Paris

990. ROYER (M.), Contribution à la biologie du Bombinator pachypus Fitz (Batraciens, Anoures) .- Bull. mens. Ass. Natur. Vallée du Loing, 1931, 7 : 15-

991. ROYER (M.) .- Note sur la ponte d'Anopheles maculipennis Meig. (Dipt. Anophelinae) .- Bull. Soc. ent. France 1918, 54 (15) 211-212.

992. RUFFIE (J.) .- Contribution à l'étude bio-systématique des Culicinae du sous-bassin aquitain .- Toulouse, Faculté des Sciences, 1957, 73 p. (thèse).

993. RUFFIE (J.) .- Etude biosystématique des Culicinae du sous bassin aquitain .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1958, 93 : 133-223.

994. SACQUEPEE (E.E.J.) .- Rôle des insectes piqueurs en France et dans le Nord Africain .- Arch. Méd. Pharm. milit., 1923, 79 : 647-699.

995. SAINTON (P.) .- Les formes légères et méconnues du paludisme .- Bull. Acad. Méd., 1915, 74 (49) 700-703.

996. SALANQUE-IPIN .- Le paludisme et les moustiques .- Arch. Méd. navale, 1900, 74 : 5-25.

997. SALIERES (A.), GUY (Y.), SUZZONI-BLATGER (J.), COUSSERANS (J.) .- Bilan de quatre années de recherches sur le "complexe maculipennis" (Diptera - Culicidae - Anophelinae) .- Annls Paraist. hum. comp., 1978, 53 (6) 751-756.

998. SALIOU (P.), VERGEAU (B.), ALANDRY (G.),DALY (J.P.), LARROQUE (P.), ESSIOUX (H.), DUROSOIR (J.L.), CRISTAU (P.) .- Deux nouveaux cas de paludisme autochtone dans la région parisienne illustrant deux modes de contamination différents .- Bull. Soc. Path. exot., 1978, 71 (4/5) 342-347.

999. SANSARRICQ (H.) .- Le paludisme autochtone dans le sud-ouest de la France .- Bordeaux, Faculté de Médecine, 1954, 66 p. (thèse).

1000. SAPIN-JALOUSTRE (H.) .- Hygiène urbaine et hygiène rurale. Démoustication .- Concours méd., 1952 (29) 2635-2637.

1001. SARDOU (R.) .- Le cycle nycthéméral des larves d'Anopheles claviger var. typicus .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1962, 97 : 123-125.

1002. SARRAND (P.) .- Histoire du paludisme autochtone en France .- Paris, Université de Paris-Sud, 1979, 102 + XX p. (thèse).

1003. SASPORTAS (L.) .- L'épidémie de Camargue .- Rev. Palud. Méd. trop., 1945, 3 (15/16) 81-83.

1004. SAUTET (J.) .- La lutte contre le paludisme en Corse .- Paris, Faculté de Médecine, 1928, 96 p. (thèse).

1005. SAUTET (J.) .- En Corse, l'enfant paludéen est un réservoir de virus particulièrement important et un danger pour l'avenir de la race .- Rev. Méd. Hyg. trop., 1932, 24 (nov.-déc.) 3 p.

1006. SAUTET (J.) .- Peut-on considérer comme un facteur de régression du paludisme une moins grande aptitude du parasite à former des gamètes ? In Hygiène méditerranéenne. Premier Congrès international. Marseille, 20-25 septembre 1932 .- Paris, Baillière et fils, 1933 : 242-245.

1007. SAUTET (J.) .- La diapause hivernale des larves d'Anopheles bifurcatus .- Annls Parasit. hum. comp., 1933, 11 (3) 161-172.

1008. SAUTET (J.) .- L'assainissement en pays palustre par l'assèchement des marais au moyen du pompage. Observations et expériences. In Congrès international d'Hygiène. Paris, octobre 1933 .- Paris, Le Mouvement Sanitaire, (1934?) 4 p.

1009. SAUTET (J.) .- Malaria ed emigrazione .- Crosse Rossa, 1934, 9 (9/10) (7p.).

Source : MNHN, Paris

1010. SAUTET (J.) .- Contribution à l'étude de l'A. maculipennis en Corse. Gîtes d'été et gîtes d'hiver dans leurs rapports avec le paludisme .- Annls Parasit. hum. comp., 1934, 12 (1) 8-14.

1011. SAUTET (J.) .- A propos d'un cas de paludisme à Plasmodium falciparum à période de latence prolongée .- Bull. Soc. Path. exot., 1934, 27 (5) 425-426.

1012. SAUTET (J.) .- Paludisme d'hiver en Corse. Les rapports avec le peuplement anophélien homodyname .- Riv. Malariol., 1934, 13 (1) 3-9.

1013. SAUTET (J.) .- Influence du froid sur les oeufs d'Anopheles maculipennis .- C.R. Soc. Biol., 1935, 120 : 412-413.

1014. SAUTET (J.) .- Contribution à l'étude du tube digestif des larves d'Anopheles et de Theobaldia (Note préliminaire) .- Annl. Parasit. hum. comp., 1935, 13 (2) 97-108.

1015. SAUTET (J.) .- Cinq années de lutte antipaludique dans le nord de la Corse .- Rev. Méd. Hyg. trop., 1936, 28 (1) 67-74.

1016. SAUTET (J.) .- Contribution à l'étude des Culicidés (Morphologie et biologie) .- Paris, Faculté des Sciences, 1936, 125 p. (thèse).

1017. SAUTET (J.) .- Contribution à l'étude des Culicidés de la région marseillaise et de la Camargue .- Rev. Méd. Hyg. trop., 1936 (30 janv.) 77-84.

1018. SAUTET (J.) .- Quelques principes de lutte antipaludique en rapport avec l'endémie palustre et la biologie des anophèles .- Arch. Méd. gén. coloniale, 1937 (6) 15 p.

1019. SAUTET (J.) .- Contribution à l'étude de l'exophilie de l'Anopheles maculipennis labranchiae et de l'Anopheles sacharovi dans ses rapports avec la transmission du paludisme .- Bull. Soc. Path. exot., 1937, 30 (5) 387-392.

1020. SAUTET (J.) .- Contribution à l'étude des culicidés de la région marseillaise et de la Camargue .- Marseille méd., 1938, 75 : 75-84.

1021. SAUTET (J.) .- L'hygiéniste peut avoir raison ou l'histoire d'une épidémie .- Presse méd., 1943, 51 (41) 613.

1022. SAUTET (J.) .- A propos d'une épidémie de paludisme en Camargue .- Marseille méd., 1944, 81 (2) 53-64.

1023. SAUTET (J.) .- Etat du paludisme dans la région méditerranéenne .- Rec. Trav. Inst. natn. Hyg., 1944, 1 : 176.

1024. SAUTET (J.) .- L'anophélisme est-il la cause déterminante de la répartition du paludisme sur le littoral méditérranéen français .- Marseille méd., 1945, 82 : 347.

1025. SAUTET (J.) .- Etat actuel du paludisme et de l'anophélisme dans la région méditerranéenne .- Rec. Trav. Inst. natn. Hyg., 1945, 2 : 176.

1026. SAUTET (J.) .- Le paludisme en Camargue autrefois et de nos jours .- Rev. Path. comp. Hyg. gén., 1947, 47 (591/592) 437-441.

1027. SAUTET (J.) .- L'avenir du paludisme en Camargue .- Presse méd., 1948 (30) 368.

1028. SAUTET (J.) .- A propos de la régression "spontanée" du paludisme .- Bull. Soc. Path. exot., 1948, 41 (1/2) 31-33.

1029. SAUTET (J.) .- Les fluctuations du paludisme dans le sud de la France et dans les départements insulaires .- Rev. Path. gén. comp., 1953, 53 (652) 1199-1208

1030. SAUTET (J.) .- Les limites de la lutte antipaludique : l'exemple de la Corse .- Méd. trop., 1954, 14 : 95-102.

1031. SAUTET (J.) .- Un problème important de la lutte antipaludique : les traitements larvicides entrainent-ils un déplacement des Anophèles ? .- Bull. Soc. Path. exot., 1954, 47 (4) 544-549.

Source : MNHN, Paris

1032. SAUTET (J.) .- Le rôle du terrain dans la régression dite "spontanée" du paludisme en France .- Presse méd., 1956, 64 (47) 1091-1092.

1033. SAUTET (J.) .- La réintroduction du paludisme, danger d'actualité .- Méd. trop., 1962, 22 (3) 355-360.

1034. SAUTET (J.) .- Y a-t'il possibilité de réimplantation du paludisme dans la région de Fos ? .- Bull. Acad. natn. Méd., 1972, 156 (20/21) 645-648.

1035. SAUTET (J.) .- Indice de régression et éradication du paludisme .- Bull. Acad. natn. Méd., 1978, 162 (9) 839-842.

1036. SAUTET (J.), AUDIBERT (Y.) .- Le rythme cardiaque des larves de moustiques, en asphyxie .- C.R. Soc. Biol., 1944, 138 : 679-680.

1037. SAUTET (J.), AUDIBERT (Y.) .- Papilles anales et asphyxie des larves de moustiques .- C.R. Soc. Biol., 1945, 139 : 104-105.

1038. SAUTET (J.), AUDIBERT (Y.) .- Etudes biologiques et morphologiques sur certaines larves de moustiques en vue d'applications pratiques pour leur destruction (Première partie) .- Bull. Soc. Path. exot., 1946, 39 (1/2) 43-64.

1039. SAUTET (J.), AUBIBERT (Y.) .- Etudes biologiques et morphologiques de certaines larves de moustiques en vue d'applications pratiques pour leur destruction (suite) .- Bull. Soc. Path. exot., 1946, 39 (5/6) 137-158.

1040. SAUTET (J.), CORDOLIANI (S.) .- Fièvre ondulante et paludisme. Difficulté du diagnostic au moment des poussées épidémiques .- Bull. Soc. Path. exot., 1934, 27 (8) 719-723.

1041. SAUTET (J.), ORTOLI (M.F. d') .- Variations biologiques et morphologiques de l'Anopheles maculipennis .- C.R. Soc. Biol., 1944, 138 : 680-682.

1042. SAUTET (J.), QUILICI (M.) .- A propos de quelques cas de paludisme autochtone contractés en France pendant l'été .- Presse méd., 1971, 79 (12) 524.

1043. SAUTET (J.), QUILICI (M.) .- Devons-nous craindre une réapparition du paludisme dans le midi de la France ? .- Lyon Médit. méd., 1972, 8 (25) 2451-2454.

1044. SAUTET (J.), LEVAVASSEUR (G.), RANQUE (J.), VUILLET (J.) .- Action des ultrasons sur les oeufs, les larves et les nymphes de Culicidés .- C.R. Soc. Biol., 1946, 140 : 641-642.

1045. SCHACHTER (D.) .- Contribution à l'étude écologique de la Camargue .- Paris, Masson 1950, 108 p. (Thèse).

1046. SCHACHTER (D.), CONAT (M.) .- Note préliminaire sur la faune des rizières .- Bull. Soc. zool. France, 1951 (5/6) 365-370.

1047. SCHACHTER (D.), RAZAKANDISA (R.N.), KIENER (A.) .- Contribution à l'étude des eaux courantes de Provence. Ecologie d'une source thermale : la Durançole .- Annls Fac. Sci. Marseille, 1970, 43B : 127-134.

1048. SCHNEIDER .- Un cas de paludisme .-Bull. Soc. Méd. Nancy, 1916, 2 (5) 196.

1049. SCHUMANN (W.) .- Immunogenetic and electrophoretic studies with extracts of different adult Culex pipiens strains .-J. Insect Physiol., 1973, 19 (7) 1387-1396.

1050. SCHUMANN (W.) .- Comparative studies with Culex pipiens egg rafts. Immunogenetic, electrophoretic and enzymatic analysis of unfertilized, compatible and incompatible fertilized eggs .- Theor. appl. Genet., 1974, 44 (4) 160-166.

1051. SEGUI (V.) .- Enquête entomologique n°3 .- S1, 1966, 66 p.

1052. SEGUY (E.) .- Les moustiques de France .- Bull. Mus. Hist. nat., 1920, 26 (1) 51-58.

Source : MNHN, Paris

1053. SEGUY (E.) .- Les moustiques de France. 2. Culicinae .- Bull. Mus. Hist. nat., 1920, 26 (2) 141-147.

1054. SEGUY (E.) .- Les moustiques de France. Culicinae .- Bull. Mus. Hist. nat., 1920, 26 (3) 223-230.

1055. SEGUY (E.) .- Les moustiques de France. Culicinae .- Bull. Mus. Hist. nat., 1920, 26 (4) 322-335.

1056. SEGUY (E.) .- Les moustiques de France. Genre Ochlerotatus (suite) .- Bull. Mus. Hist. nat., 1920, 26 (5) 407-414.

1057. SEGUY (E.) .- Les moustiques de France. Culicinae .- Bull. Mus. Hist. nat., 1920, 26 (6) 512-519.

1058. SEGUY (E.) .- Notes sur quelques moustiques (Dipt.) peu connus ou nouveaux pour la faune française .- Bull. Sco. ent. France, 1920 (15) 251-253.

1059. SEGUY (E.) .- Remarques sur quelques larves de moustiques .- Bull. Soc. ent. France, 1920 (18) 309-311.

1060. SEGUY (E.) .- Description d'un nouveau moustique français du groupe de l'Aedes mariae et synopsis des espèces du groupe .- Bull. Soc. ent. France, 1921 (13) 192-195.

1061. SEGUY (E.) .- Les moustiques de France. Culicinae .- Bull. Mus. Hist. nat., 1921, 27 (2) 162-169.

1062. SEGUY (E.) .- Note sur l'armature génitale du Culex jugorum Villeneuve (Dipt. Culicidae) .- Annls Soc. ent. France, 1921, 90 : 39-40.

1063. SEGUY (E.) .- Note sur le détermination de nos Culicides indigènes .- Bull. Soc. Path. exot., 1921, 14 (3) 179-187.

1064. SEGUY (E.) .- Notes biologiques sur les larves de moustiques qui vivent dans les trous d'arbres .- C.R. Congr. Soc. savantes, 1921 : 110-117.

1065. SEGUY (E.) .- L'Aedes jugorum Villeneuve et les larves de moustiques à branchies très développées.- Bull. Soc. Path. exot., 1922, 15 (1) 25-30.

1066. SEGUY (E.) .- Notes biologiques sur les larves de moustiques qui vivent dans les troncs d'arbres .- Sciences, 1922 : 110-117.

1067. SEGUY (E.) .- Histoire naturelle des moustiques de France. Etude systématique et biologique des moustiques de l'Europe centrale et septentrionale et de leurs parasites .- Paris, Lechevalier, 1923, 225 p.

1068. SEGUY (E.) .- Remarques sur quelques moustiques .- Annls Soc. ent. France, 1923, 92 205-208.

1069. SEGUY (E.) .- Notes sur les moustiques. I .- Diptera, 1924, 1 : 120.

1070. SEGUY (E.) .- Notes sur les moustiques. II .- Diptera, 1924, 1 : 157-158.

1071. SEGUY (E.) .- Les moustiques de l'Afrique mineure, de l'Egypte et de la Syrie. Etude comparative des moustiques des régions méditerranéennes, de l'Europe centrale et septentrionale. Leurs parasites. Catalogue des Culicidés néarctiques et paléarctiques .- Paris, Lechevalier, 1924, 257 p.

1072. SEGUY (E.) .- Faune de France. 12. Diptères .- Paris, Lechevalier, 1925, 109 p.

1073. SEGUY (E.) .- Captures (Dipt. Culicidae) .- Bull. Soc. ent. France, 1925 (17) 278.

1074. SEGUY (E.) .- Notes sur les moustiques .- Diptera, 1927, 4 : 28.

1075. SEGUY (E.) .- Les moustiques de la forêt de Fontainebleau et de la vallée du Loing .- Trav. Natur. Vallée Loing, 1928 (2) 5-20.

Source : MNHN, Paris

1076. SEGUY (E.) .- Notes sur les moustiques. III .- Diptera, 1929, 5 (4) 177-178.

1077. SEGUY (E.) Les moustiques de la forêt de Fontainebleau et de la Vallée du Loing. II. Biologie et moyens d'action contre ces insectes .- Trav. Natur. Vallée Loing, 1931, (5) 19-93.

1078. SEGUY (E.) .- Notes sur les moustiques. IV .- Diptera, 1932 6 : 97-102.

1079. SEGUY (E.) .- Moustiques urbains .- Annls Hyg. publ. industr. soc., 1934, 12 (2) 65-84.

1080. SEGUY (E.) .- Destruction des moustiques .- Annls Hyg. publ. industr. soc., 1934, 12 421-431.

1081. SEGUY (E.) .- Etude comparée des réactions des moustiques et de leurs larves placées sous influence des rayons lumineux monochromes .- Bull. Ass. Natur. Vallée Loing, 1935 (3/4)

1082. SEGUY (E.) .- Atlas des Diptères de France, Belgique, Suisse. I .- Paris, Boubée, 1951, 175 p. (Culicidae: pp. 84-109).

1083. SEIDMAN (M.) .- Histoire du paludisme en Alsace au XIXe siècle .- Strasbourg, Faculté de Médecine, 1932, 40 p. (thèse)

1084. SENEVET (G.) .- Le paludisme dans la Double (Dordogne) .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1923, 1 (4) 604-606.

1085. SENEVET (G.) .- A propos des races d'Anopheles maculipennis .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1933, 11 (1) 12-14.

1086. SENEVET (G.) .- Les Anophèles de la France et de ses colonies. I. France, Corse, Afrique, Madagascar, La Réunion .- Paris, Lechevalier, 1935, 361 p.

1087. SENEVET (G.), ANDARELLI (L.) .- Les Anophèles de l'Afrique du Nord et du bassin méditerranéen .- Paris, Lechevalier, 1955, 280 p.

1088. SENEVET (G.), ANDARELLI (L.) .- Les moustiques de l'Afrique du Nord et du bassin méditerranéen. Les genres Culex, Uranotaenia, Theobaldia, Orthopodomyia et Mansonia .- Paris, Lechevalier, 1959, 384 p.

1089. SENEVET (G.), ANDARELLI (L.) .- Un nouveau caractère pour la diagnose des larves de Culex .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1959, 37 (3) 447-461.

1090. SENEVET (G.), ANDARELLI (L.) .- Les moustiques de l'Afrique du Nord et du bassin méditerranéen. III. Les Aedes. 2e partie : description des espèces. Sous-genre Ochlerotatus groupe B .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1963, 41 (3/4) 142-172.

1091. SENEVET (G.), ANDARELLI (L.) .- Les moustiques de l'Afrique du Nord et du bassin méditerranéen. III. Les Aedes. 2e partie (suite), sous-genre Ochlerotatus : groupe H .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1966, 44 : 51-74.

1092. SENEVET (G.), CLASTRIER (J.) .- Présence d'Anopheles (Anopheles) claviger Meigen variété petragnanii del Vecchio dans le S.E. de la France .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1960, 38 (1) 112-116.

1093. SENEVET (G.), CLASTRIER (J.) .- Deux nouvelles stations de Aedes (Ochlerotatus) pullatus dans les Alpes françaises .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1961, 39 (1) 103-105.

1094. SENEVET (G.), CLASTRIER (J.) .- Quelques moustiques de la Camargue et du sud-est de la France .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1963, 41 (1/2) 69-71.

1095. SERGENT (Ed.), FOOT (M.) .- De l'utilisation des tritons pour la destruction des moustiques .- Arch. Inst. Pasteur Afr. Nord., 1922, 2 (4) 489-493.

Source : MNHN, Paris

1096. SERGENT (Ed.), SERGENT (Et.) .- Observations sur les anophèles de la banlieu de Paris .- Annls Inst. Pasteur, 1902, 16 (12) 940-946.

1097. SERGENT (Ed.), SERGENT (Et.) .- Régions à Anopheles sans paludisme .- C.R. Soc. Biol., 1903, 55 : 1359-1360.

1098. SERGENT (Ed.), SERGENT (Et.) .- Moustiques et maladies infectieuses. Guide pratique pour l'étude des moustiques .- Paris, Masson, (1903?) 176 p.

1099. SERGENT (Ed.), SERGENT (Et.) .- Essai de campagne antipaludique selon la méthode de Koch (Lac de Grand-Lieu, 1903) .- Annls Inst. Pasteur, 1904, 18 (2) 49-63.

1100. SERGENT (Ed.), SERGENT (Et.) .- Sur l'hivernage des moustiques des hautes montagnes .- Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord, 1922, 13 (2) 36.

1101. SERGENT (Ed.), SERGENT (Et.), PARROT (L.), DONATIEN (A.) .- Le paludisme en Corse. Etude épidémiologique .- Bull. Soc. Path. exot., 1921, 14 (10) 685-710.

1102. SERGENT (Ed.), SERGENT (Et.), PARROT (L.), DONATIEN (A.) .- La prophylaxie du paludisme en Corse .- Arch. Inst. Pasteur Afr. Nord, 1922, 2 (1) 1-51.

1103. SERGENT (Ed.), SERGENT (Et.), CATANEI (A.) .- Maisons à paludisme .- C.R. Acad. Sci., 1933, 197 (26) 1711-1713.

1104. SERGENT (Et.) .- Sur l'existence des Anophèles en grand nombre dans une région où le paludisme a disparu .- C.R. Soc. Biol., 1901, 53 : 857-859.

1105. SERGENT (Et.) .- Sur l'existence des Anophèles en grand nombre d'une localité d'où le paludisme a disparu .- Annls Inst. Pasteur, 1901, 15 (10) 811-816.

1106. SERGENT (Et.) .- De l'existence d'Anopheles dans la banlieu de Paris .- Bull. med. Paris, 1902, 16 : 824.

1107. SERGENT (Et.) .- Assainissement naturel d'une localité palustre du Limousin .- Arch. Inst. Pasteur Afr. Nord, 1922, 2 (4) 474-477.

1108. SERGENT (Et.) .- Quelques parasites des Culicides .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1925, 3 (2) 155-168.

1109. SERGENT (Et.) .- Quelques remarques sur les espaces intercostaux et les columelles des oeufs d'Anopheles maculipennis .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1935, 13 (2) 184-187.

1110. SERGENT (Et.) .- Oeufs d'Anopheles maculipennis de France et d'Algérie .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1937, 15 (2) 214-216.

1111. SERGENT (Et.) .- Détail anatomique des oeufs d'Anopheles maculipennis .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1938, 16 (3) 318-319.

1112. SERGENT (Et.) .- Vitamine B : facteur de croissance des larves de moustiques (Anopheles et Culex) .- C.R. Soc. Biol., 1939 : 131.

1113. SERGENT (Et.) .- Un caractère anatomique de la nymphe d'Anopheles maculipennis apparaissant parfois chez la larve .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1939, 17 (2) 244-246.

1114. SERGENT (Et.) .- Vorticelles et larves d'Anophèles .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1940, 18 (1) 27-28.

1115. SERGENT (Et.) .- De quelques caractères différentiels des larves d'Anopheles maculipennis var. atroparvus du Limousin et var. labranchiae du littoral algérois .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1940, 18 (2) 216-220.

1116. SERGENT (Et.), TRENSZ (F.) .- Note préliminaire sur la morphologie des oeufs d'Anopheles maculipennis de France et d'Algérie .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1933, 11 (1) 9-14.

Source : MNHN, Paris

1117. SERGENT (Et.), TRENSZ (F.) .- Premières études sur les races d'Anopheles maculipennis en France et en Algérie .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1935, 13 (1) 1-11.

1118. SERGENT (Et.), CHASSAING (J.), FABIANI (G.) .- Assainissement naturel d'une localité de la Haute-Auvergne (Menet) .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1925, 3 (2)

1119. SERRA-TOSIO (B.) .- Quelques Diptères Chironomides, Simuliides et Culicides du Parc National de la Vanoise .- Trav. sci. Parc natn. Vanoise, Chambéry, 1970, 1 : 119-129.

1120. SERVAJEAN (F.) .- Anophélisme sans paludisme. Le problème des races de l'Anopheles maculipennis .- Alger, Faculté de Médecine, 1935, 100 p. (thèse).

1121. SICART (M.) .- Sur l'appendice thoracique chez les larves d'Anophelini .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1954, 89 (1/2) 121-127.

1122. SICART (M.) .- Révision des Culicidés du bassin sous-pyrénéen .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1954, 89 (3/4) 231-234.

1123. SICART (M.) .- Présence de Culex torrentium dans les Pyrénées et comparaisons avec Culex pipiens du même gîte .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1954, 89 (3/4) 228-230.

1124. SICART (M.) .- Sur la présence d'Anopheles algeriensis Theo. en Roussillon .- Montpellier méd., 1956, 99 (5) 480-481.

1125. SICART (M.) .- Exposé sur les génitalia mâles des Culicinae piqueurs du sous-bassin aquitain .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1956, 91 (3/4) 363-370.

1126. SICART (M.) .- Clef dichotomique des larves de Culicinae du bassin sous-pyrénéen .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1956, 91 : 171-174.

1127. SICART (M.) .- Diptères Nématocères piqueurs de France. Révision des Culicidés du bassin sous-pyrénéen .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1956, 91 : 174.

1128. SICART (M.) .- Remarques sur l'évasement des cornets respiratoires chez les nymphes du complexe Culex pipiens L. .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1958, 93 (3/4) 489-490.

1129. SICART (M.) .- Présence de Culex torrentium dans le Puy-de-Dome .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1959, 94 (3/4) 357-358.

1130. SICART (M.) .- Essai de biogéographie sur les limites dans le complexe Anopheles claviger .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1961, 96 (1/2) 148-152.

1131. SICART (M.), ESCANDE (F.) .- Quelques moustiques aberrants de l'agglomération toulousaine .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1958, 93 (1/2) 39-42.

1132. SICART (M.), ESCANDE (F.) .- Sur la coloration céphalique de certaines larves d'Anopheles maculipennis .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1958, 93 (1/2) 43-44.

1133. SICART (M.), ESCANDE (F.) .- Sur le comportement nocturne de quelques larves de Culicides .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1958, 93 : 45-47.

1134. SICART (M.), LARROUY (G.) .- Hermaphrodisme partiel chez un Culex hortensis .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1962, 97 (3/4) 410-412.

1135. SICART (M.), LARROUY (G.) .- Etude du complexe Culex pipiens L. de la ville de Toulouse: soies des lobes du sternite IX .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1963, 98 (1/2) 287-288.

1136. SICART (M.), LARROUY (G.) .- Le bras latéro-basal des paraproctes dans le complexe Culex pipiens régional .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1963, 98 (3/4) 289-292.

Source : MNHN, Paris

1137. SICART (M.), LARROUY (G.) .- La faune culicidienne de la région toulousaine. Cycle annuel de l'Aedes (Ochlerotatus) rusticus (Rossi, 1790) .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1968, 104 (1/2) 96-100.

1138. SICART (M.), LARROUY (G.) .- La faune culicidienne de la région toulousaine. Présence d'Aedes (Ochlerotatus) punctor (Kirby 1837) dans la plaine de Toulouse .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1968, 104 (1/2) 101-103.

1139. SICART (M.), LARROUY (G.) .- La faune culicidienne de la région toulousaine. Génitalia femelle des Aedes régionaux .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1968, 104 (1/2) 104-109.

1140. SICART (M.), RUFFIE (J.) .- Présence de Culex torrentium sur les montagnes de Foix .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1958, 93 : 80-81.

1141. SICART (M.), RUFFIE (J.) .- Résultats d'une enquête sur la faune culicidienne de Corse. Campagne 1959 .- Toulouse, Faculté de Médecine, Laboratoire de Parasitologie, sd., 114 p.

1142. SICART (M.), RUFFIE (J.) .- Etude sur les nymphes des Culicines du sous-bassin aquitain .- Annls Parasit. hum. comp., 1960, 35 (4) 631-647.

1143. SICART (M.), RUFFIE (J.) .- Sur les larves d'Anophèles récoltées en Corse au cours de l'été 1959 .- Annls Parasit. hum. comp., 1960, 35 (4) 622-630.

1144. SICART (M.), SARDOU (R.) .- Anomalies de gîtes et d'associations larvaires chez les Culicides .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1961, 96 (3/4) 273-274.

1145. SICART (M.), SARDOU (R.) .- Présence d'Aedes rusticus près de la ligne des crêtes entre le Tarn atlantique et l'Aveyron méditerranéen .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1962, 97 (1/2) 122.

1146. SICART (M.), RIOUX (J.A.), RUFFIE (J.) .- Les biotopes d'Anopheles maculipennis dans la région de Toulouse .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1958, 93 (1/2) 73-78.

1147. SIGALAS (R.), PAUTRIZEL (R.), SANSARRICQ (H.) .- La régression du paludisme autochtone dans le sud-ouest de la France .- Rev. Path. gén. comp., 1953, 53 (652) 1252-1273.

1148. SIMON (L.M.) .- Le paludisme autochtone .- Paris, Faculté de Médecine, 1953, 88 p. (thèse).

1149. SIMONNEAU (P.) .- Les grands ensembles écologiques des Pyrénées-Orientales. L'ancien étang de Villeneuve-de-la-Raho .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1967 (Doc. 7) 7 p., 1 carte coul. h.t.

1150. SIMONNEAU (P.) .- Les niveaux écologiques sur le littoral du Languedoc-Roussillon .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1968 (Doc. 12) 77 p.

1151. SIMONNEAU (P.), SIMONNEAU (J.) .- Contribution à l'étude des substrats des phytocénoses fertiles sur le littoral atlantique entre Vilaine et Gironde .- Annls Soc. Sci. nat. Charente-Maritime, 1975, 6 (2) 156-163.

1152. SINEGRE (G.) .- Toxicité de 4 insecticides sur quelques espèces de Culicides et sur la faune des gîtes larvaires .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1967 (Doc. 8) 78 + V p.

1153. SINEGRE (G.) .- Contribution à l'étude de la toxicité de quelques insecticides organophosphorés sur les larves de Culicidés et la faune de leurs biotopes .- Montpellier, Faculté des Sciences, 1969, 131 p. (D.E.S.)

1154. SINEGRE (G.) .- Contribution à l'étude physiologique d'Aedes (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771)(Nematocera-Culicidae). Eclosion. Dormance. Développement. Fertilité .- Montpellier, Université des Sciences et Technique du Languedoc, 1974, 285 p. (thèse).

Source : MNHN, Paris

1155. SINEGRE (G.) .- An automatic apparatus for exposing insect eggs to thirteen photoperiods (including crepuscular periods) .- Mosq. News, 1978, 38 (4) 595-600.

1156. SINEGRE (G.) .- La chute de la teneur en oxygène dissous à l'interface eau-sol des marais temporaires gouverne l'éclosion des oeufs quiescents de moustiques .- Bull. Soc. Ecophysiol., 1979, 4 (1) 53-56.

1157. SINEGRE (G.) .- Induction de la diapause embryonnaire chez un Culicide commun dans le sud de la France : Aedes (O.) caspius (Pallas, 1771) .- Bull. Soc. Ecophysiol., 1981, 6 (1/2) 113-117.

1158. SINEGRE (G.), GABINAUD (A.), QUERMEL (J.M.), VIGO (G.) .- Présence d'Aedes (Ochlerotatus) rusticus Rossi 1870 dans le sud de la France .- Annls Parasit. hum. comp., 1967, 42 (6) 659-663.

1159. SINEGRE (G.), COUSSERANS (J.), VIGO (G.), CRESPO (O.) .- Sensibilité des larves de Mansonia (C.) richiardii (Ficalbi) à quelques insecticides. Effet de l'Abate dans un biotope larvaire .- Cah. ORSTOM, Sér. Ent. méd. Parasit., 1971, 9 (3) 255-263.

1160. SINEGRE (G.), JULLIEN (J.L.), CRESPO (O.) .- Résistance de certaines populations de Culex pipiens L. au chlorpyrifos (Dursban^{R}) en Languedoc-Roussillon (France) .- Cah. ORSTOM, Sér. Ent. méd. Parasit., 1976, 14 (1) 49-59.

1161. SINEGRE (G.), JULLIEN (J.L.), GAVEN (B.) .- Acquisition progressive de la résistance au chlorpyrifos chez les larves de Culex pipiens (L.) dans le midi de la France .- Parassitologia, 1977, 19 (1/2) 79-94.

1162. SINEGRE (G.), RIOUX (J.A.), SALGADO (J.) .- Fascicule de détermination des principales espèces de moustiques du littoral méditerranéen français .- Montpellier, Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen, 1979, 19 pl.

1163. SOLLIER (N.) .- A propos du paludisme en Camargue .- Echo méd. Cévennes, 1939, 40 (2) 30-32.

1164. SOREL (F.), ROUSSEAU (L.) .- La chasse aux moustiques à Paris .- Rev. Hyg. Police sanit. 1914, 36 : 95-99.

1165. STILLMUNKES .- Epidémie de paludisme autochtone à Pl. vivax dans un camp d'internés civils .- Soc. Méd. Chirurg. Pharm. Toulouse, 1922 (janv.).

1166. STORDEUR (E. de) .- Etude de la génétique formelle et du polymorphisme de deux locus codant des estérases chez Culex pipiens pipiens L. (Diptères,Culicidés) .- Montpellier Université des Sciences et Techniques du Languedoc, 1974, 52 p. (thèse 3e cycle).

1167. STORDEUR (E. de) .- Esterases in the mosquito Culex pipiens pipiens L. : formal genetics and polymorphism of adult esterases .- Biochem. Genet., 1976, 14 (5/6) 481-493.

1168. SURCOUF (J.) .- Note sur les Culicides .- Bull. Mus. Hist. nat. Paris, 1912, 18 : 59-61.

1169. SUZZONI-BLATGER (J.), SEVIN (A.) .- Etude de la chétotaxie larvaire du "complexe maculipennis" (Diptera-Culicidae) dans la région toulousaine .- Annls Parasit. hum. comp., 1982, 57 (6) 649-654.

1170. SUZZONI-BLATGER (J.), ANGLADE (F.), LARROUY (G.) .- Présence d'Anopheles messeae (Diptera-Culicidae) en Haute-Garonne .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1980, 116 (1/2) 175-178.

1171. SUZZONI-BLATGER (J.), GUY (Y.) LARROUY (G.) .- Essai sur la dynamique des populations d'un gîte épigé de Culex pipiens L. (Diptera-Culicidae) de Toulouse .- Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 1977, 112 (3/4) 237-242.

1172. SUZZONI-BLATGER (J.), SUZZONI (J.P.), LARROUY (G.) .- Inventaire faunistique des Culicinae de Balagne (Corse) .- Bull. Soc. Path. exot., 1978, 71 (4/5) 376-382.

Source : MNHN, Paris

1173. TANGUY (Y.) .- Observation du paludisme contracté en France (Saint-Aygulf) .- Bull. Soc. Path. exot., 1939, 32 (3) 285-286.

1174. TANON (L.) .- Le paludisme en France .- Vie méd., 1931, 12 (8) 399-400.

1176. TAPIE (J.) .- Paludisme autochtone, deux nouveaux cas observés en Champagne .- Progrès méd., 1918 (1) 3.

1177. THOMAS (A.) .- Sur l'importance des Diptères dans l'environnement de quelques cours d'eau des Pyrénées .- Annls Limnol., 1969, 5 (1) 61-71.

1178. THUREL (F.) .- Le paludisme dans les Dombes .- Lyon, Faculté de Médecine, 1907, 87 p. (thèse).

1179. TIMON-DAVID (J.) .- Essai sur les Diptères piqueurs de Provence .- Montpellier, Faculté de Médecine, 1928, 69 p. (thèse).

1180. TIMON-DAVID (J.) .- Observations sur quelques diptères du Briançonnais .- Bull. Soc. linn. Provence, 1931, 4 : 22-24.

1181. TISSET (J.P.) .- Un exemple pilote de lutte contre les moustiques dans une station climatique : la démoustication à la Baule en Bretagne .- Paris, Faculté de Médecine, 1968, 46 p. (thèse).

1182. TOUMANOFF (C.) .- Contribution à l'étude de l'anophélisme et du paludisme en Corse .- Monogr. Inst. natn. Hyg., 1954, 4, 112 p.

1183. TOUR (S.) .- Ecologie des microsporidies chez les Culicides du "Midi" méditerranéen .- Montpellier, Faculté des Sciences, 1969, 82 + VIII p. (thèse 3e cycle).

1184. TOUR (S.), RIOUX (J.A.), CROSET (H.) .- Systématique et écologie des microsporidies (Microsporidia-Nosematidae) parasites de larves de Culicides (Diptera-Culicidae). Enquête sur les espèces du Midi méditerranéen. Stempellia tuzetae n. sp. .- Annls Parasit. hum. comp., 1971, 46 (3) 205-223.

1185. TOUSSAINT (A.) .- La lutte contre les moustiques dans le département du Bas-Rhin .- Strasbourg, ?, 1939.

1186. TRAN TRUNG SON .- Résistance des imagos femelles de Culex pipiens dans la ville de Toulouse au DDT et au dieldrin .- Toulouse, Faculté de Médecine, 1963, 59 p. (thèse).

1187. TREILLARD (M.) .- Les Anophèles de la région méditerranéenne occidentale et leurs représentants en Camargue .- Bull. Soc. natn. Acclimatation, (après 1923) : 29-35.

1188. TREILLARD (M.) .- Anophèles de Camargue .- Bull. Soc. Path. exot., 1937, 30 (2) 136-139.

1189. TREILLARD (M.) .- Au sujet d'une variété méridionale de l'Anopheles maculipennis .- Bull. Soc. Path. exot., 1939, 32 (10) 934-936.

1190. TREILLARD (M.) .- La faune culicidienne de la plaine bourguignonne .- Bull. Soc. Path. exot., 1941, 34 (9/10) 265-268.

1191. TREILLARD (M.) .- Anopheles hyrcanus en Provence. Morphologie et biologie. Gîtes et refuges .- Bull. Soc. Path. exot., 1942, 35 (1/2) 14-18.

1192. TREILLARD (M.) .- Anopheles hyrcanus en Provence .- Paris, 13e Congr. internat. Zoologie 1948 : 505-506.

1193. TREMOLIERES (F.), FARROY (G.) .- Quatre cas de paludisme autochtone .- Bull. Mém. Soc. méd. Hôp. Paris, 1918, 42 : 22-27.

1194. TRENSZ (F.) .- L'index maxillaire d'Anopheles maculipennis et la théorie du zootropisme anophélien .- Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1930, 8 (1) 1-70.

1195. TRENSZ (F.) .- Recherches sur l'index maxillaire de l'A. maculipennis (note préliminaire) .- Bull. Soc. Path. exot., 1930, 23 (1) 43-47.

Source : MNHN, Paris

1196. TRENSZ (F.) .- De l'influence des rayons solaires sur le cycle évolutif des Aedes mariae .- C.R. Soc. Biol., 1934, 115 : 1108-1110.

1197. TRENSZ (F.) .- Le paludisme en Alsace (Aperçu historique) .- Arch. Inst. Pasteur Algérie 1937, 15 (4) 440-449.

1198. TUZET (O.), MANIER (J.F.) .- Orphella culici n. sp. entophyte parasite du rectum des larves de Culex hortensis Felb. .- C.R. Acad. Sci., 1947, 225 : 264-266.

1199. TUZET (O.), RIOUX (J.A.), MANIER (J.F.) .- Rubetella culicis (Tuzet et Manier, 1947), trichomycètes rameux parasite de l'ampoule rectale des larves de Culicides (morphologie et spécificité) .- Vie et Milieu, 1961, 12 (1) 167-187.

1200. VALLERY-RADOT (P.), GENIN, DUPURT .- Un cas de paludisme à Paris chez un enfant de cinq ans n'ayant jamais quitté la France .- Arch. fr. Pédiatr., 1948, 5 (4) 383-385.

1201. VAN GAVER (F.), PRINGAULT (E.) .- Contribution à l'étude des Culicidés de la région marseillaise .- C.R. Soc. Biol., 1914, 77 : 401-402.

1202. VAN THIEL (P.) .- Quelles sont les excitations incitant l'Anopheles maculipennis atroparvus à visiter et à piquer l'homme ou le bétail ? .- Bull. Soc. Path. exot., 1937, (2) 193-203.

1203. VAN THIEL (P.), SAUTET (J.) .- Etude concernant l'existence de biotypes anthropophiles de l'Anopheles maculipennis .- Bull. Soc. Path. exot., 1937, 30 (2) 186-193.

1204. VAN THIEL (P.), WEURMAN (C.) .- Observations physiques concernant les causes de pénétration de l'Anopheles maculipennis var. atroparvus à jeûn dans les locaux habités ou non par l'homme ou par le porc .- Bull. Soc. Path. exot., 1946, 39 (7/8) 290-295.

1205. VERDIER (J.M.) .- Biologie comparée de deux espèces jumelles. Un exemple chez les arthropodes hématophages : les espèces A et B du complexe Aedes (Ochlerotatus) detritus (Haliday, 1833)(Diptera-Culicidae) .- Montpellier, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, 1978, 103 + XVI p. (thèse 3e cycle).

1206. VERDUN (P.), FEYTAUD (J.) .- Organisation pratique de la lutte contre les moustiques. Instructions sommaires .- Bull. Soc. Et. Vulgar. Zool. agric., 1918 (4 p.)

1207. VERMEIL (C.) .- Contribution à l'étude des Culicidés (Diptera, Nematocera) de l'île d'Hoedick (Morbihan) .- Cah. Natur., 1966, 22 (3) 93-94.

1208. VERMEIL (C.) .- Paludisme et lac de Grand-Lieu .- Congr. Soc. savantes, 1972, 97 : 64-65.

1209. VERMEIL (C.) REHEL (H.) .- Contribution à l'étude des Arthropodes parasites récoltés dans l'île Dumet (Loire-Atlantique) .- Bull. Soc. Sci. nat. Ouest France, 1965, 62 15-19.

1210. VERMEIL (C.), REHEL (H.), MARGUET (S.) .- Contribution à l'étude toxicologique des Culicidés (Diptera, Nematocera) de Loire-Atlantique .- Bull. Soc. Pharm. Ouest, 1967, 9 (1) 17-38.

1211. VERNIER (M.) .- Contribution à l'étude morphologique et biologique des Aedes anthropophiles du Languedoc-Roussillon .- Montpellier, Faculté de Médecine, 1957, 43 + VIII p. (thèse).

1212. VIGNE (P.), ROMAN (E.) .- La lutte contre les moustiques dans les agglomérations urbaines .- Avenir méd., 1932, 29 (5) 141-146.

1213. VIGNE (P.), ROMAN (E.) .- La lutte des moustiques dans les agglomérations urbaines (suite et fin) .- Avenir méd., 1932, 29 (6) 169-176.

Source : MNHN, Paris

1214. VIGNE (P.), ROMAN (E.) .- Le moustique citadin et la protection des fosses septiques .- Avenir méd., 1938, 35 (4) 100-109.

1215. VIGO (G.) .- Contribution à l'étude des substrats des aires culicidogènes du littoral Languedoc-Roussillon .- Perpignan, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Centre Universitaire de Perpignan, 1974, 325 + XIII p. (thèse d'université).

1216. VILLENEUVE (J.) .- Deuxième note sur les Nématocères vulnérants (espèces françaises) .- Bull. Soc. ent. France, 1919, 55 (2) 54-60.

1217. VILLENEUVE (J.) .- Addition à la liste des Nématocères vulnérants de France (Dipt.) .- Bull. Soc. ent. France, 1919, 55 (11) 198.

1218. VILLON (P.) .- Le paludisme dans le delta du Rhône. Etude historique, géographique et clinique de la fièvre paludéenne dans la région du Bas-Rhône et de la Basse Camargue .- Lyon, Faculté de Médecine, 1921, 102 p. (thèse).

1219. VIOLLE (H.), SAUTET (J.) .- Contribution à l'étude du colibacille chez le Culex pipiens, race autogène des fosses septiques .- C.R. Soc. Biol., 1937, 126 : 368-370.

1220. VIOLLE (H.), SAUTET (J.) .- Etude du pouvoir bactéricide de Culex pipiens, race autogène vis-à-vis du colibacille .- C.R. Soc. Biol., 19387, 127 : 80-82.

1221. VOELCKEL (C.) .- Contribution à l'étude écologique des aires culicidogènes du complexe lagunaire de Saint-Nazaire (Roussillon) .- Perpignan, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Centre Universitaire de Perpignan, 1977, 298 p., 2 cartes h.t. (thèse d'université).

1222. VOIRIN (M.) .- Deux nouveaux cas de paludisme provenant du foyer autochtone de la Seille .- Bull. Soc. Méd. Nancy, 1917, 3 (4) 273-276.

1223. VUILLET (J.), LEVAVASSEUR (G.) .- Excitation biologique des ultra-sons sur les oeufs d'Anopheles maculipennis .- Méd. trop., 1947, 7 (4) 343-346.

1224. WEBER (R.) .- Déboisement et paludisme. Etude d'hygiène sociale .- Paris, Faculté de Médecine, 1922, 35 p. (thèse).

1225. WURST (R.) .- Sur quelques lacunes des réglements d'hygiène à Paris .- Bull. Acad. natn. Méd., 1916, 76 (29) 39-46.

1226. WURTZ (R.) .- Sur la nécessité de donner aux autorités sanitaires, en France, le droit de rechercher et de détruire les larves de moustiques .- Bull. Acad. natn. Méd., 1916, 76 (36) 189-195.

1227. ZUCCARELLI .- Le paludisme et les moyens de le combattre .- Bastia, Santi impr., 1914.

1228. ZUCCARELLI .- Le paludisme en Corse et les paludéens de l'Armée d'Orient .- J. Pratic., 1917 (6 oct.) 631.

Source : MNHN, Paris



Imago femelle d'*Aedes caspius*.

Source : MNHN, Paris

INDEX DES ESPECES

Source : MNHN, Paris

Source : MNHN, Paris

AEDES (OCHLEROTATUS) ANNULIPES (Meigen, 1830)

Carte p. 175

Espèce signalée dans 19 départements : Ain, Hautes-Alpes, Ardennes, Charente-Maritime, Côte d'Or, Creuse, Indre-et-Loire, Isère, Loire-Atlantique, Oise, Bas-Rhin, Haut-t-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Savoie, Seine-et-Marne, Vienne, Yvelines, territoire de Belfort, région parisienne.

Cycle saisonnier : 8, 285, 387, 392, 700, 726, 766, 1067, 1072.

LARVE

clé de détermination : 456, 634, 1052, 1059, 1063, 1067, 1072.
densité : 5, 627.
description : 1059, 1067.
espèces associées : 127,129, 159, 163, 279, 380, 381, 501, 627, 628, 748.
gîtes larvaires : 159, 285, 387, 501, 627, 628, 748, 850, 865, 1059, 1067, 1072.
altitude : 285, 380, 382, 700, 726.
composition physico-chimique : 5, 6, 627, 700, 731, 748.

ADULTE

clé de détermination : 298, 742, 1054, 1063, 1067, 1072.
hypopygium : 303.
cycle nycthéméral : 163.
description : 298.
hypopygium : 303.
dispersion : 383, 627.
essaim : 163.
gîtes de repos : 163, 392, 538, 1055.
préférences trophiques : 6, 163, 388, 538, 852.
voltinisme : 163

Récapitulatif : 5, 6, 8, 127, 129, 159, 163, 168, 279, 285, 298, 303, 380 à 383, 387, 388, 392, 456, 501, 515, 538, 627, 628, 634, 690, 700, 726, 731, 742, 748, 766, 773, 850, 852, 855, 865, 1052, 1055, 1059, 1063, 1067, 1072, 1082, 1190, 1210.

AEDES (OCHLEROTATUS) BERLANDI Séguy, 1921.

Carte p. 175

Espèce signalée dans 12 départements : Aude, Bouches-du-Rhône, Corse, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Pyrénées-Orientales, Rhône, Var, Vaucluse, région parisienne.

Synonymie avec Aedes heracleensis Callot 1944 : 134.

Cycle saisonnier : 1079.

OEUF

gîtes de ponte : 1077.

LARVE

clé de détermination : 10, 274, 447, 456, 520, 797, 801, 1162.
description : 10, 132, 797, 802.

Source : MNHN, Paris

développement larvo-nymphal : 1079.
espèces associées : 132, 447, 797, 801.
gîtes larvaires : 10, 132, 275, 444, 447, 797, 799, 801, 819, 1199.
altitude : 797
composition physico-chimique : 275, 444, 447, 797, 801, 813.
parasites : 797, 799.

ADULTE

clé de détermination : 10, 447, 797, 801, 1060, 1067, 1068, 1072, 1162.
hypopygium : 10, 447, 797, 801, 1162.
cycle nycthéméral : 266, 275, 1079, 1179.
description : 10, 132, 797, 1060, 1067, 1068.
hypopygium : 797, 1060, 1067, 1068.
facteur du milieu : 266.
préférences trophiques : 444, 447.

Récapitulatif : 10, 51, 132, 134, 168, 266, 273 à 275, 444, 447, 456, 520, 689, 773, 797, 799, 801, 802, 813, 819, 848, 988, 1020, 1051, 1060, 1067, 1068, 1071, 1072, 1076, 1077, 1079, 1162, 1179, 1199.

AEDES (OCHLEROTATUS) CANTANS (Meigen, 1818)

Carte p. 175

Espèce signalée dans 43 départements : Ain, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Calvados Charente-Maritime, Corrèze, Corse, Côte d'Or, Creuse, Drôme, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Mayenne, Nièvre, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Yvelines, région parisienne.

Cycle saisonnier : 7, 8, 163, 175, 177, 285, 298, 383, 387, 392, 445, 610, 700, 726, 731, 748, 751, 766, 992, 993, 1072, 1077.

OEUF
hibernation : 298, 299.

LARVE
clé de détermination : 10, 175, 456, 520, 634, 992, 993, 1052, 1059, 1063, 1067, 1072, 1126.
densité : 5, 384, 627.
description : 10, 992, 993, 1067, 1089, 1090.
développement larvo-nymphal : 731, 919.
espèces associées : 5, 163, 175, 279, 285, 380, 384, 386, 465, 501, 610, 627, 748, 766.
gîtes larvaires : 10, 13, 163, 175, 176, 285, 379, 380, 387, 465, 501, 538, 610, 627, 635, 672, 728, 748, 751, 992, 993, 1055, 1061, 1067, 1072, 1077, 1090.
altitude : 285, 380, 382, 384, 386, 700, 726.
composition physico-chimique : 5, 6, 8, 38, 163, 175, 176, 208, 380, 627, 635, 700, 727, 731, 748.

NYMPHE
clé de détermination : 1142.
description : 1090, 1142.

Source : MNHN, Paris

ADULTE
capture : 751, 766.
clé de détermination : 10, 298, 742, 992, 993, 1054, 1063, 1067, 1072.
hypopygium : 10, 303, 992, 993.
genitalia femelle : 1139.
cycle nycthéméral : 5, 163, 751, 766, 993, 1077.
description : 10, 298, 760, 992, 993, 1090.
hypopygium : 100, 303, 992, 993, 1090.
genitalia femelle : 100, 1139.
dispersion : 383.
essaim : 163.
facteurs du milieu : 751, 1080.
gîtes de repos : 163, 392, 528, 766.
hibernation : 993.
piqûre : 1077
ponte : 1077
préférences trophiques : 5, 6, 383, 388, 538, 731, 751, 766.
vol : 5, 751, 1077.
voltinisme : 163, 175, 298.

Récapitulatif : 5 à 8, 10, 13, 38, 62, 88, 100, 163, 168, 170, 175 à 177, 208, 249, 279, 285, 298, 299, 302, 303, 354, 379, 380, 382 à 384, 386 à 388, 392, 445, 456, 465, 501, 505, 520, 538, 610, 618, 627, 634, 635, 672, 689, 690, 700, 725 à 728, 731, 742, 748, 751, 759, 760, 766, 773, 849, 855, 863, 865, 919, 992, 993, 1052, 1054, 1055, 1059, 1061, 1063, 1067, 1072, 1077, 1080, 1082, 1089, 1090, 1126, 1127, 1137, 1139, 1142, 1190.

AEDES (OCHLEROTATUS) CASPIUS (Pallas, 1771)

Carte p. 175

Espèce signalée dans 34 départements : Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados Charente-Maritime, Corse, Côtes-du-Nord, Drôme, Finistère, Gard, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Landes, Loire-Atlantique, Manche, Morbihan, Moselle, Oise, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Seine-Maritime Seine-et-Marne, Var, Vendée, Yvelines, région parisienne, territoire de Belfort.

Cycle saisonnier : 14, 15, 16, 347, 442, 445, 495, 562, 566, 570, 634, 635, 649, 651, 772, 797, 801, 974, 1072, 1154, 1211.

Elevage : 43, 571, 647, 1154.

ŒUF
description : 43, 347, 350, 1211.
développement embryonnaire : 1154.
diapause : 920, 974, 1154, 1155, 1157, 1211.
éclosion : 347, 920, 974, 1154, 1156, 1211.
gîtes de ponte : 347, 988.

LARVE
alimentation : 43.
clé de détermination : 10, 274, 447, 456, 520, 634, 797, 801, 1052, 1063, 1067, 1072, 1162.
densité : 627, 649, 651.
description : 10, 52, 797, 1089, 1121, 1211.
développement larvo-nymphal : 43, 248, 347, 819, 820, 974, 1154.
diapause : 890.

Source : MNHN, Paris

espèces associées : 16, 32, 52, 160, 204, 247, 275, 277, 281, 395, 401, 442, 447, 465, 520, 627, 628, 634, 635, 649, 663, 664, 772, 797, 801, 803, 818, 844, 852, 972, 974, 1056, 1067, 1141, 1207, 1211, 1215.
gîtes larvaires : 10, 14, 15, 16, 52, 160, 228, 247, 275, 281, 347, 395, 401, 433, 442, 445, 447, 465, 520, 562, 566, 570, 605, 618, 627, 628, 634, 635, 649, 651, 664, 672, 689, 745, 772, 797, 801, 819, 852, 974, 988, 1017, 1020, 1045, 1056, 1061, 1067, 1072, 1141, 1149, 1172, 1199, 1207, 1210, 1211, 1215, 1221 , 568, 575.
altitude : 275.
composition physico-chimique : 14, 15, 16, 38, 250, 275, 277, 281, 347, 348, 566, 568, 570, 604, 618, 627, 634, 635, 637, 649, 651, 745, 801, 844, 1045, 1149, 1150, 1154, 1210, 1215, 1221.
parasites : 47, 1184, 1199.

NYMPHE
description : 1211.

ADULTE
accouplement : 43, 347.
autogenèse : 43, 825.
clé de détermination : 10, 447, 797, 801, 1054, 1060, 1063, 1067, 1068, 1072, 1162.
hypopygium : 10, 447, 797, 801, 1162.
cycle nycthéméral : 160, 266, 275, 347, 416, 447, 515, 772, 818, 974, 1179.
description : 10, 52, 760, 797, 1068, 1211.
appareil digestif : 319.
dispersion : 113, 570, 571, 772, 797, 801, 1211.
essaim : 347, 1072.
estérases : 647, 648.
fécondité : 43, 1154.
gîtes de repos : 438, 570, 973.
longévité : 1154.
ponte : 974, 1154, 1211.
préférences trophiques : 772, 852, 854.
repas sanguin : 772.
sex ratio : 347.
vecteur :
Dirofilaria immitis : 1067.
Dirofilaria repens : 33.
myxomatose : 495.
virus Tahyna : 435, 439, 490, 495, 657 (échec), 698, 836.
voltinisme : 562, 570, 577, 627, 974, 1056, 1067.

Récapitulatif : 10, 14 à 16, 32, 33, 38, 39, 41, 43, 51, 52, 62, 113, 135, 160, 168, 202, 204, 224, 228, 247 à 250, 266, 273 à 275, 277, 281, 307, 309, 319, 339, 347, 348, 350, 354, 395, 401, 416, 432, 433, 435, 437 à 439, 442, 445, 447, 451, 456, 465, 490, 495, 500, 515, 520, 527, 528, 560, 562, 566, 568, 570, 571, 575, 577, 582, 604, 605, 618, 627 à 629, 634 à 637, 639, 647 à 649, 651, 657, 663, 664, 668, 672, 689, 690, 745, 759, 760, 772, 773, 795, 797, 800, 801, 803, 817 à 820, 822, 825, 836, 844, 852, 854, 855, 920, 972 à 974, 988, 1017, 1020, 1045, 1052, 1054 à 1056, 1060, 1061, 1063, 1067, 1068, 1072, 1077, 1089, 1121, 1141, 1149, 1150, 1154 à 1157, 1162, 1172, 1179, 1184, 1199, 1207, 1210, 1211, 1215, 1216, 1221.

AEDES (OCHLEROTATUS) CATAPHYLLA Dyar, 1916 *Carte p. 175*

Espèce signalée dans 14 départements : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-

Source : MNHN, Paris

Maritimes, Doubs, Drôme, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales Savoie, Haute-Savoie, Var.

Cycle saisonnier : 8, 380.

LARVE
clé de détermination : 456, 634.
densité : 239, 384, 706, 707, 708.
description, papilles anales : 154.
espèces associées : 133, 136, 167, 380, 381, 384, 386, 706.
facteurs du milieu :
action sur les papilles anales : 130, 136, 137, 154.
gîtes larvaires : 133, 136, 154, 167, 380, 386, 387, 706, 821.
altitude : 133, 154, 167, 240, 285, 380, 382, 384, 386, 387, 700, 706, 707, 726, 821, 848, 1119.
composition physico-chimique : 380, 700, 706, 707, 731.

ADULTE
clé de détermination : 240.
dispersion : 240.
préférences trophiques : 133, 136.
voltinisme : 240.

Récapitulatif : 8, 130, 133, 135 à 137, 154, 166 à 168, 239, 240, 285, 380 à 382, 384, 386, 387, 456, 634, 700, 706 à 708, 726, 731, 773, 821, 848, 855, 858, 865, 1119.

AEDES (AEDES) CINEREUS Meigen, 1818

Carte p. 175

Espèce signalée dans 27 départements : Ain, Ardennes, Ariège, Corse, Creuse, Dordogne, Drôme, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Oise, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Savoie, Seine-et-Marne, Vienne, Yvelines, territoire de Belfort, région parisienne.

Cycle saisonnier : 7, 8, 163, 285, 298, 383, 387, 700, 726, 731, 735, 748, 751, 1067.

OEUF
hibernation : 298, 299.

LARVE
clé de détermination : 10, 274, 456, 520, 634, 797, 992, 993, 1052, 1063, 1067, 1072, 1126.
densité : 5, 384.
description : 10, 797, 992, 993.
développement larvo-nymphal : 731.
espèces associées : 128, 129, 163, 285, 380, 384, 387, 748, 855, 869, 871, 1053, 1067.
gîtes larvaires : 10, 100, 163, 285, 380, 387, 728, 748, 751, 865, 869, 1061, 1067, 1072.
altitude : 285, 380, 382, 384, 700, 726.
composition physico-chimique : 5, 6, 8, 380, 700, 727, 731, 748, 869.
parasites : 304.

NYMPHE
clé de détermination : 1142.
description : 1142.

Source : MNHN, Paris

ADULTE
clé de détermination : 10, 298, 797, 992, 993, 1063, 1067.
genitalia femelle : 1139.
hypopygium : 10, 303, 797, 992, 993.
cycle nycthéméral : 163, 751.
description : 10, 298, 797, 992, 993, 1067.
genitalia femelle : 1139.
hypopygium : 10, 101, 303, 797, 992, 993.
dispersion : 383.
gîtes de repos : 993.
préférences trophiques : 6, 163, 731, 751, 993.
voltinisme : 163, 748.

Récapiculatif : 5 à 8, 10, 13, 62, 100, 101, 128, 129, 154, 163, 168, 172, 273, 274, 279, 285, 298, 299, 303, 304, 307, 354, 380, 382 à 384, 386, 387, 392, 456, 460, 520, 634, 689, 690, 700, 725 à 728, 731, 735, 737, 748, 751, 773, 797, 830, 855, 863, 865, 869, 871, 992, 993, 1052, 1061, 1063, 1067, 1072, 1076, 1077, 1126, 1139, 1142, 1168, 1212, 1216.

AEDES (OCHLEROTATUS) COMMUNIS (De Geer, 1776)

Carte p. 176

Espèce signalée dans 34 départements : Ain, Hautes-Alpes, Ardennes, Bouches-du-Rhône, Corse, Côte d'Or, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Vosges, Yvelines, territoire de Belfort, région parisienne.

Cycle saisonnier : 163, 298, 380, 387, 751, 1056, 1067, 1072.

OEUF
gîtes de ponte : 1077.

LARVE
clé de détermination : 10, 274, 456, 520, 634, 797, 1052, 1063,1067, 1072.
densité : 239.
description : 690, 797, 1067.
larve anormale : 128.
développement larvo-nymphal : 1077.
diapause : 890.
espèces associées : 88, 127, 128, 163, 380, 501, 706, 748, 871, 1067.
gîtes larvaires : 10, 163, 174, 380, 387, 501, 538, 690, 706, 748, 751, 821, 871, 1017, 1020, 1056, 1061, 1067, 1072, 1077.
altitude : 285, 380, 382, 387, 700, 706, 726, 751, 821.
composition physico-chimique : 700, 748, 871,1077.
marquage : 239.
phototropisme : 158.

ADULTE
capture : 751.
clé de détermination : 10, 240, 298, 742, 797, 1054, 1056, 1063, 1067, 1072.
hypopygium : 10, 303, 797.
cycle nycthéméral : 751, 1072, 1077.
description : 298, 690, 760, 797.
hypopygium : 100, 303, 797.
facteurs du milieu : 1080.
piqûre : 1077.

Source : MNHN, Paris

préférences trophiques : 388, 538, 751, 851.
vol : 1077.
voltinisme : 298.

Récapitulatif : 10, 62, 88, 100, 113, 127, 128, 158, 163, 168, 174, 239, 240, 274, 285, 298, 299, 303, 307, 354, 380, 382, 387, 388, 456, 501, 520, 538, 627, 634, 639, 689, 690, 700, 706, 707, 726, 735, 737, 742, 748, 751, 759, 760, 765, 773, 797, 821, 830, 851, 855, 865, 871, 890, 974, 1017, 1020, 1052, 1054, 1056, 1058, 1061, 1063, 1067, 1072, 1077, 1080, 1082, 1168, 1179, 1180, 1190, 1210, 1216.

AEDES (OCHLEROTATUS) DETRITUS (Haliday, 1833) *Carte p. 176*

Espèce signalée dans 22 départements : Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente-Maritime, Corse, Côtes-du-Nord, Finistère, Gard, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Manche, Morbihan, Moselle, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Var, Vendée.

Cycle saisonnier : 14, 16, 347, 419, 442, 445, 447, 495, 634, 635, 649, 651, 772, 797, 801, 972, 1072, 1205.

Elevage : 43, 419, 1205.

COMPLEXE : 47, 418, 419, 720, 1205.

OEUF
description : 347, 350, 1211.
éclosion : 347, 926, 972, 1211.
embryologie : 420.
gîtes de ponte : 347, 822, 988.

LARVE
alimentation : 418, 419, 422, 1211.
clé de détermination : 10, 274, 447, 456, 520, 634, 797, 801,1052, 1063, 1067, 1072, 1162.
densité : 239, 627, 649, 651, 706, 821, 1211.
description : 10, 52, 797, 1121, 1211.
larve anormale : 926.
développement larvo-nymphal : 43, 248, 347, 919.
diapause : 890, 1211.
espèces associées : 16, 32, 52, 204, 247, 275, 281, 395, 401, 442, 443, 447, 465, 501, 605, 627, 628, 634, 635, 649, 664, 672, 772, 797, 801, 818, 844, 972, 1051, 1056, 1067, 1141, 1207, 1211, 1215.
gîtes larvaires : 10, 14, 16, 52, 113, 247, 275, 280, 281, 347, 395, 401, 419, 421, 438, 442, 445, 447, 465, 501, 605, 618, 627, 628, 634, 635, 649, 651, 664, 672, 689, 706, 745, 772, 797, 801, 819, 972, 988, 1017, 1020, 1045, 1051, 1061, 1067, 1072, 1141, 1199, 1207, 1211, 1215, 1221.
altitude : 275, 280.
composition physico-chimique : 14, 16, 38, 250, 275, 277, 280, 281, 347, 348, 419, 421, 442, 443, 604, 618, 627, 634, 635, 637, 649, 651, 706, 745, 797, 801, 844, 972, 1045, 1199, 1215, 1221.
marquage : 239, 821.
parasites : 799.
respiration : 322.

NYMPHE
description : 1211.
respiration : 322.

Source : MNHN, Paris

ADULTE
accouplement : 43, 347.
alimentation : 418, 419, 1211.
autogenèse : 43, 47, 418, 419, 420, 423, 823, 824, 1205.
clé de détermination : 10, 447, 797, 801, 1054, 1063, 1067, 1072, 1162.
hypopygium : 10, 447, 797, 801, 1162.
cycle nycthéméral : 275, 347, 447, 772, 818, 1179, 1211.
description : 10, 52, 797, 1211.
appareil digestif : 322, 1211.
appareil reproducteur femelle : 418.
hypopygium : 52, 797, 1211.
dispersion : 442, 447, 772, 797, 801, 1211.
essaim : 347.
estérases : 47, 419, 648, 720, 1205.
facteurs du milieu : 418, 419.
fécondité : 43, 418, 422, 423.
gîtes de repos : 438, 973.
parasites et maladies : 47, 287, 421, 450, 451, 452, 1183, 1184, 1199, 1205.
préférences trophiques : 772, 852.
sex ratio : 347.
vecteur : 33, 495.
voltinisme : 801.

Récapitulatif : 10, 12, 14, 16, 32, 33, 38, 39, 43, 47, 51, 52, 113, 168, 204, 224, 239, 247 à 250, 273 à 275, 277, 280, 281, 287, 307, 309, 322, 339, 347, 348, 350, 354, 395, 401, 418 à 423, 438, 442, 443, 445, 447, 450 à 452, 456, 465, 495, 500, 501, 520, 604, 605, 618, 627 à 629, 634 à 637, 648, 649, 651, 660, 663, 664, 672, 689, 706, 720, 745, 772, 773, 797, 799 à 801, 817 à 819, 821 à 824 , 844, 852, 855, 890, 919, 926, 972 à 974, 988, 1017, 1020, 1045, 1051, 1052, 1054, 1056, 1058, 1061, 1063, 1067, 1072, 1121, 1141, 1162, 1179, 1183, 1184, 1199, 1205, 1207, 1210, 1211, 1215, 1217, 1221.

AEDES (OCHLEROTATUS) DIANTEUS Howard, Dyar et Knab, 1912 *Carte p. 176*

Espèce signalée dans 1 département : Bas-Rhin.

OEUF
hibernation : 690.

LARVE
clé de détermination : 456, 634.
description : 690.

ADULTE
accouplement : 690.
clé de détermination : 1093
hypopygium : 1093.
description : 690.

Récapitulatif : 168, 456, 634, 690, 773, 1093.

AEDES (OCHLEROTATUS) DORSALIS (Meigen, 1830) *Carte p. 176*

Espèce signalée dans 18 départements : Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse ,

Source : MNHN, Paris

Côte d'Or, Côtes-du-Nord, Finistère, Gironde, Ille-et-Vilaine, Jura, Loire-Atlantique, Morbihan, Moselle, Oise, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Seine-et-Marne, Vendée, territoire de Belfort.

LARVE
clé de détermination : 456, 634, 797, 801, 1067.
description : 797, 1121.
gîtes larvaires : 298, 501, 1017, 1020, 1072, 1141.
hibernation : 299.
sexe (détermination du) : 516.

ADULTE
accouplement forcé : 43.
autogenèse : 826.
clé de détermination : 298, 797, 801, 1060, 1063, 1068, 1072.
hypopygium : 303, 797, 801.
cycle nycthéméral : 1072.
description : 298, 797.
hypopygium : 303, 797.
essaim : 1072.

Récapitulatif : 43, 88, 168, 298, 299, 303, 456, 501, 516, 634, 690, 773, 797, 801, 826, 1017, 1020, 1058, 1060, 1063, 1067, 1068, 1071, 1072, 1077, 1121, 1141.

AEDES (FINLAYA) ECHINUS (Edwards, 1920)

Carte p. 176

Espèce signalée dans 1 département : Seine-et-Marne.
présence douteuse : 773.

LARVE
clé de détermination : 456, 634, 1063, 1067, 1072.
description : 634, 1121.
espèces associées : 1086.
gîtes larvaires : 1067.

ADULTE
clé de détermination : 1063, 1067.
description : 1067.

Récapitulatif : 456, 634, 1063, 1067, 1072, 1077, 1086, 1121.

AEDES (OCHLEROTATUS) EXCRUCIANS (Walker, 1856)

Carte p. 176

Espèce signalée dans 21 départements : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Haute-Garonne, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Rhône, Savoie, Seine-et-Marne, Yvelines, région parisienne.

Cycle saisonnier : 7, 8, 285, 387, 700, 726, 748.

LARVE
clé de détermination : 23, 456, 634, 992, 993, 1059, 1063, 1067, 1072, 1126.
densité : 5, 384, 386.
description : 690, 1059.
espèces associées : 279, 285, 380, 382, 384, 706, 728, 748.
gîtes larvaires : 279, 285, 380, 386, 387, 706, 728, 748, 821, 1072, 1077.

Source : MNHN, Paris

altitude : 285, 380, 384, 386, 700, 706, 726, 821.
composition physico-chimique : 5, 279, 700, 727, 731, 748.
marquage : 821.

ADULTE
clé de détermination : 23, 992, 993, 1054, 1063, 1067, 1072, 1139.
hypopygium : 23, 992, 993.
description : 690.
génitalia femelle : 1139.
voltinisme : 748.

Récapitulatif : 5, 7, 8, 23, 168, 279, 285, 380, 382, 384, 386, 387, 456, 634, 690, 700, 706, 707, 726 à 728, 731, 748, 773, 821, 855, 992, 1054, 1055, 1059, 1063, 1067, 1072, 1077, 1126, 1127, 1139, 1168.

AEDES (OCHLEROTATUS) FLAVESCENS (Müller, 1764) *Carte p. 177*

Espèce signalée dans 16 départements : Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Côte-d'Or, Gironde, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Oise, Puy-de-Dôme, Seine-et-Marne, Vendée, Yvelines, région parisienne.

LARVE
clé de détermination : 456, 634, 797, 801, 1067.
densité : 627.
description : 628, 797, 1067.
espèces associées : 277, 465, 605, 627, 628.
gîtes larvaires : 136, 277, 465, 502, 605, 627, 628, 1072, 1077.
composition physico-chimique : 137, 277, 627, 628.

ADULTE
clé de détermination : 797, 801, 1067, 1072.
hypopygium : 797, 801.
cycle nycthéméral : 797.
description : 797.
hypopygium : 797.

Récapitulatif : 62, 88, 131, 136, 137, 168, 204, 277, 438, 456, 465, 502, 605, 627, 628, 634, 664, 760, 773, 797, 801, 1067, 1072, 1077.

AEDES (AEDES) GEMINUS Peus 1970. *Carte p. 177*

Espèce signalée dans 3 départements : Ain, Isère, Haute-Savoie.

LARVE
espèces associées : 748.
gîtes larvaires : 748.
composition physico-chimique : 748.

Récapitulatif : 387, 748, 871.

AEDES (FINLAYA) GENICULATUS (Olivier, 1791) *Carte p. 177*

Espèce signalée dans 58 départements : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-

Source : MNHN, Paris

Maritimes, Ardennes, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente-Maritime, Corse, Creuse, Dordogne, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Indre-et-Loire, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Meuse, Morbihan, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Yvelines, territoire de Belfort, région parisienne.

Cycle saisonnier : 86, 163, 175, 177, 298, 380, 392, 445, 748, 751, 766, 946, 992, 993, 1055, 1064, 1066, 1067, 1072, 1077, 1079, 1122.

Elevage : 917, 947.

OEUF

quiescence : 938, 950, 1066.

éclosion : 946, 950, 1064, 1077, 1079.

gîtes de ponte : 1077, 1079.

LARVE

alimentation : 163, 1064, 1066.

clé de détermination : 10, 175, 274, 447, 456, 520, 634, 797, 801, 992, 993, 1052, 1063, 1067, 1072, 1126, 1162.

densité : 627.

description : 10, 797, 846, 992, 993, 1121, 1211.

développement larvo-nymphal : 567, 577, 892, 894, 938, 946, 1064, 1066, 1077, 1079.

diapause : 90, 577, 846, 890, 894, 1064, 1066, 1067.

espèces associées : 127, 129, 132, 163, 175, 209, 275, 285, 298, 447, 453, 520, 627, 690, 751, 772, 797, 800, 801, 803, 846, 949, 992, 993, 1055, 1064, 1066, 1067, 1079, 1086, 1122, 1144.

gîtes larvaires : 10, 86, 90, 99, 127, 129, 132, 136, 163, 175, 176, 209, 275, 298, 380, 387, 444, 445, 447, 453, 465, 502, 515, 520, 562, 627, 672, 689, 728, 748, 751, 766, 797, 800, 801, 803, 819, 846, 854, 946, 948, 949, 992, 993, 1017, 1920, 1055, 1064, 1066, 1067, 1072, 1077, 1079, 1122, 1144, 1179, 1186, 1199, 1210, 1211.

altitude : 99, 136, 380, 382, 700, 726, 797.

composition physico-chimique : 163, 175, 176, 275, 380, 440, 447, 453, 627, 700, 748, 797, 813, 1077, 1079.

hibernation : 86, 1072.

parasites : 799.

phototropisme : 158.

NYMPHE

clé de détermination : 1142.

description : 1142.

ADULTE

accouplement : 917, 947, 1064, 1066, 1077.

clé de détermination : 10, 298, 447, 742, 801, 992, 993, 1054, 1063, 1067, 1162, 797.

génitalia femelle : 1139.

hypopygium : 10, 303, 447, 797, 801, 992, 993, 1162.

cycle nycthéméral : 163, 266, 275, 447, 751, 766, 993, 1066, 1077, 1079.

description : 10, 100, 298, 797, 846, 992, 993, 1211.

génitalia femelle : 1139.

hypopygium : 10, 100, 303, 797, 992, 993, 1125.

émergence : 1077.

facteurs du milieu : 266, 1079, 1080.

gîtes de repos : 392, 766.

piqûre : 209, 1077.

Source : MNHN, Paris

ponte : 1064, 1066, 1077.
préférences trophiques : 6, 86, 136, 384, 444, 538, 751, 766, 979, 1077.
vecteur : 945, 949, 982.
vol : 1077, 1079.
voltinisme : 562, 946, 1055.

Récapitulatif : 6, 10, 13, 51, 83, 86, 88, 90, 100, 127, 129, 136, 158, 163, 168, 175 à 177, 204, 209, 266, 273 à 275, 284, 285, 298, 299, 302,303, 307, 355, 380, 382, 383, 387, 388, 392, 438, 444, 445, 447, 453, 455, 456, 465, 495, 502, 515, 520, 538, 562, 567, 577, 627, 634, 672, 689, 690, 700, 726, 728, 735, 737, 742, 748, 751, 765, 766, 772, 773, 797, 799 à 801, 803, 813, 819, 830, 846, 848, 849, 852, 854, 863, 865, 890, 892, 894, 917, 938, 945, 946 à 950, 979, 982, 992, 993, 1017, 1020, 1052, 1054, 1055, 1058, 1063 à 1067, 1071, 1072, 1077, 1079, 1080, 1082, 1086, 1121, 1122, 1126, 1131, 1139, 1142, 1144, 1162, 1179, 1186, 1199, 1201, 1210 à 1212, 1216, 99, 132, 1125.

AEDES (OCHLEROTATUS) MARIAE (Sergent et Sergent, 1903) *Carte p. 177*

Espèce signalée dans 8 départements : Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Var.

Elevage : 640, 1196.

OEUF
description : 640.
développement embryonnaire : 640.
gîtes de ponte : 643, 1068.
ultrasons (action des) : 1044.

LARVE
clé de détermination : 10, 274, 456, 520, 634, 797, 1063, 1067, 1072, 1162.
description : 10, 127, 797, 1058, 1121.
appareil respiratoire : 1016.
développement larvo-nymphal : 98, 640.
espèces associées : 127, 275, 520, 797, 804, 1051, 1141.
facteurs du milieu : 1196.
gîtes larvaires : 10, 266, 275, 307, 520, 640, 643, 689, 745, 790, 797, 804, 819, 855, 1051, 1061, 1067, 1141, 1172, 1179, 1199.
altitude : 275.
composition physico-chimique : 266, 275, 745.
ultrasons (action des) : 1044.

NYMPHE
ultrasons (action des) : 1044.

ADULTE
accouplement : 640.
autogenèse : 825.
clé de détermination : 10, 797, 1054, 1060, 1063, 1067, 1068, 1072, 1162.
hypopygium : 10, 797, 1162.
cycle nycthéméral : 275, 1179.
description : 10, 797, 1068, 1211.
hypopygium : 10, 797, 1068, 1211.
ponte : 640, 641.

Récapitulatif : 10, 89, 98, 113, 127, 135, 168, 266, 273 à 275, 282, 307, 438, 456, 520, 634, 640, 641, 643, 689, 694, 745, 773, 790, 797, 804, 819, 825, 855, 1016, 1020, 1044, 1051, 1054, 1056, 1058, 1060, 1061, 1063, 1067, 1068, 1071, 1072, 1094,

Source : MNHN, Paris

1121, 1141, 1162, 1172, 1179, 1196, 1199, 1211.

AEDES (OCHLEROTATUS) NIGRINUS (Eckstein, 1918) *Carte p. 177*

Espèce signalée dans 3 départements : Bas-Rhin, Seine-et-Marne, région parisienne.

OEUF
- hibernation : 298, 299.

LARVE
- clé de détermination : 456, 634.
- espèces associées : 298.
- gîtes larvaires : 298.

ADULTE
- clé de détemination : 298.
  - hypopygium : 303.
- description : 298.
  - hypopygium : 303.
- voltinisme : 298.

Récapitulatif : 168, 298, 299, 303, 456, 634, 773.

AEDES (OCHLEROTATUS) PULCHRITARSIS (Rondani, 1872) *Carte p. 177*

Espèce signalée dans 10 départements : Bouches-du-Rhône, Corse, Haute-Garonne, Hérault, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Var, Yvelines, région parisienne.

LARVE
- clé de détermination : 456, 634, 797, 992, 993, 1126.
- description : 797, 802, 846, 992, 1121.
- développement larvaire : 852.
- espèces associées : 803, 846, 949.
- gîtes larvaires : 90, 797, 802, 803, 819, 846, 847, 852, 855, 948, 949, 1186.
  - altitude : 802.
  - composition physico-chimique : 802.
- hibernation : 846.

NYMPHE
- description : 846, 993.

ADULTE
- clé de détermination : 797, 992, 993, 1068, 1072.
  - génitalia femelle : 1139.
  - hypopygium : 797, 992, 993.
- cycle nycthéméral : 86, 90, 515.
- description : 797, 846, 992, 993.
  - génitalia femelle : 1139.
  - hypopygium : 797, 992, 993.
- piqûre : 90.
- préférences trophiques : 86.

Récapitulatif : 51, 86, 90, 168, 307, 456, 515, 634, 773, 797, 802, 803, 846 à 848, 852, 854, 855, 948, 949, 992, 993, 1020, 1051, 1064, 1068, 1071, 1072, 1121, 1122, 1126, 1131, 1139, 1186.

Source : MNHN, Paris

AEDES (OCHLEROTATUS) PULLATUS (Coquillett, 1904) *Carte p. 178*

Espèce signalée dans 14 départements : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Corse, Drôme, Haute-Garonne, Isère, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées , Pyrénées-Orientales, Savoie, Haute-Savoie.

LARVE

clé de détermination : 274, 456, 634, 1067, 1126.
densité : 384.
description : 1065.
espèces associées : 167, 380, 384, 706, 1067.
gîtes larvaires : 167, 380, 387, 706, 821, 1061, 1067, 1093, 1094.
altitude : 167, 285, 380, 382, 384, 387, 700, 706, 726, 821, 1093, 1094.
composition physico-chimique : 380, 700.

ADULTE

autogenèse : 825.
clé de détermination : 240, 1054, 1063, 1067.
hypopygium : 1093.
cycle nycthéméral : 275.
description : 1216.
hypopygium : 1062, 1067, 1216.
dispersion : 1100.

Récapitulatif : 99, 100, 135, 166 à 168, 240, 273 à 275, 285, 380, 382, 384, 387, 432, 456, 634, 700, 706, 707, 726, 773, 821, 825, 1054, 1055, 1061 à 1063, 1065, 1067, 1071, 1093, 1094, 1100, 1216.

AEDES (OCHLEROTATUS) PUNCTOR (Kirby, 1837) *Carte p. 178*

Espèce signalée dans 33 départements : Ain, Ardèche, Ardennes, Bouches-du-Rhône, Calvados Côte-d'Or, Haute-Garonne, Gironde, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Savoie, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Vendée, Vosges, Yvelines, territoire de Belfort, région parisienne.

*

LARVE

clé de détermination : 274, 456, 634, 797, 1063, 1067, 1072.
densité : 5, 384, 627.
description : 797, 1138.
papilles anales : 130, 136, 137, 154;
espèces associées : 133, 136, 163, 380, 384, 446, 501, 627, 706, 748, 871, 1067, 1088, 1138.
facteurs du milieu : 130, 136, 137, 154.
gîtes larvaires : 133, 136, 154, 163, 380, 387, 501, 627, 706, 748, 797, 821, 1061, 1067, 1072, 1138.
altitude : 133, 154, 285, 380, 382, 384, 387, 700, 706, 726, 821, 1072, 1119.
composition physico-chimique : 5, 6, 131, 136, 163, 380, 627, 700, 748, 871, 1119.
hibernation : 163.

NYMPHE

description : 1138.

ADULTE

clé de détermination : 240, 797, 1056, 1063, 1067, 1072.

Source : MNHN, Paris

génitalia femelle : 1139.
hypopygium : 797.
cycle nycthéméral : 163, 275, 1077.
description : 797, 1138.
génitalia femelle : 1139.
hypopygium : 797, 1138.
gîtes de repos : 163.
piqûre : 1077.
préférences trophiques : 6.
vecteur : 945.
voltinisme : 163.

* Cycle saisonnier : 163, 387, 748, 1072.

Récapitulatif : 5, 6, 51, 88, 130, 131, 133, 136, 137, 154, 163, 168, 240, 273 à 275, 285, 380, 382, 384, 387, 446, 456, 501, 515, 627, 634,690, 700, 706, 707, 726, 748, 773, 797, 821, 855, 871, 945, 974, 1056, 1058, 1061, 1063, 1067, 1071, 1072, 1077, 1088, 1119, 1137 à 1139, 1210.

AEDES (RUSTICOIDUS) REFIKI, Medschid, 1928. *Carte p. 178*

Espèce signalée dans 14 départements : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Rhône, Savoie, Var, Vaucluse.

Cycle saisonnier : 285, 380, 700, 726, 731.

LARVE
clé de détermination : 456, 634.
densité : 384.
description : 136, 381, 690.
développement larvo-nymphal : 731.
espèces associées : 285, 380, 381, 384, 386, 610, 690, 728.
gîtes larvaires : 285, 380, 381, 384, 728, 798.
altitude : 136, 285, 380, 381, 382, 384, 386, 700, 726, 798.
composition physico-chimique : 381, 384, 700, 727, 731.
hibernation : 381.

ADULTE
description : 136, 690.
hypopygium : 136, 381.
préférences trophiques : 6, 731.

Récapitulatif : 6, 51, 136, 168, 285, 380 à 382, 384, 386, 387, 456, 610, 634, 690, 700, 725 à 728, 731, 773, 798, 1185.

AEDES (RUSTICOIDUS) RUSTICUS (Rossi, 1790) *Carte p. 178*

Espèce signalée dans 44 départements : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardennes, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse, Côte-d'Or, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire-Atlantique, Mayenne, Morbihan, Oise, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Yvelines, territoire de Belfort, région parisienne.

Source : MNHN, Paris

Cycle saisonnier : 5, 7, 8, 38, 86, 90, 163, 175, 177, 285, 380, 383, 392, 610, 700, 726, 731, 748, 751, 766, 992, 1056, 1067, 1077, 1091, 1122.

OEUF
gîtes de ponte : 1137.
quiescence : 1137.

LARVE
clé de détermination : 10, 175, 456, 520, 634, 992, 993, 1059, 1063, 1067, 1072, 1126, 1162.
densité : 5, 384, 627.
description : 10, 456, 992, 993, 1067, 1089, 1091, 1126, 1137, 1158.
développement larvo-nymphal : 387, 731, 1077.
espèces associées : 5, 159, 277, 279, 285, 380, 381, 384, 386, 454, 465, 501, 520, 605, 610, 627, 690, 748, 766, 992, 993, 1137, 1138, 1158, 163.
gîtes larvaires : 10, 90, 136, 159, 175, 176, 285, 380, 386, 454, 465, 501, 520, 528, 605, 610, 627, 635, 689, 728, 748, 751, 993, 1058, 1067, 1072, 1077, 1091, 1137, 1158, 1186.
altitude : 285, 380, 382, 384, 386, 700, 726.
composition physico-chimique : 5, 6, 8, 38, 163, 175, 176, 380, 610, 627, 635, 637, 700, 727, 731, 748, 1077, 1151, 1158.
hibernation : 5, 163, 299, 380, 381.
parasites : 464.
phototropisme : 158.

NYMPHE
clé de détermination : 1142.
description : 1091, 1142.

ADULTE
clé de détermination : 10, 298, 742, 992, 993, 1063, 1067, 1072, 1162.
genitalia femelle : 1139.
hypopygium : 10, 303, 992, 993, 1162.
cycle nycthéméral : 86, 90, 163, 515, 993, 1077, 1091, 1137.
description : 10, 298, 992, 993, 1091, 1137, 1158.
genitalia femelle : 1139.
hypopygium : 303, 992, 993, 1091, 1125, 1158.
émergence : 1077.
essaim : 163, 1056, 1072.
facteurs du milieu : 751, 1080.
gîtes de repos : 163, 392, 766, 1077.
hibernation : 993.
piqûre : 1077.
ponte : 1077.
prédateurs : 398.
préférences trophiques : 6, 383, 388, 731, 751, 766, 852, 993.
vol : 1077.
voltinisme : 298, 992, 993, 1137.

Récapitulatif : 5 à 8, 10, 38, 51, 83, 86, 88, 90, 100, 136, 158, 159, 163, 168, 175 à 177, 204, 210, 249, 277, 279, 280, 285, 298, 299, 302, 303, 380 à 384, 386 à 388, 392, 398, 454, 456, 464, 465, 501, 515, 520, 538, 539, 605, 610, 627, 634 à 637, 664, 689, 690, 700, 725 à 728, 731, 742, 748, 751, 766, 773, 830, 848, 852, 855, 865, 932, 992, 993, 1051, 1058, 1059, 1063, 1067, 1071, 1072, 1077, 1080, 1082, 1089, 1091, 1122, 1125, 1131, 1137 à 1139, 1142, 1145, 1151, 1158, 1162, 1186, 1207, 1210, 1216, 1056, 1126.

Source : MNHN, Paris

AEDES (OCHLEROTATUS) STICTICUS (Meigen, 1838) *Carte p. 178*

Espèce signalée dans 34 départements : Ain, Ariège, Aveyron, Côte-d'Or, Creuse,*Doubs, Drôme, Haute-Garonne, Gers, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire-Atlantique, Lot, Lot-et-Garonne, Moselle, Nord, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Savoie, Seine-et-Marne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, Yvelines, région parisienne.

Cycle saisonnier : 7, 163, 285, 383, 610, 700, 726, 731, 748, 751, 1122.

OEUF

hibernation : 993.

LARVE

clé de détermination : 456, 634, 992, 993, 1126.
densité : 5, 627.
description : 137, 842, 992, 993.
développement larvo-nymphal : 5, 387, 731.
espèces associées : 5, 90, 155, 163, 285, 387, 842, 865, 869, 992, 993.
facteurs du milieu : 137.
gîtes larvaires : 154, 163, 285, 387, 610, 627, 628, 748, 751, 842, 845, 865, 869, 992, 993, 1186.
altitude : 154, 285, 387, 700, 726.
composition physico-chimique : 5, 6, 8, 131, 627, 700, 727, 731, 748, 869.

NYMPHE

clé de détermination : 1142.
description : 842, 1142.

ADULTE

clé de détermination : 992, 993, 1063, 1067, 1072.
genitalia femelle : 1139.
hypopygium : 992, 993.
cycle nycthéméral : 86, 751, 992, 993, 1077.
description : 992, 993.
genitalia femelle : 1139.
hypopygium : 992, 993, 1055, 1067.
piqûre : 1077.
préférences trophiques : 6, 86, 731.
voltinisme : 5, 163, 842, 992, 993.

Récapitulatif : 5 à 8, 13, 86, 90, 131, 136, 137, 154, 155, 163, 168, 285, 383, 386, 387, 392, 456, 515, 610, 627, 628, 634, 690, 700, 725 à 727, 731, 748, 751, 773, 842, 845, 846, 855, 863 à 865, 869, 992, 993, 1055, 1056, 1058, 1063, 1067, 1071, 1072, 1077, 1122, 1126, 1131, 1137, 1139, 1142, 1186, 1212, 1216, 170.

*Dordogne.

AEDES (OCHLEROTATUS) SURCOUFI (Theobald, 1912) *Carte p. 178*

Espèce valide : 23.
Espèce signalée dans 4 départements : Isère, Pyrénées-Orientales, Seine-et-Marne, région parisienne.

OEUF

description : 23.

LARVE

clé de détermination : 23.

Source : MNHN, Paris

description : 23.

NYMPHE
description : 23.

ADULTE
clé de détermination : 23, 240, 1063, 1072.
hypopygium : 23.
description : 23, 1168.
hypopygium : 23.

Récapitulatif : 23, 240, 392, 1055, 1063, 1067, 1071, 1072, 1168.

AEDES (AEDIMORPHUS) VEXANS (Meigen, 1830) *Carte p. 179*

Espèce signalée dans 45 départements : Ain, Alpes-Marit., Ariège, Aude, Aveyron, Bouches du-Rhône, Charente-Maritime, Corse, Côte-d'Or, Creuse, Dordogne, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Savoie, Seine-et-Marne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vienne, Yvelines, territoire de Belfort, région parisienne.

Cycle saisonnier : 5, 7, 163, 175, 177, 285, 392, 700, 726, 731, 751, 766, 797, 1122.

OEUF
hibernation : 298, 299.

LARVE
clé de détermination : 10, 175, 274, 456, 520, 634, 797, 801, 992, 993, 1063, 1067, 1072, 1126, 1162.
densité : 5.
description : 797, 992, 993, 1089.
larve anormale : 128.
développement larvo-nymphal : 5, 387, 731.
espèces associées : 5, 90, 128, 136, 155, 163, 285, 298, 380, 387, 772, 797, 801[3], 842, 852, 855, 865, 992, 993, 1051, 1137, 1138, 1140, 1141.
gîtes larvaires : 10, 86, 88, 90, 100, 136, 148, 159, 163, 175, 176, 285, 298, 354, 380, 465, 605, 610, 745, 751, 772, 797, 842, 845, 850, 855, 865, 893, 992, 993, 1045, 1051, 1061, 1067, 1072, 1122, 1141, 1144, 1172, 1186.
altitude : 136, 154, 285, 380, 382, 700, 726, 992, 993.
composition physico-chimique : 5, 6, 8, 88, 175, 380, 700, 727, 731, 745, 1045.
parasites : 304.

NYMPHE
clé de détermination : 1142.
description : 1142.

ADULTE
clé de détermination : 10, 298, 797, 801, 992, 993, 1054, 1063, 1067, 1162.
génitalia femelle : 1139.
hypopygium : 10, 303, 797, 801, 992, 993, 1162.
cycle nycthéméral : 86, 90, 148, 170, 751, 797, 992, 993, 1212.
description : 10, 298, 797, 992, 993.
appareil digestif : 28.
genitalia femelle : 1139.
hypopygium : 101, 303, 797, 992, 993, 1125.
dispersion : 383.

Source : MNHN, Paris

gîtes de repos : 170, 392.
préférences trophiques : 6, 86, 170, 383, 731, 751, 766, 854, 993.
voltinisme : 163, 298, 766, 801.

Récapitulatif : 5 à 8,10, 13, 28, 51, 86, 88, 90, 99 à 101, 113, 128, 135, 136, 148, 154, 155, 159, 163, 170, 172, 175 à 177, 204, 273, 274, 285, 298, 299, 302 à 304, 307, 354, 380, 382, 383, 387, 392, 409, 410, 438, 456, 465, 515, 520, 549, 605, 610, 634, 666, 669, 689, 690, 700, 725 à 727, 731, 745, 751, 766, 772, 773, 797, 801, 839, 842, 845, 846, 850, 852, 854, 855, 863 à 865, 893, 974, 992, 993, 1045, 1051, 1054, 1055, 1058, 1061, 1063, 1067, 1071, 1072, 1077, 1089, 1122, 1125, 1126, 1131, 1137 à 1142, 1144, 1162, 1172, 1185, 1186, 1190, 1212.

AEDES (AEDIMORPHUS) VITTATUS (Bigot, 1861) *Carte p. 179*

Espèce signalée dans 11 départements : Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse, Gard, Hérault, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse.

Cycle saisonnier : 797.

LARVE
clé de détermination : 10, 274, 456, 520, 634, 797, 1063, 1067, 1072, 1162.
description : 10, 797.
espèces associées : 157, 165, 520, 797, 808, 1051.
gîtes larvaires : 10, 157, 165, 432, 520, 689, 694, 797, 808, 1051, 1072, 1179.
altitude : 797.
composition physico-chimique : 694, 797.

ADULTE
clé de détermination : 10, 797, 1063, 1067, 1072, 1162.
hypopygium : 10, 797, 1162.
cycle nycthéméral : 275, 797.
description : 10, 54, 797.
hypopygium : 10, 797.
préférences trophiques : 6.

Récapitulatif : 6, 10, 54, 147, 157, 165, 168, 273 à 275, 432, 456, 520, 634, 689, 694, 773, 791, 797, 808, 1020, 1051, 1058, 1063, 1067, 1071, 1072, 1078, 1162, 1179.

Source : MNHN, Paris

ANOPHELES (ANOPHELES) ALGERIENSIS Theobald, 1903 *Carte p. 179*

Espèce signalée dans 10 départements : Aude, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse, Gard, Gironde , Hérault, Loire-Atlantique, Morbihan, Pyrénées-Orientales.

Cycle saisonnier : 14, 15, 16, 649, 651.

OEUF
- clé de détermination : 10.
- description : 1087.

LARVE
- clé de détermination : 10, 476, 520, 634, 797, 801, 1086, 1087, 1126, 1162.
- densité : 649, 651.
- description : 797, 1086, 1087, 1121.
  - pièces buccales 1016.
- espèces associées : 281, 349, 454, 649, 818, 1086, 1141, 1143.
- gîtes larvaires : 10, 14, 15, 16, 189, 281, 454, 649, 651, 818, 819, 1086, 1087, 1124, 1141, 1143.
  - altitude : 189.
  - composition physico-chimique : 14, 15, 16, 277, 281, 637, 649, 651, 818, 1086, 1087, 1150.
- hibernation : 818.

NYMPHE
- clé de détermination : 10, 1086, 1087.
- description : 1086, 1087.

ADULTE
- clé de détermination : 10, 797, 801, 1086, 1087, 1162.
  - hypopygium : 10, 797, 801, 1086, 1087, 1162.
- cycle nycthéméral : 281, 818.
- description : 797, 1086, 1087.
  - hypopygium : 797, 1086, 1087.
- hibernation : 1086.

Récapitulatif : 10, 14 à 16, 107, 135, 168, 189, 204, 277, 281, 307, 349, 454, 465, 476, 484 à 486, 519, 520, 634, 637, 649, 651, 689, 704, 769, 773, 797, 801, 818, 819, 966, 1016, 1018, 1034, 1086, 1087, 1121, 1124, 1126, 1141, 1143, 1148, 1150, 1162, 1182.

ANOPHELES (ANOPHELES) ATROPARVUS Van Thiel, 1927

Espèce signalée dans 20 départements : Allier, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente-Maritime, Corrèze, Corse, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Manche, Morbihan, Pyrénées-Orientales, Savoie, Var, Vendée.

*

OEUF
- clé de détermination : 10, 1087.
- description : 916, 954, 1109, 1110, 1111, 1116.

LARVE
- alimentation : 958.
- clé de détermination : 10, 520, 797, 1087.
  - chromosomes : 1146.

Source : MNHN, Paris

description : 360, 797, 1085, 1113, 1115, 1169.
développement larvo-nymphal : 1112.
espèces associées : 273, 797, 1210.
facteurs du milieu : 976.
gîtes larvaires : 10, 264, 280, 537, 751, 865, 933, 1199, 1210.
altitude : 280.
composition physico-chimique : 273, 280, 537, 932, 1210.
parasites : 1114, 1184, 1199.

NYMPHE
clé de détermination : 10, 1087.
description : 1113, 1142.

ADULTE
accouplement : 129, 969.
clé de détermination : 10, 797, 1087.
hypopygium : 10, 797, 1087.
description : 272, 360, 448, 797.
hypopygium : 797.
émergence : 111, 358, 448.
facteurs du milieu : 1202, 1204.
fécondité : 910.
gîtes de repos : 264, 932, 971, 984.
hibernation : 627.
gîtes : 627, 933, 1210.
préférences trophiques : 264, 751, 933.
vecteur : 479, 480, 978 (non vecteur de la myxomatose), 982.

*Cycle saisonnier : 627, 751.

Récapitulatif : 10, 111, 113, 129, 152, 163, 264, 272, 273, 276, 280, 360, 369, 430, 448, 479, 480, 499, 520, 537, 599, 627, 629, 704, 749, 751, 773, 797, 811, 855, 865, 907 à 910, 916, 932, 933, 954, 958, 969, 971, 976, 978, 980, 982, 984, 997, 1021, 1022, 1026, 1085, 1087, 1109 à 1116, 1142, 1146, 1169, 1170, 1184, 1187, 1199, 1202, 1204, 1208, 1210, 341, 358.

ANOPHELES (ANOPHELES) CLAVIGER (Meigen, 1804) *Carte p. 179*

Espèce signalée dans 68 départements : Ain, Aisne, Allier, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente-Maritime, Corse, Côte-d'Or,* Dordogne, Drôme, Eure-et-Loir, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Savoie, Seine-Maritime , Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines, territoire de Belfort, région parisienne.

Cycle saisonnier : 163, 175, 177, 285, 366, 380, 383, 387, 392, 445, 528, 585, 610, 627, 700, 726, 735, 751, 766, 992, 993, 1052, 1067, 1122.

Elevage : 928, 970, 1007.

OEUF
description : 406, 993, 1086, 1087.
dormance : 929, 934, 970.

---

* Côtes-du-Nord, Finistère

Source : MNHN, Paris

LARVE
alimentation : 928, 929.
clé de détermination : 10, 175, 274, 447, 476, 520, 634, 797, 801, 992, 993, 1052, 1063, 1067, 1072, 1086, 1087, 1126, 1162.
densité : 5, 384, 627, 684.
description : 10, 406, 756, 797, 992, 993, 1086, 1087, 1092, 1121.
appareil digestif : 1014.
larve anormale : 517.
papilles anales : 1016.
pièces buccales : 1016.
développement larvo-nymphal : 756, 1086, 1087.
espèces associées : 5, 129, 133, 160, 163, 175, 209, 273, 298, 330, 380, 381, 384, 465, 476, 501, 520, 627, 684, 685, 694, 748, 749, 751, 765, 797, 801, 808, 992, 993, 1051, 1052, 1067, 1086, 1088, 1129, 1140, 1141, 1143, 1172, 1182, 1210.
facteurs du milieu : 5, 332.
gîtes larvaires : 10, 11, 133, 136, 163, 175, 176, 189, 209, 270, 273, 280, 297, 330, 331, 366, 379, 380, 387, 406, 447, 465, 476, 501, 520, 538, 587, 589, 595, 605, 610, 618, 627, 635, 639, 672, 684, 685, 687, 689, 694, 709, 728, 746, 751, 757, 765, 766, 797, 808, 855, 865, 992, 993, 1001, 1052, 1061, 1067, 1069, 1072, 1086, 1087, 1105, 1122, 1129, 1130, 1140, 1141, 1143, 1144, 1172, 1182, 1199, 1210. 596, 748, 854.
altitude : 189, 280, 380, 382, 384, 387, 432, 586, 589, 685, 797, 865, 1087.
composition physico-chimique : 5, 163, 175, 176, 273, 280, 380, 476, 618, 627, 635, 694, 731, 748, 797, 1001, 1086, 1087, 1210.
hibernation : 136, 163, 298, 299, 380, 585, 586, 588, 639, 892, 970, 993, 1004, 1007 1016, 1067, 1072, 1077, 1086, 1087.
parasites : 365, 463, 464.
phototropisme : 158.

NYMPHE
clé de détermination : 1086, 1087, 1142.
description : 993, 1086, 1087, 1092, 1142.

ADULTE
accouplement : 928, 929, 970.
clé de détermination : 298, 447, 742, 797, 801, 992, 993, 1063, 1072,1086,1087,1162,1187.
hypopygium : 303, 447, 797, 801, 992, 993, 1086, 1087, 1162.
cycle nycthéméral : 11, 61, 163, 275, 380, 406, 447, 736, 737, 751, 766, 1077, 1086.
description : 406, 756, 760, 797, 992, 993, 1086, 1087.
hypopygium : 303, 462, 797, 992, 993, 1086, 1087.
dispersion : 735, 736, 1087.
émergence : 111.
essaim : 163.
facteurs du milieu : 1079, 1080.
gîtes de repos : 392, 406, 734, 757, 765, 766.
parasites : 296.
piqûre : 61, 1077.
préférences trophiques : 6, 163, 366, 383, 388, 731, 751, 766, 993.
vecteur : 1067.
vol : 734.
voltinisme : 5, 751.

Récapitulatif : 5, 6, 10, 11, 59, 61, 62, 83, 111, 129, 133, 136, 138, 146, 158, 160, 163, 168, 175 à 177, 189, 190, 204, 205, 209, 236, 270, 273 à 276, 280, 283, 285, 296 à 299, 303, 307, 330 à 332, 354, 360, 365, 366, 379 à 384, 387, 388, 392, 395, 406, 432, 445, 447, 462 à 465, 476, 481, 483 à 486, 501, 510, 515, 519, 520, 528,

Source : MNHN, Paris

579, 581, 585 à 590, 595, 596, 605, 610, 618, 625, 627, 629, 634, 635,639, 644, 672, 683 à 685, 687, 689, 690, 694, 700, 704, 709, 726, 728, 731, 734 à 737, 742, 744, 746, 748, 749, 751, 756, 757, 759, 760, 763, 765, 766, 769, 772, 773, 791, 797, 801, 808, 830, 854, 855, 864, 865, 879, 892, 928 à 930, 932 à 934, 966, 970, 985, 992, 993, 1001, 1004, 1007, 1014, 1016, 1018, 1020, 1031, 1051, 1052, 1061, 1063, 1067, 1069, 1071, 1072, 1077, 1079, 1080, 1082, 1086 à 1088, 1092, 1104, 1105, 1121, 1122, 1126, 1129, 1130, 1137, 1140 à 1145, 1148, 1162, 1172, 1179, 1182, 1187, 1199, 1207, 1210, 1212, 1216, 1218. 517, 538.

ANOPHELES (ANOPHELES) HYRCANUS (Pallas, 1771) *Carte p. 179*

Espèce signalée dans 5 départements : Bouches-du-Rhône, Corse, Gard, Haute-Garonne, Hérault.

Cycle saisonnier : 649, 651, 797, 801, 1086, 1087.

OEUF
- clé de détermination : 10, 1087.
- description : 797.

LARVE
- clé de détermination : 10, 274, 476, 520, 634, 797, 801, 1063, 1067, 1072, 1086, 1087, 1162.
- densité : 649, 651.
- description : 797, 1086, 1087.
- développement larvo-nymphal : 1086, 1087.
- espèces associées : 520, 649, 684, 685, 772, 797, 1182.
- gîtes larvaires : 10, 228, 234, 438, 476, 520, 649, 651, 684, 685, 689, 772, 819, 1067, 1072, 1086, 1087, 1182, 1191.
  - altitude : 189, 685.
  - composition physico-chimique : 649, 651, 1086, 1087.

NYMPHE
- clé de détermination : 10, 1087.
- description : 1086, 1087.

ADULTE
- clé de détermination : 10, 797, 801, 1063, 1072, 1087, 1162.
  - aile : 1187.
  - hypopygium : 10, 797, 801, 1087, 1162.
- cycle nycthéméral : 416, 582, 797, 801, 1086, 1191, 1192.
- description : 797, 1086, 1087, 1191.
  - hypopygium : 797, 1086, 1087.
- gîtes de repos : 1191, 1192.
- hibernation (gîtes d') : 662.
- préférences trophiques : 772, 795.

Récapitulatif : 10, 32, 51, 107, 135, 168, 189, 228, 234, 274, 307, 309, 339, 369, 416, 437 à 439, 476, 484, 495, 519, 520, 582, 634, 649, 651, 662, 663, 684, 685, 689, 769, 772, 773, 795 à 797, 801, 819, 972, 1018, 1020, 1026, 1034, 1063, 1067, 1071, 1072, 1086, 1087, 1148, 1162, 1179, 1182, 1187, 1191, 1192, 1218. 113.

Source : MNHN, Paris

ANOPHELES (ANOPHELES) LABRANCHIAE Falleroni, 1926

Espèce signalée dans 2 départements : Corse, Haute-Garonne.

Cycle saisonnier : 1018.

OEUF
- clé de détermination : 10, 1087.
- description : 954, 1016.
- éclosion : 1013.

LARVE
- clé de détermination : 10, 520, 1087.
- comportement nocturne : 1133.
- description : 1121.
  - pièces buccales : 1016.
- espèces associées : 803, 1141.
- facteurs du milieu : 976.
- gîtes larvaires : 10, 819, 1141.

NYMPHE
- clé de détermination : 10, 1087.

ADULTE
- accouplement : 1016.
- biométrie : 363.
- clé de détermination : 10, 1087.
  - chromosomes : 1146.
  - hypopygium : 10, 1087.
- facteurs du milieu : 1203.
- gîtes de repos : 1016, 1019.
- préférences trophiques : 363, 1016, 1018, 1203.
- repas sanguin : 1016.

Récapitulatif : 10, 361, 363, 483, 484, 520, 689, 704, 769, 803, 819, 954, 979, 1013, 1016, 1018, 1019, 1051, 1087, 1121, 1133, 1141, 1146, 1203.

ANOPHELES (ANOPHELES) MACULIPENNIS Meigen, 1818 *Carte p. 179*

Complexe : 272, 360, 403, 427, 749, 797, 809, 811, 812, 985, 906, 907, 908, 932, 954, 975, 977, 980, 997, 1085, 1086, 1087, 1117, 1120, 1143, 1146, 1169, 1189.

Espèce signalée dans tous les départements français sauf 12 : Cher, Doubs, Eure, Indre, Loir-et-Cher, Lozère, Haute-Marne, Mayenne, Nièvre, Orne, Sarthe, Vosges.

Cycle saisonnier : 86, 88, 163, 175, 177, 285, 366, 380, 383, 387, 445, 495, 585, 634, 635, 649, 651, 700, 726, 735, 751, 993, 1004, 1017, 1051, 1086, 1122.

Elevage : 35, 884, 900, 914, 944, 991.

OEUF
- clé de détermination : 10, 447, 1087.
- description : 10, 406, 797, 984, 993, 1041, 1086, 1087, 1111, 1117.
  - oeuf anormal : 1051.
- éclosion : 105, 1013, 1016, 1223.
- gîtes de ponte : 890.
- hibernation : 624.
- ultrasons (action des) : 1044.
- viabilité : 105.

Source : MNHN, Paris

LARVE
alimentation : 35, 914, 944, 1077, 1079.
clé de détermination : 10, 175, 274, 476, 520, 634, 797, 801, 992, 993, 1052, 1063, 1067, 1072, 1086, 1087, 1126, 1162.
comportement nocturne : 1133.
description : 10, 35, 360, 406, 797, 992, 993, 1086, 1087, 1132, 1169.
larve anormale : 517.
papilles anales : 137, 1016.
pièces buccales : 1016.
tube digestif : 1014.
développement larvo-nymphal : 35, 175, 731, 919, 940, 1041, 1086, 1096.
espèces associées : 88, 129, 133, 136, 146, 147, 152, 155, 157, 163, 165, 175, 209, 273, 277, 281, 298, 330, 359, 380, 432, 438, 442, 446, 453, 465, 501, 520, 627, 649, 663, 672, 749, 751, 765, 796, 797, 801, 803, 844, 854, 855, 871, 974, 992, 993, 1020, 1051, 1064, 1067, 1086, 1088, 1128, 1129, 1131, 1134, 1137, 1141, 1144, 1158, 1182, 1211, 1215.
facteurs du milieu : 35, 137, 332, 890, 952, 1001, 1008, 1016.
gîtes larvaires : 10, 11, 86, 88, 90, 107, 133, 136, 143, 152, 163, 165, 175, 176, 186, 188, 189, 209, 213, 228, 233, 270, 273, 275, 280, 281, 297, 298, 330 à 332, 345, 359, 366, 380, 387, 406, 427, 432, 445, 446, 453, 465, 476, 501, 502, 520, 551, 562, 587, 593, 595, 596, 605, 610, 618, 625, 627, 634, 635, 639, 649, 651, 672, 682, 683, 689, 709, 728, 731, 735, 745, 746, 749, 751, 757, 763, 766, 768, 796, 797, 801, 803, 809, 819, 839, 850, 855, 993, 997, 1001, 1017, 1020, 1026, 1045, 1051, 1052, 1061, 1067, 1069, 1072, 1077, 1079, 1086, 1087, 1096, 1099, 1101, 1102, 1105, 1107, 1122, 1128, 1129, 1134, 1141, 1143, 1144, 1158, 1172, 1179, 1182, 1186, 1188, 1199, 1201, 1212, 1215.
altitude : 13, 136, 275, 280, 380, 382, 432, 586, 587, 589, 966, 1086.
composition physico-chimique : 5, 6, 8, 136, 175, 176, 208, 233, 273, 275, 277, 280, 281, 348, 380, 446, 453, 587, 618, 627, 634, 635, 637, 649, 651, 700, 727, 745, 749, 844, 997, 1045, 1051, 1086, 1087, 1099, 1118, 1158, 1215.
hibernation : 639.
parasites : 11, 304, 365, 464, 639.
phototropisme : 158.
sexe (détermination du) : 516.
ultrasons (action des) : 1044.

NYMPHE
clé de détermination : 1086, 1087, 1142.
description : 10, 35, 993, 1086, 1087, 1142.
ultrasons (action des) : 1044.

ADULTE
accouplement : 906.
alimentation : 35.
biométrie : 35, 360, 887, 895, 901, 1117, 1194, 1195.
clé de détermination : 10, 298, 447, 742, 797, 801, 992, 993, 1063, 1072, 1086, 1087, 1162, 1187.
chromosomes : 1146.
hypopygium : 10, 303, 447, 797, 801, 992, 993, 1086, 1087, 1162.
cycle nycthéméral : 11, 86, 90, 163, 275, 298, 737, 751, 883, 886, 1077.
description : 10, 298, 406, 797, 992, 993, 1086, 1087.
appareil digestif : 319.
hypopygium : 10, 303, 797, 992, 993, 1086, 1087, 1125.
dispersion : 266, 735, 736, 884.
facteurs du milieu : 266, 766, 1079, 1080.
gîtes de repos : 11, 31, 113, 163, 188, 266, 438, 499, 512, 734, 736, 737, 757, 886, 1012, 1016, 1026, 1077, 1079, 1182, 1188.

Source : MNHN, Paris

hibernation : 88, 105,136, 163, 298, 299, 529, 578, 585, 586, 615, 678, 751, 766, 772, 890, 892, 900, 938, 968, 993, 1004, 1012, 1077, 1086, 1096.
gîtes : 129, 188, 298, 383, 387, 388, 391, 446, 662, 734, 766, 797, 801, 992.
parasites : 112, 296, 340, 536, 580, 965, 1051, 1108.
piqûre : 512, 1077.
ponte : 105, 901, 991, 1012.
préférences trophiques : 6, 31, 86, 90, 107, 163, 340, 383, 388, 390, 548, 549, 550, 552, 578, 731, 751, 885, 886, 887, 891, 895, 904, 906, 959, 1026, 1077, 1079, 1088.
repas sanguin : 871, 900, 901.
vecteur
Dirofilaria immitis : 1067.
myxomatose : 383, 438, 478, 495, 751, 766.
paludisme : 881, 882, 884, 886.
vol : 512, 734.
voltinisme : 163, 298, 596, 890, 900, 938.

Récapitulatif : 5, 6, 8, 10 à 13, 31, 32, 35, 36, 51, 55, 59, 61, 62, 65. 83, 86, 88 à 90, 105 à 107, 112, 113, 115, 121, 126, 129, 131, 133, 135 à 138, 143, 146, 147 , 152, 155, 157, 158, 163, 165, 168, 172, 175 à 177, 186, 188 à 190, 204, 205, 208, 209, 213, 228, 233, 236, 266, 269, 270, 273 à 275, 277, 280, 281, 283, 285, 296 299, 303, 304, 307, 312, 313, 319, 330 à 332, 338 à 340, 345, 348, 354, 359, 360, 365, 366, 380, 382, 383, 387, 388, 390 à 392, 406, 427, 430, 432, 433, 438, 442, 445 à 447, 453, 464, 465, 476 à 478, 483 à 486, 495, 499, 501, 502, 512 515 à 517, 519, 520, 527, 529 à 534, 536, 537, 548 à 553, 560, 562, 578, 580 à 582, 584 à 589, 592, 593, 595, 596, 605, 607, 610, 611, 615, 618, 624, 625, 627, 634, 635, 637, 639, 649, 651, 660, 662, 663, 672, 678, 682, 683, 689, 690, 695, 700, 704, 709, 725 à 728, 731, 733 à 737, 742, 744 à 746, 749, 751, 757, 759, 763, 765, 766, 768, 769, 772, 773, 796, 797, 801, 803, 809, 811, 819, 827, 830, 832, 839, 841, 844, 850, 854, 855, 863, 866, 871, 877, 881 à 887, 890 à 892, 895, 900, 901, 904, 906, 914, 919, 938, 940, 944, 952, 954, 959, 965, 966, 968, 974, 975, 977, 980, 985, 988, 991 à 993, 997, 1001, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012 à 1014, 1016, 1017, 1020, 1021, 1026, 1031, 1034, 1041, 1044 à 1046, 1051, 1052, 1061, 1063, 1064, 1067, 1069, 1072, 1077, 1079, 1080, 1082, 1085 à 1088, 1094, 1096, 1097, 1099, 1101, 1102, 1104, 1105, 1107, 1108, 1116 à 1118, 1122, 1125, 1126, 1128 à 1134, 1137, 1141 à 1144, 1146, 1148, 1158, 1162, 1163, 1169, 1170, 1172, 1179, 1182, 1186 à 1189, 1194, 1195, 1199, 1201, 1207, 1211, 1212, 1215, 1216, 1218. 1223.

ANOPHELES (ANOPHELES) MARTERI Senevet et Prunelle, 1927 *Carte p. 180*

Espèce signalée dans 1 département : Corse.
Cycle saisonnier : 1087.

OEUF
clé de détermination : 10, 1087.
description : 1087.

LARVE
clé de détermination : 10, 520, 1086, 1087.
description : 1087.
espèces associées : 1051.
gîtes larvaires : 10, 1087, 1141, 1143.
altitude : 1087.

NYMPHE
clé de détermination : 10, 1086, 1087.

Source : MNHN, Paris

description : 1087.

ADULTE
clé de détermination : 10, 1086, 1087.
hypopygium : 10, 1086, 1087.
description : 1087.
hypopygium : 1087.
hibernation : 1087.
préférences trophiques : 1087.
Récapitulatif : 10, 135, 168, 484 à 486, 519, 520, 704, 773, 1018, 1051, 1086, 1087, 1141, 1143, 1182.

ANOPHELES (ANOPHELES) MELANOON Hackett, 1934

Sous-espèce subalpinus : 428, 438, 661, 749, 772, 811, 988, 1146, 1169.
Espèce signalée dans 6 départements : Ain, Bouches-du-Rhône, Corse, Gard, Hérault, Indre et-Loire.

OEUF
clé de détermination : 10.
description : 428, 1016.
gîtes de ponte : 988.

LARVE
clé de détermination : 10, 520.
description : 1169.
espèces associées : 772.
gîtes larvaires : 10, 772, 988.

ADULTE
clé de détermination
chromosomes : 1146.
hypopygium : 10.
cycle gonotrophique (durée) : 661.
gîtes de repos : 661, 1016.
hibernation : 772.
Récapitulatif : 10, 163, 428, 438, 499, 520, 661, 704, 749, 772, 811, 988, 997, 1016, 1017, 1022, 1026, 1141, 1146, 1169.

ANOPHELES (ANOPHELES) MESSEAE Falleroni, 1926

Espèce signalée dans 12 départements : Ain, Bouches-du-Rhône, Corse, Haute-Garonne, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Loire-Atlantique, Pyrénées-Orientales, Savoie, Vendée.
Cycle saisonnier : 748, 751.

OEUF
clé de détermination : 10.
description : 954, 1016, 1109, 1111.

LARVE
clé de détermination : 10, 520.
description : 360, 1085, 1121, 1169.
pièces buccales : 1016.

Source : MNHN, Paris

espèces associées : 748.
gîtes larvaires : 10, 748, 751, 933.
composition physico-chimique : 748.

ADULTE
clé de détermination : 10.
chromosomes : 1146.
hypopygium : 10.
cycle nycthéméral : 751, 857, 861.
description : 272, 360.
gîtes de repos : 862, 932, 971, 1016.
hibernation : 862, 1016.
gîtes : 933.
préférences trophiques : 6, 136, 383, 751, 857, 933.
Récapitulatif : 6, 10, 113, 136, 152, 163, 272, 360, 361, 369, 383, 388, 430, 499, 520, 704, 748, 751, 855, 857, 861, 862, 932, 933, 954, 968, 971, 1016, 1021, 1022, 1026, 1085, 1109, 1111, 1121, 1146, 1169, 1170, 1187.

ANOPHELES (ANOPHELES) PLUMBEUS Stephens, 1828 *Carte p. 180*

Espèce signalée dans 43 départements : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Ardennes, Ariège, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente-Maritime, Corse, Côte-d'Or, Dordogne, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Indre-et-Loire, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Marne, Haute-Marne, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Var, Vendée, Vienne, Yvelines, territoire de Belfort, région parisienne.

Cycle saisonnier : 86, 163, 175, 176, 285, 383, 392, 445, 700, 726, 751, 766, 992, 993, 1064, 1066, 1079, 1086.
Elevage : 939.

OEUF
clé de détermination : 10.
description : 10, 993, 1064, 1086, 1087.
éclosion : 1064, 1077.
gîtes de ponte : 1079.
hibernation : 993.

LARVE
alimentation : 1064, 1066, 1077, 1079.
clé de détermination : 10, 175, 274, 447, 476, 520, 634, 797, 801, 992, 993, 1052, 1063, 1067, 1072, 1086, 1087, 1126, 1162.
densité : 627.
description : 10, 57, 797, 846, 992, 993, 1086, 1087, 1121.
développement larvo-nymphal : 90, 846, 940, 942, 943, 1064,1066, 1077, 1079.
espèces associées : 132, 163, 175, 209, 275, 298, 447, 453, 520,627, 672, 751, 846, 854, 992, 993, 1055, 1064, 1066, 1067, 1079, 1122, 1128.
gîtes larvaires : 10, 86, 90, 132, 163, 175, 176, 209, 275, 298, 380, 387, 444, 447, 453, 465, 502, 515,520, 627, 672, 751, 766, 797, 801, 803, 819, 846, 854, 939, 992, 993, 1017, 1020, 1061, 1064, 1066, 1067, 1072, 1077, 1086, 1087, 1122, 1128, 1179, 1186, 1190, 1199.
altitude : 189, 380, 382, 797, 993, 1086, 1087.
composition physico-chimique : 175, 176, 275, 380, 444, 447, 453, 627, 797, 939, 1086, 1087.
hibernation : 90, 299, 846, 890, 892, 938,940, 942, 943, 993, 1064, 1066, 1067, 1072, 1077, 1079, 1086, 1087, 1122.

Source : MNHN, Paris

parasites : 799.

phototropisme : 158.

NYMPHE
clé de détermination : 10, 1086, 1087, 1142.
description : 10, 797, 992, 993, 1086, 1087, 1142.

ADULTE
accouplement : 906, 1064.
clé de détermination : 10, 298, 447, 742, 797, 801, 992, 993, 1063, 1072, 1086, 1087, 1162.
aile : 1187.
hypopygium : 10, 303, 447, 797, 801, 992, 993, 1086, 1087, 1162.
couleurs (action des) : 1079, 1080.
cycle nycthéméral : 86, 90, 163, 275, 447, 515, 751, 766, 797, 846, 1077, 1086, 1087, 1179.
description : 298, 307, 797, 846, 992, 993, 1086, 1087.
hypopygium : 303, 462, 992, 993, 1086, 1087.
essaim : 751.
gîtes de repos : 392, 766.
hibernation : 1066, 1086.
piqûre : 90, 209, 1077.
ponte : 1077.
préférences trophiques : 6, 86 90, 383, 751, 766, 933, 993.
vecteur : 945.
vol : 1077, 1079.
voltinisme : 163, 846, 943, 1064, 1066.

Récapitulatif : 6, 10 51, 57, 73, 86, 90, 132, 158, 163, 168, 175 à 177, 189, 209, 214, 273 à 275, 285, 298, 299, 303, 307, 366, 380, 382, 383, 387, 388, 392, 444, 445, 447, 453, 455, 462, 465, 476, 484, 502, 511, 515, 519, 520, 627, 634, 672, 689, 690, 700, 704, 726, 728, 736, 737, 742, 751, 766, 769, 772, 773, 797, 799, 801, 803, 819, 846, 854, 855, 886, 890, 892, 932, 933, 938 à 940, 942, 943, 945, 992, 993, 1017, 1018, 1020, 1051, 1052, 1055, 1061, 1063, 1064, 1066, 1067, 1071, 1072, 1077, 1080, 1082, 1086, 1087, 1121, 1122, 1126, 1128, 1131, 1142, 1148, 1162, 1179, 1186, 1187, 1190, 1199, 1210, 1218. 1079.

ANOPHELES (ANOPHELES) SACHAROVI Favre, 1903

Espèce signalée dans 1 département : Corse.
Cycle saisonnier : 1018, 1086.

OEUF
clé de détermination : 10, 1087.
description : 1016, 1086.
éclosion : 1013, 1016.

LARVE
clé de détermination : 10, 520, 1086, 1087.
description : 362, 1086.
papilles anales : 1016.
pièces buccales : 1016.
facteurs du milieu : 1016.
gîtes larvaires : 10, 1086.
composition physico-chimique : 361.

Source : MNHN, Paris

NYMPHE
clé de détermination : 10, 1086, 1087.
description : 1086.

ADULTE
clé de détermination : 10, 1086, 1087.
chromosomes : 1146.
hypopygium : 10, 1086, 1087.
description : 363, 1086.
hypopygium : 362, 1086.
dispersion : 1086.
facteurs du milieu : 1203.
gîtes de repos : 1016, 1019.
hibernation : 1086.
préférences trophiques : 363, 1016, 1018, 1203.
repas sanguin : 1016.
voltinisme : 1086.

Récapitulatif : 10, 107, 189, 361 à 363, 483, 520, 704, 769, 773, 1013, 1016, 1018, 1019, 1086, 1087, 1141, 1146, 1148, 1203.

ANOPHELES (CELLIA) SUPERPICTUS Grassi, 1899 *Carte p. 180*

Espèce signalée dans 1 département : Corse.

OEUF
clé de détermination : 10, 1087.
description : 1087.

LARVE
clé de détermination : 10, 520, 1087.
description : 1087.
développement larvo-nymphal : 1087.
gîtes larvaires : 10, 1087.
altitude : 1087.
hibernation : 1087.

NYMPHE
clé de détermination : 10, 1087.
description : 1087.

ADULTE
clé de détermination : 10, 1087.
hypopygium : 10, 1087.
description : 1087.
hypopygium : 1087.
hibernation : 1087.
préférences trophiques : 1087.

Récapitulatif : 10, 168, 520, 704, 773, 1087.

Source : MNHN, Paris

COQUILLETTIDIA (COQUILLETTIDIA) BUXTONI (Edwards, 1923) *Carte p. 180*

Espèce signalée dans 10 départements : Ain, Aude, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Isère, Rhône.

Cycle saisonnier : 175, 177, 178, 383, 392, 766.

LARVE

clé de détermination : 175, 634, 1162.
description : 349, 618, 1088.
espèces associées : 175, 178, 227, 349, 412, 465.
gîtes larvaires : 175, 176, 178, 227, 465, 618.
composition physico-chimique : 175, 176, 178, 618, 637.
hibernation : 175.

ADULTE

clé de détermination : 1088, 1162.
hypopygium : 1088, 1162.
cycle nycthéméral : 178.
description : 10, 1088.
hypopygium : 10, 1088.
gîtes de repos : 392, 766.
préférences trophiques : 383, 412, 766.
voltinisme : 175.

Récapitulatif : 10, 168, 175 à 178, 204, 227, 307, 349, 355, 383, 392, 412, 465, 618, 634, 637, 766, 773, 864, 1088, 1162.

COQUILLETTIDIA (COQUILLETTIDIA) RICHIARDII (Ficalbi, 1889) *Carte p. 180*

Espèce signalée dans 33 départements : Ain, Aisne, Ardennes, Aude, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse. Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Indre-et-Loire, Isère, Marne, Oise, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Savoie, Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Vienne, Yvelines, territoire de Belfort, région parisienne. Manche.

Cycle saisonnier : 163, 175, 177, 178, 309, 383, 387, 392, 412, 416, 649, 651, 751, 766, 772, 1067, 1072, 1088.

Elevage : 413, 414, 415.

OEUF

description : 210, 415.
développement embryonnaire : 210, 416.

LARVE

alimentation : 414, 416.
clé de détermination : 175, 634, 1063, 1067, 1072, 1126.
densité : 415, 649, 651.
description : 10, 349, 415, 618, 817, 1057, 1067, 1088, 1162.
appareil respiratoire : 357.
pièces buccales : 414, 415.
développement larvo-nymphal : 416.
espèces associées : 175, 178, 227, 349, 412, 465, 520, 649, 817.
gîtes larvaires : 163, 175, 176, 178, 227, 228, 234, 387, 416, 465, 520, 618, 634, 635, 649, 651, 689, 751, 766, 817, 988, 1061, 1067, 1088.
altitude : 382.

Source : MNHN, Paris

composition physico-chimique : 8, 163, 175, 176, 178, 348, 357, 412, 416, 604, 618, 634, 635, 637, 649, 651, 731,817, 1057, 1150.
hibernation : 175, 299, 1057, 1072.
parasites : 817.
prédateurs : 416.

NYMPHE
description : 415, 817, 1088.
nymphose : 357.

ADULTE
accouplement : 416.
alimentation : 416.
autogenèse : 412, 413, 416.
clé de détermination : 298, 1063, 1067, 1072.
hypopygium : 303.
cycle nycthéméral : 163, 178, 416, 751, 766, 772, 817, 1072.
description : 10, 415, 817, 1067, 1088, 1162.
genitalia femelle : 1088.
hypopygium : 303, 415, 817, 1088, 1162.
dispersion : 228, 383, 416.
émergence : 413.
essaim : 416.
facteurs du milieu : 416.
fécondité : 412, 413.
gîtes de repos : 392, 766.
hibernation : 1067 (?)
longévité : 416.
ponte : 163, 416.
préférences trophiques : 383, 412, 731, 751, 766, 1088.
repas sanguin : 416.
voltinisme : 175, 412, 416, 1057, 1067.

Récapitulatif : 8, 10, 32, 107, 163, 168, 175 à 178, 204, 210, 227, 228, 232, 234, 298, 299, 303, 307, 309, 339, 348, 349, 354, 357, 380, 382, 383, 387, 388, 392, 412 à 416, 438, 455, 465, 495, 515, 520, 604, 618, 634, 635, 637, 649 à 651, 663, 667, 689, 690, 731, 737, 751, 766, 772, 773, 817, 864, 865, 988, 1057, 1061, 1063, 1067, 1072, 1088, 1126, 1150, 1162, 1216.

Source : MNHN, Paris

CULEX (CULEX) BRUMPTI Galliard, 1931 *Carte p. 180*

Espèce signalée dans 1 département : Corse.

LARVE
clé de détermination : 10, 520, 1088.
description : 10, 354, 356, 1088.
espèces associées : 803.
gîtes larvaires : 10, 1088.

ADULTE
clé de détermination : 10, 1088.
hypopygium : 10, 1088.
description : 10, 356, 1088.
hypopygium : 10, 356, 1088.
Récapitulatif : 10, 168, 354, 356, 520, 689, 773, 803, 1088.

CULEX (MAILLOTIA) HORTENSIS Ficalbi, 1889 *Carte p. 181*

Espèce signalée dans 64 départements : Ain, Aisne, Allier, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes,* Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corse, Côte-d'Or,* Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yvelines, région parisienne.
Cycle saisonnier : 86, 88, 90, 129, 163, 285, 379, 387, 445, 700, 726, 748, 992, 1122.
Elevage : 129.

OEUF
description : 1067.

LARVE
alimentation : 509.
clé de détermination : 10, 66, 274, 353, 447, 476, 520, 634, 797, 801, 992, 993, 1052, 1063, 1067, 1072, 1088, 1126, 1162.
description : 10, 101, 509, 524, 690, 797, 992, 993, 1067, 1088, 1121.
appareil respiratoire : 1038.
papilles anales : 136, 137, 154, 1016.
appareil digestif : 199, 1016.
espèces associées : 88, 99, 129, 136, 146, 155, 157, 163, 165, 172, 209, 273, 275, 359, 380, 432, 447, 465, 476, 520, 684, 685, 690, 748, 749, 751, 797, 800, 801, 808, 855, 869, 974, 992, 993, 1051, 1057, 1061, 1064, 1066, 1067, 1072, 1094, 1128, 1129, 1134, 1137, 1140, 1141, 1144, 1172.
facteurs du milieu : 137.
gîtes larvaires : 10, 86, 90, 99, 100, 129, 131, 136, 138, 146, 147, 152, 163, 165, 172, 209, 273, 275, 280, 307, 359, 379, 380, 387, 432, 447, 465, 476, 515, 520, 537, 618, 634, 685, 689, 690, 728, 745, 748, 772, 797, 801, 808, 839, 855, 865, 869, 992, 993, 1017, 1020, 1045, 1051, 1061, 1064, 1066, 1067, 1072, 1088, 1094, 1122, 1128, 1129, 1134, 1140, 1141, 1144, 1172, 1186, 1190, 1199.
altitude : 99, 100, 138, 275, 280, 354, 380, 382, 387, 432, 518, 685, 797, 855, 1088, 1119.

* Ariège, Côtes-du-Nord.

Source : MNHN, Paris

composition physico-chimique : 129, 131, 136, 138, 163, 273, 280, 379, 476, 537, 618, 634, 745, 748, 869, 1045, 1119.
hémocytes : 19.
hibernation : 890.
parasites : 518, 1198, 1199.
phototropisme : 158.
sexe (détermination du) : 516.

NYMPHE
clé de détermination : 1088, 1142.
description : 1088, 1142.
hémocytes : 19.

ADULTE
accouplement : 129, 690.
clé de détermination : 10, 447, 742, 797, 801, 992, 993, 1063, 1067, 1072, 1088, 1162.
hypopygium : 10, 66, 447, 797, 801, 992, 993, 1088, 1162.
description : 10, 690, 797, 992, 993, 1088.
gynandromorphe : 1134.
hypopygium : 10, 99, 797, 992, 993, 1088.
émergence : 111.
fécondité : 129.
gîtes de repos : 13, 662.
hémocytes : 19.
hibernation : 86, 163, 1067.
préférences trophiques : 6, 86, 90, 129, 136, 146, 163, 552, 772, 993.
repas sanguin : 129.

Récapitulatif : 6, 10, 13, 19, 42, 66, 86, 88 à 90, 99 à 101, 111, 129, 131, 135 à 138, 141, 146, 147, 152, 154, 155, 157, 158, 163, 168, 172, 199, 204, 209, 273 à 275, 280, 285, 307, 353, 354, 359, 379, 380, 382, 387, 392, 432, 438, 445, 447, 465, 476, 509, 515, 516, 518, 520, 524, 537, 552, 618, 634, 639, 662, 684, 685, 689, 690, 700, 726, 728, 742, 745, 748, 749, 751, 765, 772, 773, 791, 797, 800, 801, 808, 839, 855, 863, 865, 866, 869, 890, 974, 988, 992, 993, 1016, 1017, 1020, 1038, 1045, 1051, 1052, 1057, 1061, 1063, 1064, 1066, 1067, 1071, 1072, 1077, 1078, 1088, 1094, 1119, 1121, 1122, 1126, 1128, 1129, 1131, 1134, 1137, 1138, 1140 à 1142, 1144, 1162, 1172, 1179, 1186, 1190, 1198, 1199, 1207, 1212, 165.

CULEX (NEOCULEX) IMPUDICUS Ficalbi, 1890

Carte p. 181

Espèce signalée dans 16 départements : Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse, Dordogne, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse, Vendée.

Cycle saisonnier : 445, 649, 992, 993, 1122.

LARVE
clé de détermination : 10, 66, 274, 447, 520, 634, 797, 801, 992, 993, 1088, 1126, 1162.
densité : 627, 649, 651.
description : 10, 797, 992, 993, 1088, 1121.
espèces associées : 86, 165, 273, 465, 520, 627, 649, 796, 797, 800, 801, 815, 855, 992, 993, 1051, 1131, 1141, 1172.
gîtes larvaires : 10, 90, 165, 273, 275, 445, 465, 520, 627, 649, 651, 672, 689, 772, 796, 797, 801, 855, 993, 1088, 1141, 1172, 1186, 605.

Source : MNHN, Paris

altitude : 273, 275.
composition physico-chimique : 38, 273, 275, 605, 627, 649, 651, 815.

NYMPHE
clé de détermination : 1088, 1142.
description : 1088, 1142.

ADULTE
clé de détermination : 10, 66, 447, 797, 801, 992, 993, 1088, 1162.
hypopygium : 10, 447, 797, 801, 992, 993, 1088, 1162.
description : 10, 797, 992, 993, 1088.
hypopygium : 10, 797, 992, 993, 1088, 1125.
gîtes de repos : 664.
hibernation : 86, 772.
gîtes : 662.
préférences trophiques : 86, 90, 161, 447, 772, 992.
Récapitulatif : 10, 38, 51, 66, 86, 90, 135, 157, 161, 165, 168, 249, 273 à 275, 307, 354, 355, 438, 445, 447, 465, 520, 605, 627, 634, 649, 651, 662 à 664, 672, 689, 772, 773, 796, 797, 800, 801, 815, 855, 992, 993, 1051, 1088, 1121, 1122, 1125, 1126, 1131, 1141, 1142, 1162, 1172, 1186.

CULEX (CULEX) LATICINCTUS Edwards, 1913 *Carte p. 181*

Espèce signalée dans 3 départments : Corse, Seine-et-Marne, Var.

Présence douteuse : 773.

LARVE
clé de détermination : 10, 520, 1088.
description : 10, 1088.
espèces associées : 354.
gîtes larvaires : 1088.
composition physico-chimique : 1088.

NYMPHE
clé de détermination : 1088.
description : 1088.

ADULTE
clé de détermination : 10, 1061, 1063, 1067, 1072, 1088.
hypopygium : 10, 1061, 1088.
description : 10, 1088.
hypopygium : 10, 1088.
préférences trophiques : 1088.
Récapitulatif : 10, 168, 307, 354, 520, 689, 773, 1058, 1061, 1063, 1067, 1071, 1072, 1078, 1088.

CULEX (NEOCULEX) MARTINII Medschid, 1930 *Carte p. 181*

Espèce signalée dans 3 départements : Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault.

LARVE
description : 815.
espèces associées : 815.

Source : MNHN, Paris

gîtes larvaires : 815.
composition physico-chimique : 815.

ADULTE
description : 815.
hypopygium : 815.
Récapitulatif : 51, 168, 772, 773, 815.

CULEX (CULEX) MIMETICUS Noe, 1899 *Carte p. 181*

Espèce signalée dans 10 départements : Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse, Gard, Hérault, Haute-Loire, Pyrénées-Orientales, Var.

LARVE
clé de détermination : 10, 66, 274, 520, 634, 797, 801, 992, 993, 1063, 1067, 1072, 1088, 1126.
description : 10, 797, 1088, 1121.
espèces associées : 10, 273, 355, 520, 684, 685, 797, 808, 1051.
gîtes larvaires : 10, 273, 520, 684, 685, 689, 745, 772, 797, 808, 1045, 1051, 1072, 1088.
altitude : 685.
composition physico-chimique : 273, 745, 1045, 1051, 1088.

NYMPHE
clé de détermination : 1088.
description : 1088.

ADULTE
clé de détermination : 10, 66, 797, 801, 992, 993, 1063, 1067, 1072, 1088.
hypopygium : 10, 797, 801, 992, 993, 1088.
description : 10, 797, 1067, 1088.
hypopygium : 10, 797, 1088.
gîtes de repos : 1088.
hibernation (gîtes d') : 801.
Récapitulatif : 10, 66, 168, 273, 274, 307, 355, 438, 520, 634, 684, 685, 689, 745, 772, 773, 797, 801, 808, 992, 993, 1020, 1045, 1051, 1063, 1067, 1072, 1088, 1121, 1126, 1179.

CULEX (BARRAUDIUS) MODESTUS Ficalbi, 1889 *Carte p. 181*

Espèce signalée dans 16 départements : Ain, Aude, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Indre-et-Loire, Loire, Loire-Atlantique Pyrénées-Orientales, Rhône, Vendée, Vienne.
Cycle saisonnier : 15, 163, 493, 495, 649, 651, 662, 663, 748, 772, 1088.
Elevage : 161.

OEUF
description : 161.
éclosion : 90.
gîtes de ponte : 988.

LARVE
alimentation : 161.
clé de détermination : 10, 66, 274, 520, 634, 797, 801, 992, 993, 1088, 1126, 1162.

Source : MNHN, Paris

densité : 627, 649, 651.
description : 10, 161, 797, 992, 993, 1088.
espèces associées : 15, 88, 147, 438, 442, 465, 627, 649, 663, 748, 749, 772, 797, 801, 844, 1210, 1215.
gîtes larvaires : 10, 15, 147, 152, 163, 228, 345, 465, 618, 627, 635, 649, 651, 745, 748, 772, 797, 819, 855, 988, 992, 993, 1088, 1186, 1199, 1209, 1215.
composition physico-chimique : 15, 277, 348, 618, 627, 635, 637, 649, 651, 745, 748, 844, 1215.
parasites : 1199.

NYMPHE
clé de détermination : 1088, 1142.
description : 1088, 1142.

ADULTE
accouplement : 161.
clé de détermination : 10, 797, 801, 992, 993, 1088, 1162.
hypopygium : 10, 66, 797, 801, 992, 993, 1088, 1162.
cycle nycthéméral : 163, 275, 416, 663, 772, 797, 801, 857, 927, 1088.
description : 10, 161, 797, 992, 993, 1088.
hypopygium : 797, 992, 993, 1088.
dispersion : 163, 1088.
facteurs du milieu : 663.
gîtes de repos : 161, 438, 663, 927.
hibernation : 772.
gîtes : 663.
longévité : 663.
ponte : 161.
préférences trophiques : 161, 772, 993.
vecteur
myxomatose : 495.
Tahyna : 202, 732.
West Nile : 435, 436, 437, 490, 493, 494, 495, 663, 698, 732, 772, 836.
vol : 161.

Récapitulatif : 10, 15, 32, 51, 66, 88, 90, 128, 135, 147, 152, 161, 163, 168, 202, 204, 224, 228, 273 à 275, 277, 307, 309, 339, 345, 348, 355, 395, 416, 435 à 438, 442, 465, 490, 493 à 495, 520, 605, 618, 627, 629, 634, 635, 637, 649, 651, 662, 663, 665, 689, 732, 745, 748, 749, 772, 773, 795, 797, 801, 819, 836, 844, 848, 855, 857, 861, 862, 927, 932, 933, 988, 992, 993, 1046, 1088, 1122, 1126, 1142, 1162, 1186, 1199, 1209, 1210, 1215.

CULEX (CULEX) PIPIENS Linnaeus, 1758

Carte p. 182

Complexe Culex pipiens : 66, 67, 88, 125, 140, 150, 153, 162, 179, 374, 376, 403, 476, 681, 797, 805, 806, 905, 911, 912, 913, 918, 922, 924, 934, 936, 951, 955, 957, 1088, 1135, 1136.

Espèce signalée dans tous les départements sauf 18 : Alpes-de-Haute-Provence, Charente, Cher, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Gers, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Orne, Pas-de-Calais, Sarthe.

Cartographie écologique : 651, 751.

Cycle saisonnier : 66, 144, 163, 175, 177, 285, 379, 392, 445, 525, 563, 610, 634, 635, 649, 651, 700, 726, 735, 748, 751, 766, 992, 993, 1017, 1077, 1079.

Elevage : 43, 66, 73, 82, 103, 259, 489, 505, 525, 544, 571, 614, 712, 856, 958, 963, 983, 72.

Source : MNHN, Paris

OEUF
description : 913, 993.
développement embryonnaire : 408, 476, 1079.
éclosion : 505, 853, 934, 1077.
gîtes de ponte : 988.
ultrasons (action des) : 1044.
viabilité : 68.

LARVE
alimentation : 43, 82, 259, 367, 476, 505, 958, 962, 1077, 1079.
clé de détermination : 10, 66, 175, 274, 447, 476, 520, 634, 797, 801, 992, 993, 1052, 1063, 1067, 1072, 1088, 1126, 1162.
densité : 394, 476, 649, 651, 963.
déplacement : 540.
description : 10, 66, 175, 278, 373, 797, 992, 993, 1088.
appareil digestif : 73, 74, 198, 199, 1016.
appareil respiratoire : 1038, 1128.
corps gras : 73, 80.
larve anormale : 128, 156.
papilles anales : 136, 137, 1016, 1039.
développement larvo-nymphal : 43, 71, 72, 73, 76, 81, 98, 103, 162, 259, 367, 429, 476, 642, 843, 873, 919, 937, 1077, 1079.
espèces associées : 52, 66, 86, 88, 90, 99, 127, 128, 129, 133, 136, 144, 146, 147, 155, 160, 163, 165, 172, 175, 209, 227, 266, 273, 275, 278, 281, 298, 359, 380, 432, 438, 446, 465, 476, 520, 605, 627, 649, 663, 664, 672, 684, 685, 690, 694, 748, 749, 751, 772, 797, 800, 801, 803, 804, 815, 817, 839, 844, 847, 854, 855, 869, 871, 992, 993, 1020, 1051, 1053, 1067, 1086, 1088, 1128, 1129, 1131, 1134, 1137, 1141, 1144, 1158, 1172, 1210, 1213, 1215.
facteurs du milieu : 76, 137, 332, 476.
gîtes larvaires : 10, 13, 58, 60, 66, 71, 83, 86, 90, 99, 100, 133, 136, 146, 147, 163, 165, 172, 175, 197, 209, 222, 223, 228, 234, 266, 273, 275, 280, 281, 298, 310, 354, 359, 379, 380, 385, 387, 394, 395, 417, 429, 432, 433, 445, 446, 447, 465, 476, 481, 502, 505, 520, 537, 538, 551, 554, 557, 558, 560, 561, 565, 569, 572, 573, 576, 596, 605, 610, 618, 634, 635, 649, 651, 664, 672, 684, 685, 689, 694, 728, 748, 751, 772, 797, 804, 816, 819, 839, 841, 843, 854, 855, 865, 869, 871, 873, 905, 953, 961, 984, 988, 992, 1017, 1045, 1051, 1061, 1067, 1072, 1077, 1079, 1080, 1088, 1099, 1122, 1128, 1129, 1141, 1144, 1158, 1172, 1179, 1186, 1199, 1210, 1212, 1213, 1214, 1215.
altitude : 99, 275, 280, 380, 382, 387, 685, 797, 992.
composition physico-chimique : 5, 8, 38, 86, 131, 175, 273, 275, 277, 280, 281, 348, 379, 380, 429, 446, 476, 537, 618, 634, 635, 637, 649, 651, 694, 727, 731, 748, 815, 844, 869, 871, 953, 993, 1045, 1051, 1077, 1079, 1158, 1210, 1215.
hibernation : 898.
phototropisme : 158.
physiologie : 78, 473, 1036, 1037, 1039.
parasites : 304, 365, 450, 965, 1199.
ultrasons (action des) : 1044.

NYMPHE
clé de détermination : 1088, 1142.
déplacement : 540.
description : 1088, 1142.
ultrasons (action des) : 1044.

Source : MNHN, Paris

ADULTE
accouplement : 43, 73, 103, 129, 257, 376, 429, 476, 505, 905, 935, 983, 1077, 1079.
alimentation : 505.
autogenèse : 43, 66, 71, 72, 73, 76, 82, 83, 103, 257, 258, 259, 260, 261, 376, 642, 712, 717, 807, 873, 897, 899, 902, 903, 905, 921, 962, 964, 1077.
clé de détermination : 10, 66, 298, 447, 742, 797, 801, 992, 993, 1061, 1063, 1067, 1072, 1088, 1162.
hypopygium : 10, 66, 303, 447, 797, 801, 992, 993, 1061, 1088, 1162.
consanguinité : 68, 69.
cycle nycthéméral : 86, 90, 163, 266, 559, 751, 797, 843, 873, 992, 1077, 1079.
cytologie : 474.
description : 10, 66, 278, 298, 373, 760, 797, 992, 993, 1088.
adulte anormal : 68, 69, 375.
appareil digestif : 75, 319, 320, 541, 762.
appareil reproducteur : 542, 675.
appareil respiratoire : 321.
corps gras : 73, 77, 78, 80, 903.
corpus cardiacum : 192.
hypopygium : 10, 66, 99, 101, 278, 303, 797, 992, 993, 1088, 1125, 1136.
dispersion : 840, 873.
émergence : 58, 111, 1077.
essaim : 1079.
estérases : 372, 711, 712, 713, 715, 717, 718, 721, 722, 1049, 1050, 1166, 1167.
facteurs du milieu
asphyxie : 1036, 1037, 1039.
lumière : 266, 766, 1081.
température : 76, 376, 476, 766, 1079.
autres : 476, 569, 766, 1079, 1080.
fécondité : 43, 68, 257, 258, 259, 367, 376, 429, 476, 505, 540, 642, 680, 918, 921, 922, 923, 955, 956, 961, 964, 983.
gîtes de repos : 87, 266, 392, 563, 751, 766, 1077, 1079.
hibernation : 71, 73, 76, 83, 86, 88, 144, 298, 299, 380, 505, 563, 751, 772, 890, 892, 903, 905, 925, 938, 951, 964, 983, 993, 1067, 1072, 1077, 1079.
gîtes : 129, 298, 387, 388, 515, 662, 766, 797, 992.
histologie : 656.
insémination : 680.
longévité : 72, 73, 76, 81, 505, 559, 1077, 1079.
maturation des oeufs : 72, 73, 81.
parasites : 70, 73, 110, 112, 145, 296, 464.
physiologie : 475, 542.
piqûre : 1077.
ponte : 73, 260, 261, 318, 376, 505, 555, 1077.
préférences trophiques : 5, 86, 90, 162, 388, 390, 505, 552, 553, 556, 559, 560, 569, 719, 731, 772, 805, 905, 934, 956, 961, 983.
repas sanguin : 505, 951, 1103.
sex ratio : 376, 429.
vecteur : 173, 489, 614, 814, 960, 1067, 1219, 1220.
vol : 1077, 1079.
voltinisme : 66, 144, 298, 301, 505, 921.
Récapitulatif : 5, 6, 8, 10, 13, 32, 38, 42, 43, 50 à 52, 58 à 60, 62, 66 à 78, 80 à 83, 86 à 90, 98 à 101, 103, 110 à 112, 127 à 129, 131, 133, 136, 137, 140, 144 à 148, 150, 152, 153, 155 à 158, 160, 162, 163, 165, 168, 170, 172, 173, 175, 177, 179, 192, 197 à 199, 204, 205, 209, 222 à 228, 234, 244, 245, 253, 256 à 261, 266, 273 à 275, 277, 278, 280, 281, 285, 296, 298, 299, 301, 303, 304, 307, 310, 318

Source : MNHN, Paris

à 321, 332, 339, 343, 347, 348, 354, 359, 365, 367, 372 à 376, 379, 380, 382, 385, 387, 388, 390, 392, 394, 395, 403, 408, 417, 429, 432, 433, 438, 439, 445 à 447, 450, 460, 464, 465, 473 à 477, 481, 489, 495, 501, 502, 505, 520, 525 à 528, 531, 533, 534, 537 à 542, 544, 549, 551 à 563, 565, 569, 571 à 574, 576, 595, 596, 605, 607, 610, 614, 618, 627, 629, 634 à 637, 639, 642, 649, 651, 656, 660, 662 à 664, 672, 675, 680, 681, 684, 685, 689, 690, 694, 700, 711 à 713, 715 à 719, 721, 722, 726 à 728, 731, 735, 737, 740, 742, 744, 745, 748, 749, 751, 759, 760, 762, 763, 765, 766, 772, 773, 791, 797, 800, 801, 803 à 807, 814 à 817, 819, 830, 839 à 841, 843, 844, 847, 853 à 856, 862, 863, 865 à 869, 871, 873 à 875, 886, 890, 892, 897 à 899, 902, 903, 905, 911 à 913, 918, 919, 921 à 925, 934 à 938, 951, 953, 955 à 958, 960, 961 à 965, 983, 984, 988, 992, 993, 1016, 1017, 1020, 1036 à 1039, 1044, 1045, 1049 à 1053, 1061, 1063, 1067, 1072, 1077, 1079, 1080 à 1082, 1086, 1088, 1096, 1099, 1103, 1105, 1122, 1123, 1125, 1126, 1128, 1129, 1131, 1134 à 1137, 1141, 1142, 1144, 1158, 1160 à 1162, 1166 à 1168, 1171, 1172, 1179, 1186, 1190, 1199, 1201, 1207, 1210, 1212 à 1216, 1219, 1220, 515.

CULEX (NEOCULEX) TERRITANS Walker, 1856 *Carte p. 182*

Espèce signalée dans 40 départements : Ain, Alpes-Maritimes, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente-Maritime, Corse, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Haute-Garonne, Gironde, Indre-et-Loire, Isère, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Moselle, Oise, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Somme, Tarn-et-Garonne, Var, Vienne, Haute-Vienne, Yvelines, région parisienne.

Cycle saisonnier : 8, 86, 129, 163, 175, 177, 298, 387, 610, 748, 992, 993, 1061, 1072, 1088, 1122.

Elevage : 129.

LARVE

clé de détermination : 66, 175, 797, 992, 993, 1052, 1063, 1067, 1072, 1088, 1126.
densité : 5, 627.
description : 353, 690, 992, 993, 1067, 1088, 1089.
espèces associées : 5, 86, 99, 129, 152, 163, 175, 380, 465, 627, 690, 748, 751, 871, 992, 993, 1020, 1051, 1057, 1061, 1067, 1072, 1088, 1131, 1137, 1141, 1210.
gîtes larvaires : 86, 88, 90, 99, 100, 129, 143, 152, 163, 175, 176, 298, 354, 380, 387, 465, 610, 618, 627, 635, 639, 690, 728, 748, 871, 992, 993, 1017, 1020, 1061, 1067, 1072, 1088, 1131, 1141, 1172, 1186, 1210.
altitude : 99, 380, 382, 387.
composition physico-chimique : 5, 6, 8, 175, 176, 380, 618, 627, 731, 748, 871, 1210.
parasites : 175.

NYMPHE

clé de détermination : 1088, 1142.
description : 1088, 1142.

ADULTE

accouplement : 129.
clé de détermination : 66, 298, 797, 992, 993, 1061, 1063, 1067, 1072, 1088.
hypopygium : 303, 797, 992, 993, 1061, 1088.
description : 99, 298, 690, 992, 993, 1088.
hypopygium : 99, 101, 303, 992, 993, 1088.
gîtes de repos : 13.

Source : MNHN, Paris

hibernation : 86, 298, 299.
gîtes : 129.
préférences trophiques : 6, 86, 90, 129, 163, 993, 1122.
repas sanguin : 129.

Récapitulatif : 5, 6, 8, 13, 66, 86, 88, 90, 99 à 101, 129, 135, 138, 143, 146, 147, 151, 152, 163, 168, 175 à 177, 204, 298, 299, 303, 353, 354, 380, 382, 387, 392, 395, 465, 515, 610, 618, 627, 629, 635, 639, 660, 690, 728, 731, 748, 751, 773, 797, 855, 871, 992. 993, 1017, 1020, 1051, 1052, 1057, 1061, 1063, 1067, 1069, 1072, 1078, 1088, 1089, 1122, 1126, 1131, 1137, 1141, 1142, 1172, 1179, 1186, 1210, 1216.

CULEX (CULEX) THEILERI Theobald, 1903 *Carte p. 182*

Espèce signalée dans 14 départements : Allier, Ariège, Aude, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse, Dordogne, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Jura, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin.

Cycle saisonnier : 797, 992. 993.

LARVE
clé de détermiantion : 10, 66, 274, 447, 520, 634, 797, 801, 992, 993, 1088, 1126, 1162.
description : 10, 537, 690, 797, 992, 993, 1088, 1121.
espèces associées : 147, 273, 354, 355, 359, 520, 797, 801, 1131, 1141, 1211.
gîtes larvaires : 10, 147, 273, 359, 465, 520, 537, 689, 690, 772, 797, 801, 992, 993, 1088, 1122, 1141, 1144.
altitude : 275, 992.
composition physico-chimique : 273, 275, 537, 797, 1088.
hibernation : 639.

NYMPHE
clé de détermination : 1088, 1142.
description : 992, 993, 1088, 1142.

ADULTE
clé de détermination : 10, 66, 447, 797, 801, 992, 993, 1088, 1162.
hypopygium : 10, 447, 797, 801, 992, 993, 1088, 1162.
cycle nycthéméral : 447, 801, 1088.
description : 10, 690, 797, 992, 993, 1088.
hypopygium : 797, 992, 993, 1088, 1125.
hibernation : 993.
voltinisme : 993.

Récapitulatif : 10, 51, 66, 135, 147, 152, 161, 168, 273 à 275, 307, 354, 355, 359, 438, 447, 465, 520, 537, 634, 639, 689, 690, 772, 773, 797, 801, 992, 993, 1088, 1121, 1122, 1125, 1126, 1131, 1137, 1141, 1142, 1144, 1162, 1211.

CULEX (CULEX) TORRENTIUM Martini, 1925 *Carte p. 182*

Espèce signalée dans 40 départements : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ariège, Cantal, Corse, Côtes-du-Nord, Doubs, Eure-et-Loir, Finistère, Haute-Garonne, Gironde, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Maine-et-Loire, Morbihan,Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Rhône, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-

Source : MNHN, Paris

et-Marne, Vienne, Vosges, Yvelines, région parisienne.

Cycle saisonnier : 690.

LARVE
clé de détermination : 66, 274, 797, 1088.
description : 155, 278, 690, 993, 1088, 1123.
espèces associées : 147, 155, 278, 380, 690, 748, 871, 993, 1088, 1129, 1140.
gîtes larvaires : 147, 155, 690, 748, 871, 1088, 1129, 1140.
altitude : 155, 380, 382.
composition physico-chimique : 380, 748, 871.

NYMPHE
clé de détermination : 1088, 1142.
description : 155, 993, 1088, 1123, 1142.

ADULTE
clé de détermination : 66, 797, 1088.
hypopygium : 797, 1088.
description : 155, 278, 690, 993, 1088, 1123.
hypopygium : 155, 278, 993, 1088, 1123.
préférences trophiques : 993, 1129.

Récapitulatif : 66, 146, 147, 155, 168, 274, 278, 380, 382, 690, 748, 773, 797, 871, 993, 1088, 1123, 1129, 1136 , 1137, 1140, 1142.

CULEX (CULEX) UNIVITTATUS Theobald, 1901 *Carte p. 182*

Espèce signalée dans 1 département : Corse.

LARVE
clé de détermination : 1088.
description : 1088, 1121.
espèces associées : 355.

NYMPHE
clé de détermination : 1088.
description : 1088.

ADULTE
clé de détermination : 1088.
hypopygium : 1088.
description : 1088.
hypopygium : 1088.

Récapitulatif : 168, 307, 355, 1051, 1078, 1120, 1121.

Source : MNHN, Paris

CULISETA (CULISETA) ALASKAENSIS (Ludlow, 1906) *Carte p. 182*

Espèce signalée dans 2 départements : Ain, Bas-Rhin.

Cycle saisonnier : 690, 748, 1088.

LARVE
- clé de détermination : 690, 797, 1088.
- description : 690, 1088.
- espèces associées : 690, 748, 869, 871.
- gîtes larvaires : 748, 869, 871, 1088.
  - composition physico-chimique : 748, 869, 871.

NYMPHE
- clé de détermination : 1088.
- description : 1088.

ADULTE
- clé de détermination : 690, 797, 1088.
  - hypopygium : 797, 1088.
- cycle nycthéméral : 690.
- description : 690, 1088.
  - hypopygium : 690, 1088.
- voltinisme : 690, 748.

Récapitulatif : 168, 690, 748, 773, 797, 869, 871, 1088.

CULISETA (CULISETA) ANNULATA (Schrank, 1776) *Carte p. 183*

Espèce signalée dans 60 départements : Ain, Allier, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Meuse, Morbihan, Moselle, Oise, Puy- de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Yvelines, région parisienne , Corse.

Cycle saisonnier : 8, 15, 16, 163, 175, 177, 285, 380, 383, 392, 445, 513, 610, 649, 651, 700, 726, 735, 748, 751, 766, 993, 1067,1072, 1077, 1079, 1122.

Elevage : 82, 931.

Physiologie cellulaire : 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473.

OEUF
- éclosion : 1077, 1079.
- gîtes de ponte : 988, 1077, 1079.

LARVE
- alimentation : 82, 958, 1057, 1067.
- clé de détermination : 10, 175, 274, 447, 476, 520, 634, 690, 797, 801, 992, 993, 1052, 1063, 1067, 1072, 1088, 1126, 1162.
- densité : 5, 627, 649, 651.
- description : 10, 510, 797, 992, 993, 1067, 1088, 1121.
  - appareil digestif : 1014, 1016.

Source : MNHN, Paris

papilles anales : 137, 1016.
développement larvo-nymphal : 1057, 1077, 1079.
espèces associées : 15, 16, 66, 86, 88, 90, 127, 129, 144, 160, 163, 175, 209, 275, 277, 279, 298, 380, 442, 443, 446, 447, 465, 476, 520, 605, 610, 627, 649, 664, 690, 748, 749, 751, 772, 797, 800, 801, 844, 847, 869, 871, 992, 993, 1020, 1052, 1067, 1086, 1128, 1141, 1144, 1158, 1172, 1210, 1211, 1213.
facteurs du milieu : 1016.
gîtes larvaires : 10, 13. 15, 16, 52, 66, 86, 88, 90, 99, 100, 136, 146, 163, 175, 209, 273, 280, 285, 298, 380, 387, 445, 446, 465, 476, 502, 520, 537, 538, 605, 610, 618, 627, 649, 651, 664, 672, 689, 728, 745, 748, 751, 766, 772, 797, 865, 869, 988, 992, 993, 1017, 1020, 1045, 1057, 1061, 1067, 1072, 1073, 1077, 1079, 1080, 1088, 1122, 1128, 1141, 1144, 1158, 1172, 1186, 1199, 1210, 1213.
altitude : 99, 275, 280, 380, 382, 387, 797, 992, 993, 1073.
composition physico-chimique : 5, 6, 8, 15, 16, 137, 175, 273, 275, 277, 280, 332, 380, 446, 537, 605, 618, 627, 649, 651, 727, 731, 745, 748, 844, 869, 1045, 1077, 1079, 1088, 1158, 1210.
hibernation : 86, 447, 993, 1007, 1077.
parasite : 1199.

NYMPHE
clé de détermination : 1088, 1142.
description : 797, 992, 993, 1088, 1142.

ADULTE
accouplement : 931.
clé de détermination : 10, 298, 447, 690, 742, 797, 801, 992, 993, 1057, 1063, 1067, 1072, 1088, 1162.
hypopygium : 10, 303, 447, 797, 801, 992, 993, 1088, 1162.
cycle nycthéméral : 163, 275, 447, 751, 766, 797, 1077, 1079.
cytologie : 474.
description : 10, 298, 760, 797, 992, 993, 1088.
corps gras : 78.
genitalia femelle : 100.
hypopygium : 10, 100, 303, 797, 992, 993, 1088.
dispersion : 383.
émergence : 111, 1077.
facteurs du milieu : 766, 1079.
gîtes de repos : 383, 392, 751, 766, 1077, 1079.
hibernation : 79, 86, 136, 163, 298, 299, 380, 390, 391, 447, 513, 751, 766, 772, 931, 937, 993, 1067, 1072, 1179.
gîtes : 129, 383, 387, 388, 391, 446, 627, 662, 766, 797.
longévité : 1077, 1079.
parasites : 110, 112.
piqûre : 1077.
ponte : 937, 1077.
préférences trophiques : 6, 86, 90, 136, 388, 390, 731, 766, 772, 981, 993, 1077, 1079, 1088.
repas sanguin : 1077, 1079.
vecteur (myxomatose) : 383, 387, 391, 751, 766.
vol: 1079.
voltinisme : 476, 751.

Récapitulatif : 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 42, 50, 52, 62, 66, 73, 79, 82, 83, 86, 88, 90, 99, 100, 110 à 112, 127, 129, 136, 137, 144, 146, 160, 163, 168, 172, 175, 177, 204, 209, 273 à 275, 277, 279, 280, 285, 298, 299, 303, 307, 332, 354, 380, 382,

Source : MNHN, Paris

383, 387, 388, 390 à 392, 395, 438, 442, 443, 445 à 447, 455, 465, 467 à 474, 476, 481, 495, 501, 502, 505, 510, 513, 515, 520, 534, 537 à 539, 560, 595, 596, 605, 610, 618, 627, 629, 634, 649, 651, 660, 662 à 664, 672, 689, 690, 694, 700, 726 à 728, 731, 735, 737, 742, 744, 745, 748, 749, 751, 759, 760, 763 à 766, 772, 773, 797, 800, 801, 830, 839, 844, 847, 848, 862, 863, 865, 869, 871, 886, 931, 937, 941, 958, 988, 992, 993, 1007, 1014, 1016, 1017, 1020, 1045, 1051, 1052, 1057, 1061, 1063, 1067, 1071 à 1073, 1077, 1079, 1080, 1082, 1086, 1088, 1096, 1099, 1105, 1121, 1122, 1126, 1128, 1131, 1141, 1142, 1144, 1158, 1162, 1172, 1179, 1186, 1199, 1201, 1207, 1210 à 1213.

CULISETA (CULICELLA) FUMIPENNIS (Stephens, 1825) *Carte p. 183*

Espèce signalée dans 31 départements : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse, Drôme, Haute-Garonne, Gironde, Indre-et-Loire, Isère, Loire-Atlantique, Manche, Meuse, Morbihan, Nord, Oise, Pyrénées Atlantiques, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Seine-et-Marne, Var, Vienne, Yvelines, territoire de Belfort, région parisienne.

Cycle saisonnier : 86, 163, 175, 177, 627, 748, 992, 993, 1088, 1122.

LARVE

clé de détermination : 10, 175, 520, 634, 797, 992, 993, 1052, 1063, 1067, 1072, 1126.
densité : 627.
description : 992, 993, 1067, 1088, 1121.
développement larvo-nymphal : 175.
espèces associées : 90, 129, 163, 175, 277, 281, 386, 465, 627, 628, 748, 992, 993, 1057, 1067, 1137, 1207.
gîtes : 88, 90, 163, 175, 176, 280, 281, 387, 465, 627, 628, 635, 748, 992, 993, 1057, 1067, 1088, 1122, 1186, 1207, 1210. 386.
altitude : 280, 382, 387.
composition physico-chimique : 175, 280, 281, 627, 635, 748, 1210.
hibernation : 890.

NYMPHE

clé de détermination : 1142.
description : 992, 993, 1088, 1142.

ADULTE

clé de détermination : 10, 797, 992, 993, 1057, 1063, 1067, 1072.
hypopygium : 10, 797, 992, 993.
cycle nycthéméral : 90, 1072.
description : 992, 993, 1088.
hypopygium : 992, 993, 1088, 1125.
hibernation : 90.
préférences trophiques : 86, 90, 1088.
vol : 1067.
voltinisme : 175.

Récapitulatif : 10, 42, 51, 86, 88, 90, 129, 163, 168, 175 à 177, 204, 277, 280, 281, 298, 380, 382, 386, 387, 392, 455, 465, 515, 520, 627 à 629, 634, 635, 690, 748, 773, 797, 855, 890, 992, 993, 1051, 1052, 1057, 1063, 1067, 1072, 1088, 1121, 1122, 1125, 1126, 1137, 1142, 1186, 1207, 1210, 1212.

Source : MNHN, Paris

CULISETA (CULISETA) GLAPHYROPTERA (Schiner, 1864) *Carte p. 183*

Espèce signalée dans 2 départements : Alpes-Maritimes, Bas-Rhin.

Cycle saisonnier : 690, 1088.

LARVE
- clé de détermination : 690, 797, 1088.
- description : 690, 1088.
- espèces associées : 146, 155, 380, 690.
- gîtes larvaires : 146, 690, 1088.

NYMPHE
- clé de détermination : 1088.
- description : 1088.

ADULTE
- clé de détermination : 298, 690, 797, 1063, 1067, 1072, 1088.
  - hypopygium : 797, 1057, 1088.
- description : 298, 690, 1088.
  - hypopygium : 303, 1088.
- gîtes de repos : 298, 299.
- hibernation : 298, 1088.
- longévité : 690.
- préférences trophiques : 690, 1088.

Récapitulatif : 146, 155, 168, 298, 299, 303, 380, 690, 773, 797, 1057, 1063, 1067, 1071, 1072, 1088, 1185.

CULISETA (CULICELLA) LITOREA (Shute, 1928) *Carte p. 183*

Espèce signalée dans 15 départements : Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Loire-Atlantique, Manche, Morbihan, Pyrénées-Orientales, Var, Vendée.

Cycle saisonnier : 649, 651, 772.

OEUF
- gîtes de ponte : 988.

LARVE
- clé de détermination : 10, 274, 476, 520, 634, 797, 801, 1088, 1162.
- densité : 627, 649, 651.
- description : 10, 797, 810, 1088.
- espèces associées : 277, 467, 605, 627, 628, 649, 664, 797, 801, 1207.
- gîtes larvaires : 88, 280, 281, 443, 465, 476, 605, 627, 628, 634, 635, 649, 651, 664, 797, 801, 988, 1088, 1199, 1207.
  - altitude : 280.
  - composition physico-chimique : 277, 280, 443, 605, 627, 628, 634, 635, 649, 651, 1210.
- hibernation : 801.
- parasites : 1199.

NYMPHE
- clé de détermination : 1088.

Source : MNHN, Paris

description : 797, 810, 1088.
chaetotaxie : 810.

ADULTE
clé de détermination : 10, 797, 801, 1088, 1162.
hypopygium : 10, 797, 801, 1088, 1162.
description : 797, 1088.
hypopygium : 10, 797, 1088.
préférences trophiques : 1088.

Récapitulatif : 10, 32, 52, 88, 168, 204, 273, 274, 277, 280, 281, 438, 443, 455, 465, 476, 520, 605, 627 à 629, 634, 635, 649, 651, 664, 772, 773, 797, 801, 810, 988, 1051, 1088, 1162, 1199, 1207, 1210.

CULISETA (ALLOTHEOBALDIA) LONGIAREOLATA (Macquart, 1838) *Carte p. 183*

Espèce signalée dans 39 départements : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente-Maritime, Corse, Dordogne, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Indre-et-Loire, Isère, Loire-Atlantique, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Savoie, Seine-et-Marne, Tarn, Var, Vaucluse, Yvelines, territoire de Belfort, région parisienne.

Cycle saisonnier : 163, 445, 649, 651, 1122.

Elevage : 941.

OEUF
gîtes de ponte : 988.

LARVE
clé de détermination : 10, 274, 447, 476, 520, 634, 797, 801, 992, 993, 1052, 1063, 1067, 1072, 1088, 1126.
densité : 649, 651, 797.
description : 10, 690, 797, 992, 993, 1067, 1088, 1121, 1162.
appareil respiratoire : 1038.
papilles anales : 1016.
pièces buccales : 1016.
développement larvo-nymphal : 764.
espèces associées : 90, 127, 136, 266, 275, 380, 432, 447, 465, 476, 520, 605, 649, 694, 797, 800, 801, 804, 808, 847, 1020, 1088, 1094, 1141, 1172.
gîtes larvaires : 10, 88, 90, 99, 136, 146, 163, 266, 275, 380, 387, 432, 447, 465, 476, 520, 605, 618, 649, 651, 689, 690, 694, 745, 764, 797, 804, 808, 847, 851, 855, 988, 992, 993, 1017, 1020, 1045, 1061, 1067, 1072, 1088, 1094, 1141, 1172, 1179, 1186, 1199.
altitude : 99, 100, 275, 380, 382, 387, 855.
composition physico-chimique : 163, 275, 348, 618, 649, 651, 694, 745, 1045, 1088.
hibernation : 447, 801, 1072.
physiologie : 1036, 1037, 1039.
prédateurs : 266.
sexe (détermination du) : 516.

NYMPHE
clé de détermination : 1088, 1142.
description : 993, 1088, 1142.

Source : MNHN, Paris

ADULTE
clé de détermination : 10, 447, 797, 801, 992, 993, 1057, 1063, 1067, 1072, 1088.
hypopygium : 10, 447, 797, 801, 992, 993, 1088.
description : 10, 690, 760, 797, 992, 993, 1088, 1162.
genitalia femelle : 100.
hypopygium : 10, 99, 100, 797, 992, 993, 1088, 1125, 1162.
émergence : 111.
fécondité : 690.
hibernation : 993.
gîtes : 992.
parasite : 112.
préférences trophiques : 6, 447, 690, 772, 941.

Récapitulatif : 6, 10, 51, 62, 88, 90, 99, 100, 111, 112, 127, 135, 136, 146, 163, 168, 204, 266, 273 à 275, 307, 348, 354, 380, 382, 387, 432, 438, 445, 447, 455, 465, 476, 516, 520, 605, 618, 634, 636, 649, 651, 664, 689, 690, 694, 745, 760, 764, 765, 772, 773, 791, 797, 800, 801, 804, 808, 847, 851, 855, 941, 988, 992, 993, 1016, 1017, 1020, 1036 à 1039, 1045, 1051, 1052, 1057, 1061, 1063, 1067, 1072, 1073, 1088, 1094, 1099, 1121, 1122, 1125, 1126, 1141, 1142, 1162, 1172, 1179, 1186, 1199.

CULISETA (CULICELLA) MORSITANS (Theobald, 1901)

Carte p. 183

Espèce signalée dans 33 départements : Ain, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente-Maritime Corse, Creuse, Haute-Garonne, Gironde, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Meuse, Morbihan, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Savoie, Seine-et-Marne, Vienne, Yvelines, territoire de Belfort, région parisienne.

Cycle saisonnier : 5, 8, 163, 175, 177, 285, 298, 300, 387, 700, 726, 748, 992, 993, 1072, 1088.

LARVE
clé de détermination : 10, 175, 520, 797, 992, 993, 1063, 1067, 1072, 1088.
densité : 5, 384, 627.
description : 992, 993, 1088.
papilles anales : 1016.
développement larvo-nymphal : 175.
espèces associées : 5, 88, 90, 127, 129, 163, 175, 279, 281, 380, 381, 384, 501, 610, 627, 748, 749, 992, 993, 1057, 1067, 1137.
gîtes larvaires : 10, 88, 100, 175, 176, 281, 285, 380, 387, 501, 538, 610, 627, 689, 728, 745, 748, 992, 993, 1045, 1072, 1077, 1088.
altitude : 380, 382, 384, 387.
composition physico-chimique : 5, 6, 163, 175, 281, 380, 627, 727, 731, 745, 748, 1045.
hibernation : 298, 299, 380, 387.
phototropisme : 158.

NYMPHE
clé de détermination : 992, 1088, 1142.
description : 993, 1088, 1142.

ADULTE
clé de détermination : 10, 298, 742, 797, 992, 993, 1052, 1057, 1063, 1067, 1072, 1088.
hypopygium : 10, 303, 797, 992, 993, 1088.

Source : MNHN, Paris

cycle nycthéméral : 1072.
description : 10, 298, 303, 992, 993, 1088.
genitalia femelle : 100.
gynandromorphe : 870.
hypopygium : 100, 992, 993, 1088.
voltinisme : 163, 175, 748.

Récapitulatif : 5, 6, 8, 10, 13, 88, 90, 100, 113, 127, 129, 158, 163, 168, 175 à 177, 279, 281, 285, 298, 299, 302, 303, 307, 354, 380 à 382, 384, 387, 392, 501, 515, 520, 538, 610, 627, 629, 689, 690, 700, 725 à 728, 731, 742, 745, 748, 749, 773, 797, 855, 870, 992, 993, 1016, 1045, 1051, 1052, 1057, 1059, 1063, 1067, 1072, 1077, 1078, 1088, 1137, 1142, 1210, 1216.

CULISETA (CULISETA) SUBOCHREA (Edwards, 1921) *Carte p. 184*

Espèce signalée dans 22 départements : Ain, Ardèche, Aube, Aude, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Meuse, Morbihan, Moselle, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Rhône, Seine-Maritime, Var.

Cycle saisonnier : 15, 16, 610, 634, 635, 649, 651, 748.

OEUF
gîtes de ponte : 988.

LARVE
clé de détermination : 10, 274, 447, 476, 520, 634, 690, 797, 801, 992, 993, 1088, 1126, 1162.
densité : 649, 651.
description : 10, 797, 992, 993, 1088.
espèces associées : 15, 16, 88, 133, 136, 275, 520, 649, 748, 772, 797, 800, 801, 839, 992, 1141, 1172.
gîtes larvaires : 10, 15, 16, 88, 133, 136, 280, 465, 501, 520, 605, 634, 635, 649, 651, 689, 748, 819, 839, 847, 988, 992, 993, 1088, 1141, 1172, 1215.
altitude : 280.
composition physico-chimique : 15, 16, 275, 277, 280, 348, 465, 604, 634, 635, 637, 649, 651, 748, 797, 801, 1088, 1215.
hibernation : 447.
parasites : 47.

NYMPHE
clé de détermination : 1088.
description : 797, 993, 1088.

ADULTE
autogenèse : 825.
clé de détermination : 10, 447, 690, 797, 801, 992, 993, 1072, 1088, 1162.
hypopygium : 10, 447, 797, 801, 992, 993, 1088, 1162.
cycle nycthéméral : 447, 797, 801.
description : 10, 690, 797, 992, 993, 1088.
hypopygium : 797, 992, 993, 1088.
hibernation : 662.

Récapitulatif : 10, 15, 16, 47, 51, 88, 133, 136, 168, 204, 224, 273 à 275, 277, 280, 348, 380, 395, 438, 447, 465, 476, 501, 520, 604, 605, 610, 634 à 637, 649, 651, 662 à 664, 689, 690, 748, 772, 773, 797, 800, 801, 819, 825, 839, 847, 855, 988, 992, 993, 1051 , 1072,1088, 1126, 1141, 1162, 1172, 1207, 1215.

Source : MNHN, Paris

ORTHOPODOMYIA PULCHRIPALPIS (Rondani, 1872) *Carte p. 184*

Espèce signalée dans 14 départements : Aude, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse, Côte-d'Or, Gard, Hérault, Indre-et-Loire, Oise, Pyrénées-Orientales, Seine-et-Marne, Var, Yvelines, région parisienne.

Cycle saisonnier : 163, 1088.

LARVE

- alimentation : 1064, 1066, 1067.
- clé de détermination : 10, 274, 447, 634, 797, 801, 1063, 1067, 1072, 1088, 1126, 1162.
- description : 10, 797, 1064, 1066, 1067, 1088.
  - appareil respiratoire : 1067.
- développement larvo-nymphal : 166.
- espèces associées : 163, 275, 447, 520, 797, 803, 1067.
- gîtes larvaires : 10, 163, 275, 444, 447, 520, 689, 772, 797, 801, 803, 819, 1061, 1064, 1066, 1067, 1088, 1199.
  - altitude : 797.
  - composition physico-chimique : 275, 444, 447, 797, 813, 1088.
- hibernation : 890.
- parasites : 799.

NYMPHE

- clé de détermination : 1088.
- description : 1088.

ADULTE

- clé de détermination : 10, 447, 797, 801, 1063, 1067, 1072, 1088, 1162.
  - hypopygium : 447, 797, 801, 1088, 1162.
- description : 10, 797, 1064, 1066, 1088.
  - hypopygium : 797, 1088.
- préférences trophiques : 444, 1088.

Récapitulatif : 10, 51, 163, 166, 168, 273 à 275, 355, 438, 444, 447, 455, 520, 634, 689, 772, 773, 797, 799, 801, 803, 813, 819, 890, 988, 1061, 1063, 1064, 1067, 1072, 1077, 1088, 1126, 1162, 1199.

Source : MNHN, Paris

URANOTAENIA (PSEUDOFICALBIA) UNGUICULATA Edwards, 1913 *Carte p. 184*

Espèce signalée dans 6 départements : Aude, Bouches-du-Rhône, Corse, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales.

Cycle saisonnier : 649, 651, 796, 797, 801.

OEUF

gîtes de ponte : 988.

LARVE

clé de détermination : 10, 274, 634, 797, 801, 1088, 1162.
densité : 649, 651.
description : 10, 446, 797, 1088, 1121.
espèces associées : 273, 446, 520, 649, 796, 797, 803, 1086, 1141.
gîtes larvaires : 10, 273, 354, 446, 520, 649, 651, 689, 772, 796, 797, 801, 988, 1088, 1141.
composition physico-chimique : 273, 348, 446, 649, 651, 797, 801, 1088.
parasites : 1199.

NYMPHE

clé de détermination : 1088.
description : 1088.

ADULTE

clé de détermination : 10, 797, 801, 1088, 1162.
hypopygium : 797, 801, 1088, 1162.
description : 10, 446, 797, 1088.
hypopygium : 10, 797, 1088.
hibernation : 660, 662, 772.
gîtes : 662.
préférences trophiques : 1088.

Récapitulatif : 10, 32, 51, 168, 273, 274, 307, 348, 354, 438, 446, 520, 634, 649, 651, 660, 662, 663, 689, 772, 773, 796, 797, 801, 803, 988, 1086, 1088, 1121, 1141, 1162, 1199.

Source : MNHN, Paris



Imago femelle d'*Aedes detritus*.

Source : MNHN, Paris

INDEX GEOGRAPHIQUE

Source : MNHN, Paris

Source : MNHN, Paris

AIN	
Ae. annulipes	5 - 6 - 8 - 748 - 773 - 850 - 855(?)
cantans	5 - 6 - 7 - 8 - 610 - 725 - 748 - 751 - 773 - 855
cataphylla	8 - 387 - 773 - 858
cinereus	5 - 7 - 8 - 62 - 725 - 748 - 773 - 855 - 869 - 871
communis	62 - 748 - 871
excrucians	5 - 7 - 8 - 387 - 748 - 773 - 855
geminus	748 - 871
geniculatus	387 - 748 - 751 - 773 - 846
pullatus	773
punctor	5 - 6 - 748 - 773 - 855 - 871
refiki	6 - 384 - 725 - 773 - 855(?)
rusticus	5 - 6 - 7 - 8 - 610 - 725 - 748 - 751 - 773 - 855
sticticus	5 - 6 - 7 - 610 - 725 - 748 - 773 - 842 - 845 - 846 - 855 - 864 - 869
vexans	5 - 6 - 7 - 610 - 725 - 773 - 845 - 846 - 850 - 855 - 864
An. claviger	5 - 6 - 366 - 610 - 625 - 773 - 855 - 864
maculipennis	5 - 6 - 65 - 213 - 366 - 610 - 625 - 749 - 751 - 773 - 850 - 871 - 1086
melanoon	428
messeae	748 - 749 - 855 - 857 - 861 - 862
plumbeus	751 - 773 - 855
Cq. buxtoni	864
richiardii	8 - 387 - 773 - 864
Cx hortensis	748 - 773 - 869
modestus	748 - 773 - 855 - 857 - 861 - 862
pipiens	5 - 6 - 62 - 748 - 773 - 862 - 869 - 871
territans	5 - 6 - 8 - 610 - 748 - 773 - 855 - 871
torrentium	748 - 871
Cs. alaskaensis	748 - 869 - 871
annulata	5 - 6 - 8 - 383 - 390 - 391 - 610 - 748 - 751 - 773 - 862 - 869 - 871
fumipennis	748 - 1212
longiareolata	387
morsitans	5 - 6 - 8 - 610 - 725 - 748 - 773 - 855 - 870
subochrea	748 - 773 - 801
Récapitulatif :	5 à 8 - 62 - 65 - 213 - 366 - 383 - 384 - 387 - 390 - 391 - 428 - 610 - 625 - 725 - 748 - 751 - 773 - 801 - 842 - 845 - 846 - 850 - 855 - 857 - 858 - 861 - 862 - 864 - 869 à 871 - 1086 - 1212

AISNE	
An. claviger	283 - 773
maculipennis	283 - 773
plumbeus	773
Cq. richiardii	773
Cx hortensis	773
pipiens	773
Récapitulatif :	283 - 773

Source : MNHN, Paris

ALLIER	
Ae. rusticus	773 - 1056 - 1067 - 1216
An. atroparvus	537(?)
claviger	773
maculipennis	62 - 138 - 537 - 773
Cx hortensis	131 - 138 - 141 - 537 - 773 - 1088
pipiens	537 - 773
theileri	537 - 773 - 1088
Cs. annulata	537 - 773 - 1088
Récapitulatif	62 - 131 - 138 - 141 - 537 - 773 - 1056 - 1067 - 1088 - 1216

ALPES DE HAUTE PROVENCE	
Ae. cataphylla	386
excrucians	386
geniculatus	387
pullatus	387 - 773
refiki	386
rusticus	387 - 610
An. maculipennis	773
Cx torrentium	773
Cs. fumipennis	386 - 387
longiareolata	773
Récapitulatif	386 - 387 - 610 - 773

HAUTES ALPES	
Ae. annulipes	387
cataphylla	386 - 773
communis	773 - 851 - 855 - 1180 - 1216
excrucians	386
geniculatus	773
pullatus	387 - 773 - 1055 - 1065 - 1067 - 1071 - 1093 - 1216
refiki	384 - 386
vittatus	1072
An. claviger	585 - 586 - 589
maculipennis	62 - 65 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 773 - 1086
Cx hortensis	773 - 855
pipiens	62 - 773
torrentium	773
Cs. annulata	62
longiareolata	62 - 773 - 851 - 855 - 1057 - 1067 - 1088

Source : MNHN, Paris

Récapitulatif	62 - 65 - 384 - 386 - 387 - 585 à 589 - 773 - 851 - 855 - 1055 - 1057 - 1065 - 1067 - 1071 - 1072 - 1086 - 1088 - 1093 - 1180 - 1216

ALPES MARITIMES	
Ae. cantans	773
caspius	773
cataphylla	166 - 386 - 387
detritus	773
geniculatus	387 - 773
mariae	773 - 1094
pullatus	166 - 387 - 773 - 1094
refiki	386 - 798
rusticus	386 - 539
vexans	773
vittatus	773
An. claviger	589 - 773
maculipennis	65 - 773
plumbeus	773
Cx hortensis	163 - 773 - 1094
impudicus	773
mimeticus	773
pipiens	62 - 539 - 773 - 956
territans	773
Cs. annulata	539 - 773
fumipennis	773
glaphyroptera	773
litorea	773
longiareolata	773 - 1067 - 1072 - 1088 - 1094
Récapitulatif	62 - 65 - 163 - 166 - 386 - 387 - 539 - 581 - 589 - 773 - 798 - 956 - 1067 - 1072 - 1088 - 1094

ARDECHE	
Ae. cantans	748
punctor	387 - 748
An. maculipennis	773
Cx mimeticus	773
pipiens	712 - 717 - 773
Cs. subochrea	773 - 855
Récapitulatif	387 - 712 - 717 - 748 - 773 - 855

Source : MNHN, Paris

ARDENNES	
Ae. annulipes	773 - 1067
cantans	773
cinereus	735 - 737 - 773
communis	735 - 737
geniculatus	735(?) - 737
punctor	773 - 1058 - 1067 - 1071 - 1072
rusticus	773
An. claviger	734 - 735 - 737 - 773 - 1052 - 1067 - 1086 - 1087
maculipennis	734 - 735 - 737 - 773 - 1086 - 1087
plumbeus	773 - 1067 - 1086
Cq. richiardii	737
Cx pipiens	735 - 737 - 773 - 1088
Cs. annulata	735 - 737 - 773 - 1088
Récapitulatif	734 - 735 - 737 - 773 - 1052 - 1058 - 1067 - 1071 - 1072 - 1086 à 1088

ARIEGE	
Ae. cinereus	773 - 992 - 993
geniculatus	773
pullatus	773
sticticus	773
vexans	773 - 1140
An. claviger	773 - 992 - 993 - 1140
maculipennis	615 - 773 - 1086
plumbeus	992 - 993
Cx hortensis	773 - 992 - 993 - 1088 - 1140
pipiens	773
territans	773 - 992 - 993
theileri	773 - 992 - 993
torrentium	773 - 993 - 1140
Cs. annulata	773 - 992 - 993
longiareolata	773
Récapitulatif	615 - 773 - 992 - 993 - 1086 - 1088 - 1140

AUBE	
An. claviger	283
maculipennis	283 - 991 - 1086
Cx pipiens	773
Cs. subochrea	133 - 773 - 801 - 1067 - 1088

Source : MNHN, Paris

Récapitulatif	133 - 283 - 773 - 801 - 991 - 1067 - 1086 - 1088

AUDE	
Ae. berlandi	773 - 988
caspius	14 - 15 - 16 - 62 - 224 - 348 - 604 - 773 - 818 - 988 - 1150 - 1215
detritus	14 - 16 - 224 - 348 - 604 - 773 - 818 - 988 - 1215
geniculatus	773
mariae	773
vexans	773
vittatus	773
An. algeriensis	773 - 818
atroparvus	797
claviger	760 - 773 - 1086 - 1087
maculipennis	62 - 345 - 348 - 773 - 797 - 1086 - 1134
melanoon	988
Cq. buxtoni	227 - 349
richiardii	227 - 228 - 232 - 348 - 416 - 604 - 773 - 988
Cx hortensis	773 - 988 - 1134
impudicus	773 - 797
mimeticus	773
modestus	15 - 345 - 348 - 773 - 797 - 988
pipiens	348 - 433 - 721 - 773 - 925 - 988 - 1134 - 1136 - 1160 - 1161
territans	773
theileri	773 - 797
Cs. annulata	15 - 73 - 773 - 988
litorea	773 - 988
longiareolata	348 - 773 - 988
subochrea	15 - 274 - 348 - 447 - 604 - 773 - 797 - 801 - 988 - 1088
Or. pulchripalpis	773 - 797 - 988
Ur. unguiculata	348 - 988
Récapitulatif	14 à 16 - 62 - 73 - 224 - 227 - 228 - 232 - 274 - 345 - 348 - 349 - 416 - 433 - 447 - 604 - 721 - 760 - 773 - 797 - 801 - 818 - 925 - 988 - 1086 à 1088 - 1134 - 1136 - 1150 - 1160 - 1161 - 1215

AVEYRON	
Ae. geniculatus	773 - 992 - 993 - 1144
rusticus	773
sticticus	773
vexans	773
An. claviger	773 - 992 - 993 - 1121 - 1130 - 1144 - 1145
maculipennis	1130
plumbeus	773 - 992 - 993
Cx hortensis	773 - 992 - 993
pipiens	712 - 773
territans	773 - 992 - 993

Source : MNHN, Paris

Cs. annulata	773 - 992 - 993 - 1144
Récapitulatif	712 - 773 - 992 - 993 - 1121 - 1130 - 1144 - 1145

BOUCHES DU RHONE

Ae. aegypti	773 - 1020 - 1179 - 1201
berlandi	51 - 773 - 797 - 801 - 1020 - 1199
caspius	32 - 33 - 51 - 52 - 62 - 113 - 202 - 339 - 347 - 401 - 433 - 437 - 438 439 - 495 - 500 - 582 - 648 - 649 - 651 - 663 - 745 - 760 - 772 - 773 - 795 - 797 - 801 - 822 - 844 - 855 - 972 - 973 - 974 - 1017 - 1020 - 1045 - 1179 - 1184 - 1199 - 1211 - 1215
communis	62 - 113 - 765 - 773 - 974 - 1017 - 1020 - 1179
detritus	32 - 33 - 47 - 51 - 113 - 287 - 339 - 347 - 401 - 418 - 419 - 421 - 438 - 442 - 450 - 452 - 495 - 648 - 649 - 651 - 660 - 663 - 706 - 720 - 745 - 772 - 773 - 797 - 801 - 822 - 824 - 844 - 919 - 972 - 973 - 974 - 1017 - 1020 - 1045 - 1179 - 1183 - 1184 - 1199 - 1205 - 1215
dorsalis	773 - 1017 - 1020
flavescens	438 - 773 - 797 - 801
geniculatus	51 - 387 - 438 - 495 - 765 - 772 - 773 - 801 - 1017 - 1020 - 1179 - 1201
mariae	113 - 438 - 745 - 773 - 825
pulchritarsis	1020
punctor	51 - 446 - 773 - 974
refiki	386 - 387
rusticus	51 - 387 - 773 - 1158
vexans	51 - 113 - 438 - 549 - 745 - 772 - 773 - 801 - 974 - 1045
vittatus	773
An. algeriensis	349 - 649 - 651 - 773 - 801 - 1034
atroparvus	113 - 369 - 797 - 997 - 1022 - 1026 - 1087 - 1184 - 1187 - 1199
claviger	625 - 763 - 765 - 772 - 773 - 801 - 1020 - 1179 - 1218
hyrcanus	32 - 51 - 113 - 228 - 339 - 369 - 437 -438 - 439 - 495 - 582 - 649 - 651 - 663 - 772 - 773 - 795 - 796 - 797 - 801 - 972 - 1020 - 1026 - 1034 - 1071 - 1086 - 1087 - 1179 - 1191 - 1192 - 1218
maculipennis	32 - 51 - 113 - 115 - 228 - 339 - 433 - 446 - 495 - 581 - 582 - 625 - 649 - 651 - 660 - 663 - 745 - 763 - 765 - 773 - 797 - 801 - 844 - 974 - 1017 - 1020 - 1026 - 1034 - 1041 - 1045 - 1046 - 1086 - 1087 - 1094 - 1158 - 1163 - 1179 - 1188 - 1189 - 1199 - 1215 - 1218
melanoon	428 - 438 - 661 - 772 - 997 - 1017 - 1022 - 1026
messeae	369 - 968 - 1022 - 1026 - 1187
plumbeus	51 - 773 - 801 - 1017 - 1020 - 1179 - 1218
Cq. buxtoni	227 - 349 - 773
richiardii	32 - 227 - 228 - 339 - 349 - 412 - 413 - 416 - 438 - 495 - 649 - 650 - 651 - 663 - 772 - 773
Cx hortensis	163 - 438 - 745 - 765 - 772 - 773 - 801 - 974 - 1017 - 1020 - 1045
impudicus	51 - 161 - 438 - 649 - 651 - 663 - 772 - 773 - 797 - 801 - 1088
martinii	51 - 772 - 773
mimeticus	438 - 745 - 772 - 773 - 797 - 801 - 1020 - 1045 - 1067 - 1072 - 1088 - 1179

Source : MNHN, Paris

Cx	modestus	32 - 51 - 161 - 202 - 228 - 339 - 436 - 437 - 438 - 493 - 495 - 649 - 651 - 663 - 689 - 772 - 773 - 795 - 797 - 801 - 844 - 848 - 855 - 1046 1088 - 1199 - 1215
	pipiens	32 - 50 - 51 - 339 - 438 - 439 - 446 - 495 - 549 - 649 - 651 - 660 - 663 - 721 - 745 - 763 - 765 - 772 - 773 - 797 - 801 - 844 - 921 - 924 - 925 - 934 - 935 - 1017 - 1020 - 1045 - 1158 - 1160 - 1179 - 1199 -1215
	territans	660 - 1017 - 1020
	theileri	51 - 438 - 772 - 773
Cs.	annulata	50 - 438 - 446 - 495 - 649 - 651 - 660 - 663 - 745 - 763 - 764 - 765 - 772 - 773 - 801 - 1017 - 1020 - 1045 - 1158 - 1179 - 1199
	fumipennis	51
	litorea	32 - 438 - 649 - 651 - 772 - 773 - 797 - 801 - 1088
	longiareolata	51 - 438 - 649 - 651 - 745 - 764 - 765 - 772 - 773 - 801 - 1017 - 1020 1045 - 1088 - 1179
	morsitans	113 - 745 - 1045
	subochrea	51 - 438 - 447 - 649 - 651 - 663 - 772 - 773 - 797 - 801 - 825 - 844 - 855 - 1088 - 1215
Or.	pulchripalpis	51 - 438 - 772 - 773 - 801 - 1199
Ur.	unguiculata	32 - 51 - 438 - 446 - 649 - 651 - 660 - 663 - 772 - 773 - 796 - 797 - 801 - 1088 - 1199
Récapitulatif		32 - 33 - 47 - 50 à 52 - 62 - 113 - 115 - 161 - 163 - 202 - 227 - 228 - 287 - 339 - 347 - 349 - 369 - 386 - 387 - 401 - 412 - 413 - 416 - 418 - 419 - 421 - 428 - 433 - 436 à 439 - 442 - 446 - 447 - 450 - 452 - 493 - 495 - 500 - 549 - 581 - 582 - 625 - 648 à 651 - 660 - 661 - 663 - 706 - 720 - 721 - 745 - 760 - 763 à 765 - 772 - 773 - 795 à 797 - 801 - 822 - 824 - 825 - 844 - 848 - 855 - 919 - 921 - 924 - 925 - 934 - 935 - 968 - 972 à 974 - 997 - 1017 - 1020 - 1022 - 1026 - 1034 - 1041 - 1045 - 1046 - 1067 - 1071 - 1072 - 1086 à 1088 - 1094 - 1158 - 1160 - 1163 - 1179 - 1183 - 1184 - 1187 à 1189 - 1191 - 1192 - 1199 - 1211 - 1215 - 1218

CALVADOS		
Ae.	cantans	773
	caspius	773
	detritus	773
	geniculatus	209 - 773
	punctor	773
An.	atroparvus	908
	claviger	209 - 517 - 773
	maculipennis	209 - 517 - 773 - 1086 - 1201
	plumbeus	209 - 773
Cx	hortensis	209 - 773 - 1088
	pipiens	209 - 773 - 983 - 1201
Cs.	annulata	209 - 773 - 1088 - 1201
	longiareolata	773 - 941 - 1088
	morsitans	773

Source : MNHN, Paris

Récapitulatif	209 - 517 - 773 - 908 - 941 - 983 - 1086 - 1088 - 1201 - 1205

CANTAL	
An. maculipennis	773 - 1086 - 1118
Cx hortensis	773
pipiens	773 - 1136
territans	773
torrentium	1136
Récapitulatif	773 - 1086 - 1118 - 1136

CHARENTE	
An. maculipennis	430 - 773
messeae	430
Cx hortensis	773
Cs. annulata	455
Récapitulatif	430 - 455 - 773

CHARENTE MARITIME	
Ae. annulipes	159
cantans	88 - 465 - 618 - 773
caspius	250 - 277 - 465 - 566 - 568 - 570 - 571 - 575 - 618 - 634 - 636 - 773 - 1056 - 1067
detritus	250 - 277 - 465 - 618 - 634 - 636 - 773
dorsalis	773
flavescens	277 - 773
geniculatus	453 - 455 - 465 - 773
rusticus	159 - 277 - 454 - 465 - 636 - 773
vexans	159 - 465
An. algeriensis	277 - 281 - 454 - 465 - 637 - 773
atroparvus	599 - 984
claviger	465 - 618 - 773
maculipennis	277 - 281 - 453 - 465 - 534 - 548 - 618 - 634 - 637 - 773 - 1087
plumbeus	453 - 455 - 465 - 773
Cq. buxtoni	465 - 618 - 773
richiardii	455 - 465 - 618 - 634 - 637 - 773
Cx hortensis	465 - 552 - 618 - 634 - 773
impudicus	465
modestus	147 - 152 - 277 - 465 - 618 - 637 - 773 - 1088
pipiens	147 - 150 - 152 - 277 - 465 - 534 - 552 - 554 - 555 - 556 - 574 - 576 - 618 - 634 - 636 - 637 - 773 - 984

Source : MNHN, Paris

Cx territans	147 - 151 - 465 - 618 - 773
theileri	147 - 152 - 773 - 1088
Cs. annulata	277 - 455 - 465 - 534 - 618 - 634 - 773
fumipennis	277 - 281 - 465 - 773
litorea	277 - 281 - 455 - 465 - 634 - 773
longiareolata	88 - 455 - 465 - 618 - 636 - 773
morsitans	773
subochrea	277 - 465 - 634 - 636
Or. pulchripalpis	455
Récapitulatif	88 - 147 - 150 à 152 - 159 - 250 - 277 - 281 - 453 à 455 - 465 - 534 - 548 - 552 - 554 à 556 - 566 - 568 - 570 - 571 - 574 à 576 - 599 - 618 - 634 - 636 - 637 - 773 - 984 - 1056 - 1067 - 1087 - 1088

CHER

Néant

CORREZE

Ae. cantans	13
An. atroparvus	1087 - 1114
maculipennis	13 - 773 - 1085 - 1086 - 1107 - 1116 - 1117 - 1194
Cx pipiens	13
Cs. annulata	13
Récapitulatif	13 - 773 - 1085 à 1087 - 1107 - 1114 - 1116 - 1117 - 1194

CORSE

Ae. aegypti	10 - 354 - 355 - 514 - 689 - 773
berlandi	10 - 689 - 773 - 1051
cantans	10 - 354 - 689 - 773
caspius	10 - 62 - 307 - 354 - 520 - 689 - 773 - 803 - 1141 - 1172
cinereus	10 - 307 - 354 - 689 - 773
communis	10 - 62 - 307 - 354 - 689 - 773
detritus	10 - 307 - 354 - 689 - 773 - 824 - 1051 - 1067 - 1141
dorsalis	1141
echinus	1051
geniculatus	10 - 307 - 355 - 387 - 520 - 689 - 773 - 803 - 945 - 1055 - 1058 - 1067 - 1071
mariae	10 - 89 - 127 - 307 - 520 - 689 - 804 - 1016 - 1051 - 1141 - 1172
pulchritarsis	307 - 773 - 803 - 1051
pullatus	1055
rusticus	10 - 520 - 689 - 773 - 1051

Source : MNHN, Paris

Ae.	vexans	10 - 307 - 354 - 689 - 773 - 1051 - 1141 - 1172
	vittatus	10 - 54 - 520 - 689 - 773 - 1051 - 1058 - 1067 - 1071 - 1072
An.	algeriensis	10 - 107 - 189 - 307 - 484 - 485 - 486 - 519 - 689 - 704 - 769 - 773 - 966 - 1016 - 1018 - 1086 - 1141 - 1143 - 1148 - 1182
	atroparvus	704 - 803
	claviger	10 - 138 - 189 - 307 - 354 - 360 - 483 - 484 - 485 - 486 - 517 - 519 - 520 - 528 - 644 - 684 - 685 - 687 -689 - 704 - 756 - 757 - 769 - 773 - 928 - 929 - 966 - 1004 - 1007 - 1016 - 1018 - 1031 - 1051 - 1086 - 1141 - 1143 - 1148 - 1172 - 1182
	hyrcanus	10 - 107 - 189 - 307 - 484 - 519 - 520 - 684 - 685 - 689 - 769 - 773 - 1018 - 1086 - 1148 - 1182
	labranchiae	10 - 361 -363 - 483 - 484 - 689 - 704 - 769 - 1013 - 1016 - 1018 - 1019 - 1051 - 1141 - 1203
	maculipennis	10 - 36 - 62 - 89 - 105 - 107 - 121 - 189 - 296 - 307 - 354 - 360 - 483 - 484 - 485 - 486 - 517 - 519 - 520 - 529 - 530 - 532 - 533 - 584 - 593 - 689 - 704 - 757 - 768 - 769 - 773 - 803 - 959 - 966 - 1004 - 1006 - 1010 - 1013 - 1016 - 1031 - 1051 - 1052 - 1067 - 1086 - 1101 - 1102 - 1108 - 1143 - 1148 - 1172 - 1182
	marteri	10 - 484 - 485 - 486 - 519 - 704 - 773 - 1018 - 1051 - 1086 - 1141 - 1143 - 1182
	melanoon	704 - 1016 - 1141
	messeae	361 - 704 - 1016
	plumbeus	10 - 189 - 307 - 484 - 519 - 520 - 689 - 704 - 769 - 773 - 803 - 1018 - 1051 - 1086 - 1148
	sacharovi	107 - 189 - 361 - 362 - 363 - 483 - 704 - 769 - 1013 - 1016 - 1018 - 1019 - 1086 - 1141 - 1148 - 1203
	superpictus	10 - 704 - 773
Cq.	buxtoni	10 - 307 - 355 - 773
	richiardii	10 - 107 - 307 - 354 - 520 - 689 - 773
Cx	brumpti	10 - 354 - 356 - 689 - 773 - 803
	hortensis	10 - 89 - 129 - 138 - 141 - 307 - 353 - 354 - 518 - 520 - 684 - 685 - 689 - 1016 - 1051 - 1071 - 1078 - 1141 - 1172
	impudicus	10 - 307 - 354 - 355 - 520 - 689 - 773 - 1051 - 1141 - 1172
	laticinctus	10 - 307 - 354 - 689 - 773 - 1078
	mimeticus	10 - 307 - 355 - 520 - 684 - 685 - 689 - 773 - 1051
	modestus	10 - 307 - 355 - 520 - 689 - 773
	pipiens	10 - 62 - 89 - 127 - 307 - 354 - 373 - 520 - 684 - 685 - 689 - 773 - 803 - 804 - 955 - 1016 - 1051 - 1141 - 1172
	territans	1051 - 1078 - 1141(?) - 1172
	theileri	10 - 307 - 354 - 355 - 520 - 689 - 773 - 1141
	torrentium	773
	univittatus	307 - 355 - 1051 - 1078
Cs.	annulata	10 - 307 - 354 - 520 - 689 - 773 - 1007 - 1016 - 1051 - 1141 - 1172
	fumipennis	387 - 1051
	litorea	773 - 1051
	longiareolata	10 - 127 - 307 - 354 - 520 - 689 - 773 - 804 - 1016 - 1051 - 1141 - 1172
	morsitans	10 - 307 - 354 - 689 - 1016 - 1051 - 1078
	subochrea	10 - 520 - 689 - 773 - 1051 - 1141 - 1172
Or.	pulchripalpis	355 - 520 - 689 - 773 - 803
Ur.	unguiculata	10 - 307 - 354 - 520 - 689 - 773 - 803 - 1141

Source : MNHN, Paris

Récapitulatif	10 - 36 - 54 - 62 - 89 - 105 - 107 - 121 - 127 - 129 - 138 - 141 - 189 296 - 307 - 354 à 356 - 360 à 362 - 373 - 387 - 483 à 486 - 514 - 517 à 520 - 528 à 530 - 532 - 533 - 584 - 593 - 644 - 684 - 685 - 687 - 689 - 704 - 756 - 757 - 768 - 769 - 773 - 803 - 804 - 824 - 928 à 930 - 945 - 955 - 959 - 966 - 1004 - 1006 - 1007 - 1010 - 1013 - 1016 - 1018 - 1019 - 1031 - 1051 - 1052 - 1055 - 1058 - 1067 - 1071 - 1072 - 1078 - 1086 - 1101 - 1102 - 1108 - 1141 - 1143 - 1148 - 1172 - 1182 - 1203

COTE D'OR	
Ae. annulipes	773 - 1055 - 1067 - 1190
cantans	1190
communis	773 - 1190
dorsalis	773
flavescens	773
punctor	773 - 1058 - 1071 - 1072
rusticus	464
sticticus	1058
vexans	1058 - 1190
An. claviger	709 - 773 - 879 - 1052 - 1067 - 1086
maculipennis	709 - 773
plumbeus	1190
Cx hortensis	773 - 1067 - 1088 - 1190
pipiens	773 - 1088 - 1190
Or. pulchripalpis	773
Récapitulatif	464 - 709 - 773 - 879 - 1052 - 1058 - 1067 - 1071 - 1072 - 1086 à 1088

COTES DU NORD	
Ae. caspius	773
detritus	773
dorsalis	773 - 1067
An . claviger	297 - 510 - 773 - 1052 - 1067 - 1071 - 1086 - 1087
maculipennis	297 - 553 - 773 - 1086
Cx hortensis	509 - 773 - 1088
pipiens	278 - 505 - 553 - 773
territans	151 - 773 - 1067 - 1088
torrentium	773
Cs. annulata	510 - 773 - 1067 - 1071 - 1088
Récapitulatif	151 - 278 - 297 - 505 - 509 - 510 - 553 - 773 - 1052 - 1067 - 1071 - 1086 à 1088

Source : MNHN, Paris

CREUSE	
Ae. annulipes	773
cantans	13 - 773 - 1055 - 1067
cinereus	13 - 773 - 1053 - 1067 - 1216
geniculatus	773
sticticus	13 - 773 - 1056 - 1067 - 1216
vexans	13 - 773
An. maculipennis	13 - 773 - 1052 - 1067 - 1086
Cx hortensis	13 - 773 - 1067 - 1088
pipiens	13 - 773
territans	13 - 773 - 1067 - 1088 - 1216
Cs. annulata	13
morsitans	13 - 773 - 1057 - 1067 - 1088 - 1216
Récapitulatif	13 - 773 - 1052 - 1053 - 1055 à 1057 - 1067 - 1086 - 1088 - 1216

DORDOGNE	
Ae. cinereus	773 - 992 - 993
geniculatus	773 - 992 - 993 - 1144
sticticus	773
vexans	773
An. claviger	330 - 331 - 746 - 773 - 992 - 993 - 1086 - 1087
maculipennis	330 - 331 - 746 - 773 - 1085 - 1086 - 1128 - 1144
plumbeus	773 - 993 - 1128
Cx hortensis	773 - 992 - 993 - 1088 - 1128 - 1144
impudicus	773 - 992 - 993
pipiens	773 - 1128 - 1136 - 1144
territans	773 - 992 - 993
theileri	773 - 992 - 993 - 1144
Cs. annulata	773 - 992 - 993 - 1088 - 1128 - 1144
longiareolata	773 - 992 - 993
Récapitulatif	330 - 331 - 746 - 773 - 992 - 993 - 1085 à 1088 - 1128 - 1136 - 1144

DOUBS	
Ae. cataphylla	154 - 773
sticticus	773
Cx hortensis	773
torrentium	155
Récapitulatif	154 - 155 - 773

Source : MNHN, Paris

DROME	
Ae. cantans	386
caspius	854
cataphylla	386 - 387
cinereus	386
excrucians	386
geniculatus	387 - 733 - 854
pullatus	387
refiki	384 - 386
rusticus	386 - 610
sticticus	386 - 773 - 855
vexans	773 - 854
An. claviger	854
maculipennis	380 - 773 - 854 - 855
plumbeus	854
Cq. richiardii	387
Cx hortensis	773 - 855
impudicus	773 - 855
pipiens	712 - 854 - 855
Cs. fumipennis	386
longiareolata	382 - 773 - 855
Récapitulatif	380 - 382 - 384 - 386 - 387 - 610 - 712 - 773 - 854 - 855

EURE
Néant

EURE ET LOIR	
An. claviger	985
maculipennis	985
Cx torrentium	773
Récapitulatif	773 - 985

FINISTERE	
Ae. aegypti	164 - 773
caspius	773
detritus	773
dorsalis	773
An. atroparvus	276
claviger	276 - 773

Source : MNHN, Paris

An. maculipennis	773
Cx hortensis	773 - 1067 - 1088
pipiens	531 - 773
torrentium	773
Cs. annulata	773
Récapitulatif	276 - 531 - 773 - 1067 - 1088

GARD

Ae. berlandi	773 - 797
caspius	51 - 62 - 224 - 309 - 347 - 416 - 451 - 527 - 528 - 773 - 797 - 817 825 - 1184 - 1199 - 1215
detritus	224 - 309 - 347 - 442 - 443 - 451 - 773 - 797 - 817 - 823 - 1056 - 1183 - 1184 - 1199 - 1217
geniculatus	773 - 797
mariae	773
rusticus	386 - 610 - 773
vexans	773
vittatus	773 - 808
An. algeriensis	797
atroparvus	797 - 997 - 1199
claviger	528 - 773 - 808
hyrcanus	309 - 416 - 773 - 797
maculipennis	527 - 533 - 534 - 773 - 797 - 1199
melanoon	428 - 997
plumbeus	773 - 797
Cq. richiardii	227 - 228 - 309 - 413 - 416 - 773 - 817
Cs hortensis	773 - 797 - 808
impudicus	773
martinii	773
mimeticus	773 - 808
modestus	309 - 416 - 773 - 797 - 1199
pipiens	68 - 103 - 173 - 347 - 429 - 527 - 528 - 533 - 712 - 717 - 721 - 773 797 - 816 - 921 - 923 - 924 - 1160 - 1161 - 1199 - 224
theileri	797
Cs. annulata	443 - 773 - 1199
litorea	443 - 773 - 797 - 1199
longiareolata	808 - 1199
subochrea	447 - 773 - 797 - 801 - 1088
Or . pulchripalpis	773 - 797
Ur. unguiculata	773 - 1199
Récapitulatif	51 - 62 - 68 - 103 - 173 - 224 - 227 - 228 - 309 - 347 - 386 - 413 - 416 - 428 - 429 - 442 - 443 - 447 - 451 - 527 - 528 - 533 - 534 - 610 - 712 - 717 - 721 - 773 - 797 - 801 - 808 - 816 - 817 - 823 - 825 - 921 - 923 - 924 - 997 - 1056 - 1088 - 1160 - 1161 - 1183 - 1184 - 1199 - 1215 1217

Source : MNHN, Paris

HAUTE GARONNE	
Ae. berlandi	773
cantans	175 - 176 - 177 - 773 - 992 - 993 - 1127 - 1137 - 1139
cinereus	1139
excrucians	773 - 1127 - 1139
geniculatus	83 - 86 - 90 - 175 - 176 - 177 - 773 - 1122 - 1125 - 1131 - 1139 - 1186
pulchritarsis	86 - 90 - 773 - 992 - 993 - 1122 - 1131 - 1139 - 1186
pullatus	773 - 1071
punctor	1137 - 1138 - 1139
rusticus	83 - 86 - 90 - 175 - 176 - 177 - 773 - 992 - 993 - 1122 - 1125 - 1131 - 1137 - 1138 - 1139 - 1145 - 1186
sticticus	86 - 90 - 773 - 993 - 1122 - 1131 - 1137 - 1139 - 1186
vexans	86 - 90 - 175 - 176 - 177 - 773 - 993 - 1122 - 1125 - 1131 - 1138 - 1139 1144 - 1186
An. atroparvus	811 - 1146 - 1169 - 1170
claviger	83 - 175 - 176 - 177 - 476 - 773 - 992 - 993 - 1121 - 1122 - 1137
hyrcanus	476
labranchiae	1121
maculipennis	83 - 86 - 90 - 175 - 176 - 177 - 476 - 477 - 615 - 773 - 811 - 993 1086 - 1122 - 1125 - 1131 - 1132 - 1146 - 1169 - 1170- 1186
messeae	1121 - 1146 - 1169 - 1170
plumbeus	73 - 86 - 90 - 175 - 176 - 177 - 773 - 993 - 1122 - 1131 - 1186
Cq. buxtoni	175 - 176 - 177 - 178
richiardii	175 - 176 - 177 - 178
Cx hortensis	86 - 90 - 476 - 773 - 992 - 993 - 1122 - 1131 - 1186
impudicus	86 - 90 - 773 - 992 - 993 - 1122 - 1125 - 1131 - 1186
modestus	90 - 773 - 992 - 993 - 1088 - 1122 - 1186
pipiens	66 - 67 - 71 - 73 - 76 - 83 - 86 - 90 - 175 - 177 - 179 - 476 - 477 773 - 993 - 1122 - 1125 - 1131 - 1135 - 1136 - 1171 - 1186
territans	86 - 90 - 175 - 176 - 177 - 773 - 992 - 993 - 1088 - 1122 - 1131 - 1186
theileri	773 - 992 - 993 - 1122 - 1125 - 1131 - 1137
torrentium	773
Cs. annulata	66 - 79 - 83 - 86 - 90 - 175 - 177 - 476 - 773 - 992 - 993 - 1088 - 1122 - 1131 - 1186
fumipennis	86 - 90 - 175 - 176 - 177 - 773 - 992 - 993 - 1088 - 1122 - 1125 - 1186
litorea	476
longiareolata	90 - 476 - 773 - 992 - 993 - 1122 - 1125 - 1186
morsitans	175 - 176 - 177 - 773 - 992 - 993
subochrea	773 - 992 - 993
Récapitulatif	66 - 67 - 71 - 73 - 76 - 79 - 83 - 86 - 90 - 175 à 179 - 476 - 477 615 - 773 - 811 - 992 - 993 - 1071 - 1086 - 1088 - 1121 - 1122 - 1125 - 1127 - 1131 - 1132 - 1135 à 1139 - 1144 à 1146 - 1169 à 1171 1186

GERS	
Ae. geniculatus	773
sticticus	773

Source : MNHN, Paris

Ae. vexans	773
An. maculipennis	615 - 1086
Récapitulatif	615 - 773 - 1086

GIRONDE	
Ae. aegypti	164 - 773
cantans	88
caspius	204 - 250 - 605 - 664 - 773
communis	88 - 773
detritus	204 - 605 - 664 - 773
dorsalis	88
flavescens	88 - 204 - 605 - 664
geniculatus	88 - 204 - 773
punctor	88
rusticus	88 - 204 - 605 - 664 - 773
vexans	88 - 204 - 605
An. algeriensis	204
claviger	204 - 270 - 331 - 605 - 773
maculipennis	88 - 204 - 270 - 331 - 605 - 682 - 773
Cq. buxtoni	204
richiardii	204
Cx hortensis	88 - 204
impudicus	605 - 664
modestus	88 - 147 - 152 - 204 - 605 - 773 - 1088
pipiens	88 - 147 - 204 - 605 - 664 - 773
territans	88 - 147 - 204 - 773
theileri	147 - 152 - 773 - 1088
torrentium	278 - 773
Cs. annulata	88 - 204 - 455 - 605 - 664 - 773
fumipennis	204
litorea	88 - 204 - 605 - 664 - 773
longiareolata	88 - 204 - 605 - 664
morsitans	88 - 773
subochrea	88 - 204 - 605 - 664
Récapitulatif	88 - 147 - 152 - 204 - 250 - 270 - 278 - 331 - 455 - 605 - 664 - 682 - 773 - 1088

HERAULT	
Ae. berlandi	444 - 447 - 773 - 797 - 802 - 1199
cantans	445 - 672
caspius	51 - 52 - 62 - 224 - 228 - 347 - 445 - 447 - 672 - 773 - 797 - 800 822 - 1056 - 1150 - 1199 - 1211 - 1215 - 1216
communis	62 - 760

Source : MNHN, Paris

Ae. detritus	52 - 224 - 347 - 442 - 445 - 447 - 500 - 672 - 773 - 797 - 800 - 1199 - 1211
geniculatus	444 - 445 - 447 - 773 - 797 - 800 - 801 - 1199
mariae	773 - 797
pulchritarsis	802
rusticus	51 - 773
vexans	773 - 797
vittatus	773 - 797 - 808
An. algeriensis	773
atroparvus	773 - 797 - 1199
claviger	445 - 447 - 481 - 672 - 760 - 773 - 797 - 808 - 1199
hyrcanus	773 - 796 - 797
maculipennis	62 - 233 - 445 - 447 - 672 - 773 - 796 - 797 - 809 - 1086 - 1199
melanoon	428 - 997
plumbeus	444- 445 - 447 - 672 - 773 - 797 - 1199
Cq. buxtoni	349
richiardii	227 - 228 - 309 - 349 - 412 - 413 - 416 - 773 - 817 - 1150
Cx hortensis	163 - 445 - 447 - 773 - 797 - 800 - 808 - 1088 - 1094 - 1198 - 1199
impudicus	445 - 447 - 672 - 773 - 796 - 797 - 800 - 815 - 1088
martinii	773 - 815
mimeticus	773 - 797 - 801 - 808 - 1088
modestus	773 - 797 - 1199
pipiens	52 - 62 - 68 - 70 - 73 - 83 - 103 - 227 - 429 - 433 - 445 - 447 - 481 525 - 526 - 672 - 711 - 712 - 717 - 719 - 721 - 773 - 797 - 800 - 805 807 - 815 - 816 - 817 - 1088 - 1160 - 1161 - 1199 - 1215
theileri	447 - 773 - 797 - 801 - 1088
Cs. annulata	73 - 445 - 447 - 481 - 773 - 797 - 800 - 1088 - 1199
litorea	52 - 773 - 797 - 1088 - 1199
longiareolata	445 - 447 - 773 - 797 - 800 - 808 - 1088 - 1199
subochrea	224 - 447 - 773 - 797 - 800 - 801 - 1088
Or. pulchripalpis	444 - 447 - 773 - 797 - 801 - 1088 - 1199
Ur. unguiculata	773 - 796 - 797 - 1199
Récapitulatif	51 - 52 - 62 - 68 - 70 - 73 - 83 - 103 - 163 - 224 - 227 - 228 - 233 309 - 347 - 349 - 412 - 413 - 416 - 428 - 429 - 433 - 442 - 444 - 445 447 - 481 - 500 - 525 - 526 - 672 - 711 - 712 - 717 - 719 -721 - 760 773 - 796 - 797 - 800 à 802 - 805 - 807 à 809 - 815 à 817 - 822 - 997 1056 - 1086 - 1088 - 1094 - 1150 - 1160 - 1161 - 1198 - 1211 - 1215 - 1216

ILLE ET VILAINE	
Ae. cantans	773
caspius	773
communis	1058
detritus	773 - 1058
dorsalis	773 - 1058 - 1067
rusticus	773 - 1067

Source : MNHN, Paris

An. claviger	773
maculipennis	126 - 773
Cx hortensis	773 - 1067 - 1088
pipiens	278 - 773 - 1088
torrentium	773
Cs. annulata	773
morsitans	773
Récapitulatif	126 - 278 - 773 - 1058 - 1067 - 1088

INDRE	
An. atroparvus	971
messeae	971
Cx hortensis	773 - 1067
pipiens	531 - 773
Récapitulatif	531 - 773 - 971 - 1067

INDRE ET LOIRE	
Ae. annulipes	163 - 279 - 538 - 773 - 855
cantans	163 - 279 - 538 - 773
cataphylla	137
cinereus	128 - 163 - 279 - 773
communis	62 - 128 - 163
excrucians	773
flavescens	773
geniculatus	127 - 129 - 163 - 538 - 773
punctor	137 - 163 - 773
rusticus	163 - 279 - 398 - 773 - 1091
sticticus	137 - 163
vexans	128 - 163 - 773
An. atroparvus	163 - 1087
claviger	129 - 163 - 773
maculipennis	115 - 129 - 137 - 163 - 430 - 773 - 1087
melanoon	163
messeae	163
plumbeus	163 - 773
Cq. richiardii	163 - 773
Cx hortensis	129 - 131 - 137 - 138 - 141 - 163 - 773 - 1088
modestus	128 - 161 - 163 - 773 - 1088
pipiens	110 - 112- 128 - 129 - 137 - 140 - 162 - 163 - 278 - 318 - 773 - 935 1088
territans	129 - 151 - 163 - 773 - 1088
torrentium	773

Source : MNHN, Paris

Cs. annulata	62 - 110 - 112 - 129 - 163 - 279 - 760 - 773 - 1088
fumipennis	163 - 773 - 1088
longiareolata	163 - 773 - 1088
morsitans	163 - 279 - 773 - 1088
subochrea	773
Or. pulchripalpis	163 - 773
Récapitulatif	62 - 110 - 112 - 127 à 129 - 131 - 137 - 138 - 140 - 141 - 151 - 161 à 163- 278 - 279 - 318 - 398 - 430 - 538 - 760 - 773 - 855 - 935 - 1087 - 1088 - 1091 - 115

ISERE

Ae. annulipes	380- 381 - 382 - 387 - 392 - 766 - 773
cantans	379 - 380 - 382 - 392 - 766 - 773 - 849 - 855
caspius	852 - 854
cataphylla	380 - 381 - 382 - 773
cinereus	62 - 380 - 382 - 387 - 392 - 773 - 855 - 871
communis	380 - 382 - 388 - 751 - 773
excrucians	380 - 382 - 773
geminus	387
geniculatus	380 - 382 - 387 - 392 - 766 - 773
pullatus	380 - 382 - 773 - 1065 - 1067 - 1100
punctor	380 - 382 - 773
refiki	380 - 381 - 382 - 384 - 773
rusticus	380 - 381 - 382 - 383 - 392 - 610 - 766 - 773
sticticus	392 - 773 - 855
surcoufi	392
vexans	380 - 382 - 392 - 766 - 773 - 854 - 855
An. claviger	283 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 392 - 463 - 464 - 579 - 581 - 585 586 - 587 - 588 - 589 - 766 - 773 - 1086 - 1087
maculipennis	213 - 283 - 366 - 380 - 382 - 390 - 391 - 392 - 581 - 585 - 586 - 587 - 589 - 749 - 751 - 766 - 773 - 1086
messeae	383 - 749
plumbeus	380 - 382 - 383 - 392 - 462 - 766 - 773 - 846 - 1052 - 1067 - 1086 - 1087
Cq. buxtoni	392 - 766
richiardii	8 - 380 - 382 - 383 - 387 - 392 - 766 - 773 - 1057 - 1067 - 1088 - 1216
Cx hortensis	379 - 380 - 382 - 392 - 773 - 855 - 1088
pipiens	62 - 379 - 380 - 382 - 392 - 751 - 766 - 773 - 1088
territans	380 - 382 - 392 - 773
torrentium	380 - 382 - 773
Cs. annulata	380 - 382 - 383 - 390 - 391 - 751 - 766 - 773
fumipennis	380 - 382 - 392 - 748 - 773
longiareolata	380 - 382 - 387 - 773
morsitans	380 - 381 - 382 - 392 - 773
Récapitulatif	8 - 62 - 213 - 283 - 366 - 379 à 384 - 387 - 388 - 390 à 392 - 462 à 464 - 579 - 581 - 585 à 589 - 610 - 748 - 749 - 751 - 766 - 773 - 846

Source : MNHN, Paris

	849 - 852 - 854 - 855 - 871 - 1052 - 1057 - 1065 - 1067 - 1086 à 1088 - 1100 - 1216

JURA	
Ae. cantans	386
cataphylla	386 - 773
cinereus	154
dorsalis	773
excrucians	386
rusticus	773 - 1056 - 1067
sticticus	154
vexans	154
An. maculipennis	512
Cx hortensis	509
pipiens	278
theileri	161 - 773 - 1088
torrentium	278 - 773
Récapitulatif	154 - 161 - 278 - 386 - 509 - 512 - 773 - 1056 - 1067 - 1088

LANDES	
Ae. caspius	62 - 760 - 773
communis	62 - 760 - 773
detritus	773
punctor	773
An. claviger	760
maculipennis	62 - 1086
Cx torrentium	278 - 773
Cs. annulata	773
Récapitulatif	62 - 278 - 760 - 773 - 1086

LOIR ET CHER	
Ae. cinereus	460
Cx pipiens	460
torrentium	773
Récapitulatif	460 - 773

Source : MNHN, Paris

LOIRE	
Ae. cantans	386 - 748
communis	773
excrucians	748
geniculatus	846
punctor	748
vexans	773 - 855
An. claviger	773
maculipennis	749 - 773 - 832
messeae	749
plumbeus	773 - 855
Cx hortensis	773
modestus	773 - 848
pipiens	278 - 773
Cs. annulata	773 - 848
morsitans	748
Récapitulatif	278 - 386 - 749 - 773 - 832 - 846 - 848 - 855

HAUTE LOIRE			
Ae. cantans	386 - 773	Ae. communis	773
punctor	773 - 1138		
An. claviger	773		
maculipennis	138 - 773		
Cx hortensis	138 - 773 - 1088 - 1138		
mimeticus	773		
pipiens	773		
territans	138 - 773		
torrentium	773		
Cs. annulata	773		
morsitans	773		
Récapitulatif	138 - 386 - 773 - 1088 - 1138		

LOIRE ATLANTIQUE	
Ae. aegypti	773
annulipes	627 - 628 - 1210
cantans	627 - 773
caspius	395 - 627 - 628 - 629 - 773 - 1056 - 1067 - 1210 - 1216
communis	627 - 1210
detritus	12 - 322 - 395 - 627 - 628 - 629 - 773 - 1067 - 1210
dorsalis	773
flavescens	627 - 628
geniculatus	627 - 773 - 1210

Source : MNHN, Paris

	punctor	627 - 1210
	rusticus	627 - 1210
	sticticus	627 - 628
An.	algeriensis	454 - 773
	atroparvus	152 - 264 - 341 - 627 - 629 - 1210
	claviger	395 - 627 - 629 - 773 - 1210
	maculipennis	12 - 55 - 281 - 549 - 773 - 1086 - 1099
	messeae	152
	plumbeus	627 - 1210
Cx	hortensis	141 - 773
	modestus	395 - 627 - 629 - 1209 - 1210
	pipiens	395 - 627 - 629 - 773 - 1099 - 1210
	territans	395 - 627 - 629 - 773 - 1210
Cs.	annulata	42 - 395 - 627 - 629 - 773 - 1099 - 1210
	fumipennis	281 - 627 - 628 - 629 - 773 - 1210
	litorea	281 - 627 - 628 - 629 - 773
	longiareolata	773 - 1067 - 1088 - 1099
	morsitans	281 - 627 - 629 - 773 - 1210
	subochrea	395
Récapitulatif		12 - 42 - 55 - 141 - 152 - 264 - 281 - 322 - 341 - 395 - 454 - 549 627 à 629 - 773 - 1056 - 1067 - 1086 - 1088 - 1099 - 1209 - 1210 - 1216

LOIRET		
An.	claviger	773 - 1086 - 1087 - 1105
	maculipennis	531 - 773 - 1086 - 1105
Cx	pipiens	773 - 1105
Cs.	annulata	455 - 773 - 1105
Récapitulatif		455 - 531 - 773 - 1086 - 1087 - 1105

LOT		
Ae.	geniculatus	773
	sticticus	773
	vexans	773
An.	claviger	773 - 855
	maculipennis	615 - 1086
Récapitulatif		615 - 773 - 855 - 1086

LOT ET GARONNE		
Ae.	geniculatus	773

Source : MNHN, Paris

Ae. sticticus	773
vexans	773 - 855
An. maculipennis	615 - 1086
Récapitulatif	615 - 773 - 855 - 1086

LOZERE
Néant

MAINE ET LOIRE	
Ae. geniculatus	1071
An. claviger	773 - 1052 - 1067 - 1086 - 1087
maculipennis	62 - 773 - 1052 - 1067 - 1086
Cx hortensis	773
pipiens	773
territans	773
torrentium	773
Cs. annulata	773
morsitans	773 - 1057 - 1067 - 1088
Récapitulatif	62 - 773 - 1052 - 1057 - 1067 - 1071 - 1086 à 1088

MANCHE	
Ae. caspius	773
detritus	773
geniculatus	1067
An. atroparvus	773 - 1087
claviger	773
maculipennis	105 - 115 - 773 - 1086 - 1087
Cq. richiardii	1067
Cx hortensis	773 - 1088
pipiens	773
Cs. annulata	773
fumipennis	455 - 773
litorea	277
Récapitulatif	105 - 115- 277 - 455 - 773 - 1067 - 1086 à 1088

Source : MNHN, Paris

MARNE	
Ae. geniculatus	1055
An. claviger	283 - 517 - 1086
maculipennis	283 - 517 - 1086
plumbeus	214 - 737 - 773
Cq. richiardii	1057
Cx pipiens	253 - 773
Récapitulatif	214 - 253 - 283 - 517 - 737 - 773 - 1055 - 1057 - 1086

HAUTE MARNE	
An. plumbeus	773 - 855
Récapitulatif	773 - 855

MAYENNE	
Ae. cantans	773 - 1055 - 1067
rusticus	773 - 1056 - 1067
Cx hortensis	773 1067 - 1088
pipiens	773 - 1088
Récapitulatif	773 - 1055 - 1056 - 1067 - 1088

MEURTHE ET MOSELLE	
An. claviger	330 - 331 - 773 - 1086 - 1087
maculipennis	312 - 313 - 330 - 331 - 1086
Récapitulatif	312 - 313 - 330 - 331 - 773 - 1086 - 1087

MEUSE	
Ae. geniculatus	737
An. claviger	773 - 1052 - 1067 - 1086
maculipennis	773 - 1052 - 1067 - 1072 - 1086
Cs. annulata	737
fumipennis	455 - 773
morsitans	773 - 1057 - 1067 - 1088
subochrea	133 - 773 - 801 - 1072 - 1089
Récapitulatif	133 - 455 - 737 - 773 - 801 - 1052 - 1057 - 1067 - 1072 - 1086 - 1088 - 1089

MORBIHAN	
Ae. caspius	281 - 773 - 1056 - 1067 - 1207
detritus	280 - 281 - 773 - 1056 - 1067 - 1207
dorsalis	773
geniculatus	773
rusticus	280 - 1207
An. algeriensis	281 - 773
atroparvus	280
claviger	280 - 773 - 1207
maculipennis	280 - 281 - 773 - 1207
Cx hortensis	280 - 773 - 1207
pipiens	42 - 278 - 280 - 281 - 773 - 1207
torrentium	773
Cs. annulata	280 - 773 - 1207
fumipennis	42 - 280 - 281 - 773 - 1207 - 1210
litorea	280 - 281 - 773 - 1207 - 1210
morsitans	281 - 773
subochrea	280 - 773 - 1207
Récapitulatif	42 - 278 - 280 - 281 - 773 - 1056 - 1067 - 1207 - 1210

MOSELLE	
Ae. caspius	41
detritus	501
dorsalis	501 - 773 - 826
sticticus	773
An. claviger	773
maculipennis	143 - 1086
Cx pipiens	501
territans	143
Cs. annulata	501
subochrea	501 - 773 - 801
Récapitulatif	41 - 143 - 501 - 773 - 801 - 826 - 1086

NIEVRE	
Ae. cantans	773 - 1055 - 1067
Cx hortensis	773 - 1067
Récapitulatif	773 - 1055 - 1067

Source : MNHN, Paris

NORD	
Ae. sticticus	773
An. claviger	236 - 283 - 773
maculipennis	236 - 269 - 283 - 773 - 1086
Cx pipiens	278
Cs. fumipennis	455 - 773
Récapitulatif	236 - 269 - 278 - 283 - 455 - 773 - 1086

OISE	
Ae. annulipes	773
cantans	62 - 773 - 1055 - 1067
caspius	773 - 1067
cinereus	773
communis	62 - 773
dorsalis	773
flavescens	62 - 760
geniculatus	773
punctor	773
rusticus	773 - 1158
vexans	773
An. claviger	59 - 517 - 760 - 773 - 1086 - 1087
maculipennis	59 - 62 - 517 - 773 - 1086
plumbeus	773
Cq. richiardii	773
Cx hortensis	773
pipiens	62 - 373 - 773 - 934 - 955
territans	773
torrentium	773
Cs. annulata	62 - 773
fumipennis	773
morsitans	773
Or. pulchripalpis	773
Récapitulatif	52 - 62 - 373 - 517 - 760 - 773 - 934 - 955 - 1055 - 1067 - 1086 1087 - 1158

ORNE
Néant

Source : MNHN, Paris

PAS DE CALAIS	
An. claviger	236
maculipennis	236 - 1052 - 1067 - 1086
Récapitulatif	236 - 1052 - 1067 - 1086

PUY DE DOME	
Ae. cantans	505
cataphylla	130 - 133 - 136 - 137 - 154 - 773
communis	773
excrucians	773
flavescens	131 - 136 - 137
geniculatus	136 - 773
punctor	130 - 133 - 136 - 137 - 154 - 773
refiki	136 - 773
rusticus	136 - 773
sticticus	131 - 136 - 137 - 154 - 773
vexans	136 - 773
An. claviger	133 - 136 - 773 - 1129
maculipennis	131 - 133 - 136 - 137 - 773 - 1129
plumbeus	773 - 855
Cx hortensis	131 - 136 - 137 - 138 - 141 - 146 - 154 - 773 - 1088 - 1129
pipiens	131 - 133 - 136 - 137 - 146 - 278 - 505 - 773 - 1088 - 1129
torrentium	146 - 278 - 773 - 1129
Cs. annulata	136 - 146 - 505 - 773 - 1088
longiareolata	136 - 773
morsitans	773
subochrea	133 - 136 - 773 - 801 - 1088
Récapitulatif	130 - 133 - 136 à 138 - 141 - 146 - 154 - 278 - 505 - 773 - 801 855 - 1088 - 1129

PYRENEES ATLANTIQUES	
Ae. cantans	100
caspius	773
cinereus	100 - 773 - 1053 - 1067
communis	100
detritus	773
geniculatus	100 - 773 - 945 - 1055 - 1067 - 1216
pullatus	773
vexans	99 - 100 - 773
An. claviger	773
maculipennis	773
plumbeus	773

Source : MNHN, Paris

Cx	hortensis	99 - 100 - 773 - 1067
	pipiens	99 - 100 - 773
	territans	99 - 100 - 773 - 1067 - 1088
	torrentium	278 - 773
Cs.	annulata	99 - 100 - 773
	fumipennis	455 - 773
	longiareolata	773
	morsitans	100 - 773
Récapitulatif		99 - 100 - 278 - 455 - 773 - 945 - 1053 - 1055 - 1067 - 1088 - 1216

HAUTES PYRENEES

Ae.	geniculatus	99 - 100 - 773
	pullatus	99 - 100(?) - 773 - 1055 - 1067 - 1071
	rusticus	100
	sticticus	773
	vexans	773 - 1055
	vittatus	1072
An.	claviger	773
	maculipennis	773
	plumbeus	773
Cx	hortensis	99 - 100 - 773 - 1067
	impudicus	773
	pipiens	99 - 100 - 773
	territans	99 - 773 - 1088
	torrentium	278 - 773
Cs.	annulata	99 - 773
	longiareolata	99 - 100 - 773 - 1057 - 1067
Récapitulatif		99 - 100 - 278 - 773 - 1055 - 1057 - 1067 - 1071 - 1072 - 1088

PYRENNES ORIENTALES

Ae.	berlandi	273 - 274 - 275 - 773 - 797
	caspius	14 - 15 - 16 - 224 - 273 - 274 - 275 - 432 - 639 - 773 - 797 - 1150 1215 - 1221
	cataphylla	239 - 240 - 706 - 707 - 773 - 821
	cinereus	273 - 274 - 773
	communis	239 - 240 - 639(?) - 706 - 707 - 773 - 821
	detritus	16 - 224 - 273 - 274 - 275 - 773 - 797 - 824 - 972 - 1221
	excrucians	382 - 706 - 707 - 773 - 821
	geniculatus	273 - 274 - 275 - 773 - 945 - 1055 - 1067
	mariae	273 - 274 - 275 - 282 - 694 - 773 - 790- 797 - 825 - 1071 - 1072 - 1199
	pulchritarsis	773

Source : MNHN, Paris

Ae. pullatus	240 - 273 - 274 - 275 - 432 - 706 - 707 - 773 - 821 - 825
punctor	240 - 273 - 274 - 275 - 706 - 707 - 773 - 821
refiki	773
surcoufi	23 - 240
vexans	273 - 274 - 275
vittatus	147 - 273 - 274 - 275 - 432 - 694 - 773 - 791 - 797
An. algeriensis	14 - 15 - 16 - 773 - 1124 - 1150
atroparvus	273 - 797 - 1021
claviger	273 - 274 - 275 - 330 - 432 - 639 - 694 - 773 - 791
maculipennis	273 - 274 - 275 - 330 - 359 - 432 - 639 - 733 - 773 - 797 - 1021
messeae	1021
plumbeus	273 - 274 - 275 - 773
Cq. richiardii	773
Cx hortensis	273 - 274 - 275 - 359 - 432 - 639 - 773 - 791 - 797 - 1088
impudicus	273 - 274 - 275 - 773 - 797 - 1088
mimeticus	273 - 274 - 773 - 1088
modestus	15 - 224 - 273 - 274 - 275 - 773 - 797 - 1088
pipiens	273 - 274 - 275 - 278 - 359 - 432 - 639 - 694 - 721 - 773 - 791 797 - 924 - 1088 - 1123 - 1160
territans	274(?) - 639 - 773 - 1088
theileri	273 - 274 - 275 - 359 - 773 - 797 - 1088 - 1144
torrentium	278 - 773 - 1088 - 1123
Cs. annulata	15 - 16 - 273 - 274 - 275 - 694 - 773 - 1088
litorea	273 - 274 - 773
longiareolata	273 - 274 - 275 - 432 - 773 - 791 - 797 - 1088
subochrea	15 - 16 - 273 - 275 - 773 - 797 - 801
Or. pulchripalpis	273 - 274 - 275 - 773 - 797 - 1088
Ur. unguiculata	273 - 274 - 773 - 797 - 1088
Récapitulatif	14 à 16 - 23 - 147 - 224 - 239 - 240 - 273 à 275 - 278 - 282 - 330 359 - 382 - 432 - 639 - 694 - 706 - 707 - 721 - 733 - 773 - 790 - 791 - 797 - 801 - 821 - 824 - 825 - 924 - 945 - 972 - 1021 - 1055 - 1067 - 1071 - 1072 - 1088 - 1123 - 1124 - 1144 - 1150 - 1160 1199 - 1215 - 1221

BAS RHIN	
Ae. annulipes	298 - 690 - 773
cantans	170 - 298 - 299 - 302 - 690 - 773
caspius	690 - 773 - 797
cinereus	172 - 298 - 299 - 690 - 773
communis	298 - 299 - 690 - 773
dianteus	690 - 773
dorsalis	298 - 299 - 690 - 773 - 1071
excrucians	690 - 773
geniculatus	127 - 158 - 298 - 299 - 302 - 690 - 773
nigrinus	298 - 299 - 773
punctor	154 - 690 - 773
refiki	690 - 773 - 1185
rusticus	298 - 299 - 302 - 690 - 773

Source : MNHN, Paris

Ae. sticticus	170 - 690 - 773 - 1071 - 1072
vexans	148 - 170 - 172 - 298 - 299 - 302 - 409 - 410 - 690 - 773 - 893 1071 - 1185
An. claviger	146 - 298 - 299 - 690 - 773
maculipennis	143 - 146 - 172 - 298 - 299 - 690 - 773 - 1087
plumbeus	298 - 299 - 690 - 773
Cq. richiardii	298 - 299 - 690 - 773
Cx hortensis	146 - 147 - 152 - 172 - 690 - 773 - 1088
pipiens	140 - 144 - 146 - 148 - 150 - 153 - 156 - 158 - 170 - 172 - 278 298 - 299 - 464 - 690 - 773 - 1088
territans	129 - 146 - 151 - 298 - 299 - 690 - 773 - 1088
theileri	690 - 773 - 1088
torrentium	690 - 773 - 1088
Cs. alaskaensis	690 - 773 - 1088
annulata	144 - 172 - 298 - 299 - 690 - 773
fumipennis	298 - 690 - 773
glaphyroptera	146 - 298 - 299 - 690 - 773 - 1067 - 1071 - 1072 - 1088 - 1185
longiareolata	690 - 773
morsitans	298 - 299 - 690 - 773
subochrea	690 - 773 - 801 - 1088
Récapitulatif	127 - 129 - 140 - 143 - 144 - 146 à 148 - 150 à 154 - 156 - 158 170 - 172 - 278 - 298 - 299 - 409 - 410 - 464 - 690 - 773 - 797 801 - 893 - 1067 - 1071 - 1072 - 1087 - 1088 - 1117 - 1185

HAUT RHIN

Ae. annulipes	501 - 773
cantans	501 - 773
caspius	773
cinereus	773
communis	501 - 773
detritus	501 - 773
dorsalis	773
geniculatus	127 - 773
punctor	501 - 773 - 1058 - 1067 - 1071
rusticus	501 - 773
sticticus	773 - 1058 - 1067 - 1071
vexans	148 - 773 - 1058 - 1067 - 1071
An. claviger	501 - 773
maculipennis	501 - 683 - 773
plumbeus	773
Cq. richiardii	773
Cx pipiens	148 - 773
Cs. annulata	773
fumipennis	773
longiareolata	773
morsitans	501 - 773

Source : MNHN, Paris

Récapitulatif	127 - 148 - 501 - 683 - 773 - 1058 - 1067 - 1071

RHONE

Ae. annulipes	773 - 855(?)
berlandi	773 - 848
cantans	773 - 863
caspius	62 - 852
cinereus	863 - 1212
communis	773
excrucians	773 - 855
geniculatus	751 - 773 - 846 - 852 - 863 - 1212
pulchritarsis	773 - 846 - 847 - 848 - 852 - 855
punctor	773 - 855
refiki	384
rusticus	610 - 773
sticticus	773 - 842 - 845 - 855 - 863 - 1056 - 1067 - 1212 - 1216
vexans	773 - 839 - 842 - 845 - 852 - 863 - 1055 - 1067 - 1212
An. claviger	61 - 62 - 205 - 296 - 366 - 751 - 773 - 1086 - 1087 - 1212
maculipennis	61 - 62 - 205 - 213 - 366 - 751 - 773 - 839 - 841 - 850 - 863 - 866 - 1086 - 1212
plumbeus	366 - 751 - 773 - 846 - 855
Cq. buxtoni	773(?)
richiardii	773 - 864 - 1057 - 1067 - 1216
Cs hortensis	509 - 751 - 773 - 839 - 855 - 863 - 866 - 1212
modestus	773 - 855
pipiens	62 - 158 - 205 - 574 - 751 - 773 - 839 - 840 - 841 - 843 - 855 863 - 866 - 871 - 874 - 1088 - 1212 - 1213 - 1214 - 847
territans	751 - 773 - 855
torrentium	871
Cs. annulata	751 - 773 - 839 - 847 - 863 - 1088 - 1212
fumipennis	773 - 855 - 1212
longiareolata	773 - 1088
morsitans	773 - 855 - 1088
subochrea	773 - 801 - 839 - 847 - 1088
Récapitulatif	61 - 62 - 158 - 205 - 213 - 296 - 366 - 384 - 509 - 574 - 610 - 751 - 773 - 801 - 839 à 843 - 845 à 848 - 850 - 852 - 855 - 863 864 - 866 - 874 - 1055 à 1057 - 1067 - 1086 à 1088 - 1212 à 1214 - 1216 - 871

HAUTE SAONE

Ae. annulipes	773 - 1055 - 1067
geniculatus	773 - 1055 - 1067
punctor	773 - 1056 - 1067
vexans	773 - 1055

Source : MNHN, Paris

An. claviger	464
maculipennis	464
Cq. richiardii	773
Cx hortensis	773 - 1067
pipiens	773
Récapitulatif	464 - 773 - 1055 - 1056 - 1067

SAONE ET LOIRE	
Ae. communis	773
geniculatus	773
An. maculipennis	773
Cx hortensis	773
pipiens	773
Récapitulatif	773

SARTHE	
Cx hortensis	42
torrentium	773
Récapitulatif	42 - 773

SAVOIE	
Ae. annulipes	388 - 773 - 885(?) - 865
cantans	388 - 610 - 728 - 773 - 855 - 865
cataphylla	773 - 848 - 855 - 858 - 865 - 1119
cinereus	728 - 865
communis	773 - 855 - 865
excrucians	728 - 773
geniculatus	388 - 728 - 773 - 865
pulchritarsis	848
pullatus	773
punctor	1119
refiki	384 - 728 - 773
rusticus	388 - 610 - 728 - 848 - 865
sticticus	773 - 865
vexans	383 - 865
An. atroparvus	865
claviger	190 - 380 - 383 - 388 - 585 - 728 - 751 - 773 - 865
maculipennis	31 - 190 - 387 - 388 - 585 - 589 - 725 - 728 - 773 - 855 - 1086
messeae	388

Source : MNHN, Paris

An. plumbeus	388 - 728 - 751
Cq. richiardii	8 - 388 - 751 - 773 - 864 - 865
Cx hortensis	728 - 773 - 865 - 1088 - 1094 - 1119
pipiens	388 - 610 - 728 - 751 - 773 - 865
territans	610 - 728 - 773
torrentium	773
Cs. annulata	388 - 610 - 728 - 751 - 773 - 865
longiareolata	387
morsitans	610 - 728
Récapitulatif	8 - 31 - 190 - 380 - 383 - 384 - 387 - 388 - 585 - 589 - 610 - 725 728 - 751 - 773 - 848 - 855 - 858 - 864 - 865 - 1086 - 1088 - 1094 - 1119

HAUTE SAVOIE	
Ae. cataphylla	773
geminus	387
pullatus	773
rusticus	610
An. maculipennis	773
Cq. richiardii	1088
Cx hortensis	524 - 773 - 1088
pipiens	278 - 773
territans	773 - 1088
torrentium	278 - 773
Cs. annulata	773 - 1088
Récapitulatif	278 - 387 - 524 - 610 - 773 - 1088

SEINE MARITIME	
Ae. caspius	773
communis	773 - 855
punctor	773 - 855
An. claviger	517
maculipennis	517
Cx pipiens	574 - 773
Cs. subochrea	773
Récapitulatif	517 - 574 - 773 - 855

Source : MNHN, Paris

SEINE ET MARNE	
Ae. annulipes	773 - 1055 - 1067
cantans	773 - 1055 - 1067 - 1077
caspius	773 - 1077
cinereus	773 - 1053 - 1067 - 1077
communis	773 - 1056 - 1067 - 1077
dorsalis	1077
echinus	1077
excrucians	1055 - 1077 - 1168
flavescens	1077
geniculatus	515 - 773 - 1055 - 1067 - 1077
nigrinus	773
punctor	773 - 1056 - 1067 - 1077
rusticus	773 - 1077 - 1137
sticticus	515 - 1055 - 1058 - 1077
surcoufi	1055 - 1067 - 1071 - 1072
vexans	1077
An. claviger	773 - 1052 - 1067 - 1077 - 1086 - 1087
maculipennis	517 - 773 - 1052 - 1067 - 1077 - 1086 - 1105
plumbeus	511 - 773 - 1052 - 1067 - 1071 - 1077 - 1086 - 1087
Cq. richiardii	773
Cx hortensis	515 - 773 - 1077 - 1088 - 1134
pipiens	773 - 1077 - 1105
territans	773
torrentium	1137
Cs. annulata	773 - 1077 - 1088
fumipennis	773
longiareolata	1057 - 1067 - 1072 - 1088
morsitans	773 - 1057 - 1067 - 1077 - 1088
Or. pulchripalpis	1077
Récapitulatif	511 - 515 - 517 - 773 - 1052 - 1053 - 1055 à 1058 - 1067 - 1071 1072 - 1077 - 1086 à 1088 - 1105 - 1134 - 1137 - 1168

YVELINES	
Ae. annulipes	773 - 1055 - 1067
cantans	773 - 1067
caspius	160 - 773 - 1055
cinereus	773 - 1053 - 1067 - 1216
communis	773 - 1216
excrucians	773
flavescens	773
geniculatus	515 - 773 - 1055 - 1216
pulchritarsis	1064
punctor	773 - 1058 - 1067 - 1071
rusticus	773 - 1058 - 1216
sticticus	773 - 1067
vexans	773

Source : MNHN, Paris

An. claviger	160 - 283 - 773 - 1052 - 1067 - 1086 - 1087 - 1216
maculipennis	283 - 536 - 773 - 881 - 884 - 886 - 1052 - 1067 - 1086 - 1216
plumbeus	515 - 773 - 886 - 1052 - 1067 - 1071 - 1086 - 1087
Cq. richiardii	515 - 773 - 1057 - 1067 - 1088 - 1216
Cx hortensis	773 - 1067 - 1088
pipiens	160 - 773 - 886
territans	773 - 1067 - 1088 - 1216
torrentium	773
Cs. annulata	160 - 773
fumipennis	773
longiareolata	773 - 1057 - 1067 - 1072 - 1088 - 1216
morsitans	773 - 1057 - 1067 - 1088 - 1216
Or. pulchripalpis	773
Récapitulatif	160 - 283 - 515 - 536 - 773 - 881 - 884 - 886 - 1052 - 1053 - 1055 - 1057 - 1058 - 1064 - 1067 - 1071 - 1072 - 1086 à 1088 - 1216

DEUX SEVRES	
Ae. cantans	773
rusticus	773
An. claviger	773
maculipennis	773
plumbeus	773
Cx hortensis	773
pipiens	773
Cs. annulata	773
Récapitulatif	773

SOMME	
An. claviger	236 - 517
maculipennis	236 - 512 - 517 - 773 - 884 - 1086
Cx pipiens	773
territans	773
Récapitulatif	236 - 512 - 517 - 773 - 884 - 1086

TARN	
Ae. geniculatus	773
rusticus	773 - 1056 - 1067 - 1145 - 1158 - 1216
sticticus	773
vexans	773

Source : MNHN, Paris

An. claviger	1001 - 1145
maculipennis	1001
Cx hortensis	1134
pipiens	87 - 712 - 1136
Cs. annulata	992 - 993
longiareolata	773 - 992 - 993
Récapitulatif	87 - 712 - 773 - 992 - 993 - 1001 - 1056 - 1067 - 1134 - 1136 - 1145 - 1158 - 1216

TARN ET GARONNE	
Ae. geniculatus	773
sticticus	773
vexans	773
An. maculipennis	615 - 1086 - 1194 - 1195
Cx pipiens	773
territans	773 - 992
Récapitulatif	615 - 773 - 992 - 1086 - 1194 - 1195

VAR	
Ae. aegypti	773 - 1179
berlandi	132 - 134 - 266 - 773 - 1067 - 1072 - 1179
cantans	208 - 773(?) - 1055 - 1067
caspius	62 - 266 - 773 - 1179
cataphylla	386
detritus	773 - 855 - 1056 - 1067 - 1179 - 1217
geniculatus	132 - 266 - 773 - 1020 - 1179
mariae	266 - 640 - 641 - 643 - 773 - 855 - 1020 - 1056 - 1058 - 1067 - 1071 - 1072 - 1179
pulchritarsis	51 - 773 - 1071 - 1072
refiki	51 - 386 - 773
rusticus	386 - 387 - 610
vexans	549 - 773
vittatus	157 - 165 - 773 - 1020 - 1078 - 1179
An. atroparvus	855
claviger	590 - 773 - 855 - 928 - 970 - 1069 - 1179
maculipennis	157 - 165 - 208 - 266 - 550 - 552 - 578 - 581 - 611 - 695 - 773 - 1069 - 1086 - 1179
plumbeus	132 - 773 - 855
Cx hortensis	129 - 157 - 163 - 165 - 773 - 1179
impudicus	157 - 165 - 773
laticinctus	773 - 1058 - 1071
mimeticus	773

Source : MNHN, Paris

Cx pipiens	62 - 157 - 165 - 266 - 528 - 549 - 740 - 773 - 961 - 962 - 1179
territans	1069(?) - 1179
Cs. annulata	62 - 773 - 941 - 1179
fumipennis	386
litorea	773
longiareolata	266 - 773 - 941 - 1057 - 1067 - 1072 - 1073 - 1088 - 1179
subochrea	773 - 855
Or. pulchripalpis	166 - 773
Récapitulatif	51 - 62 - 129 - 132 - 134 - 157 - 163 - 165 - 166 - 208 - 266 - 386 - 387 - 528 - 549 - 550 - 552 - 578 - 581 - 590 - 610 - 611 - 640 - 641 - 643 - 695 - 740 - 773 - 855 - 930 - 941 - 961 - 962 - 970 - 1020 - 1055 à 1058 - 1067 - 1069 - 1071 à 1073 - 1078 - 1086 - 1088 - 1179 - 1217

VAUCLUSE

Ae. berlandi	773
cantans	386
geniculatus	387
refiki	386
rusticus	386 - 610
sticticus	386 - 387
vittatus	773
An. claviger	773
maculipennis	383 - 773
Cx hortensis	773
impudicus	773
pipiens	773
Cs. annulata	383 - 773
longiareolata	773
Récapitulatif	383 - 386 - 387 - 610 - 773

VENDEE

Ae. cantans	38 - 249 - 465
caspius	38 - 39 - 247 - 249 - 250 - 465 - 637 - 773
detritus	38 - 39 - 247 - 249 - 250 - 465 - 637 - 773 - 972 - 973
dorsalis	773
flavescens	465
geniculatus	773
punctor	945
rusticus	38 - 249 - 465 - 932 - 933
An. atroparvus	907 - 932 - 933 - 969 - 976 - 1087 - 1208
claviger	465 - 773 - 932 - 933
maculipennis	607 - 773 - 885 - 886 - 890 - 891 - 900 - 1087

Source : MNHN, Paris

An. messeae	152 - 932 - 933
plumbeus	932
Cx hortensis	773
impudicus	38 - 249
modestus	773 - 927 - 932 - 933 - 1088
pipiens	465 - 607 - 773 - 935
Cs. annulata	455 - 773 - 886 - 931 - 1088
litorea	773
Récapitulatif	38 - 39 - 152 - 247 - 249 - 250 - 455 - 607 - 637 - 773 - 885 - 886 - 890 - 891 - 900 - 907 - 927 - 931 à 933 - 935 - 945 - 969 972 - 973 - 976 - 1087 à 1089 - 1208

VIENNE

Ae. annulipes	773
cantans	773 - 1055 - 1067
cinereus	773
geniculatus	773
rusticus	773 - 1091
vexans	773
An. claviger	773
maculipennis	773
plumbeus	773
Cq. richiardii	773
Cx hortensis	773
modestus	773
pipiens	773
territans	773
torrentium	773
Cs . annulata	455 - 773
fumipennis	773 - 1088
morsitans	773
Récapitulatif	455 - 773 - 1055 - 1067 - 1088 - 1091

HAUTE VIENNE

Ae. cantans	13
geniculatus	13 - 1055 - 1067 - 1216
An. maculipennis	13
Cx pipiens	13 - 62
territans	13
Cs. annulata	13
Récapitulatif	13 - 62 - 1055 - 1067 - 1216

Source : MNHN, Paris

VOSGES	
Ae. communis	158 - 174
punctor	773
Cx hortensis	147 - 152
pipiens	147 - 773
torrentium	147 - 773
Récapitulatif	147 - 152 - 158 - 174 - 773

YONNE	
An. claviger	773
maculipennis	773 - 884 - 1086
Cx. pipiens	773
Récapitulatif	773 - 884 - 1086

TERRITOIRE DE BELFORT	
Ae. annulipes	773
caspius	773
cinereus	773
communis	773
dorsalis	773
geniculatus	773
punctor	773
rusticus	773
vexans	773
An. claviger	683 - 773 - 1086
maculipennis	683 - 773 - 1086
plumbeus	773
Cq. richiardii	773
Cx pipiens	773
Cs. fumipennis	773
longiareolata	773
morsitans	773
Récapitulatif	683 - 773 - 1086

REGION PARISIENNE	
Ae. annulipes	515 - 773 - 1059 - 1067
berlandi	773 - 1060 - 1067 - 1071 - 1072 - 1076 - 1077
cantans	538 - 773 - 1055 - 1067 - 1090

Source : MNHN, Paris

Ae. caspius	62 - 515 - 830 - 1056 - 1072
cinereus	773 - 830 - 1053 - 1067 - 1076 - 1168
communis	538 - 773 - 830 - 1056 - 1067 - 1168
echinus	1055 - 1067
excrucians	773 - 1055 - 1059 - 1067 - 1072 - 1168
flavescens	773 - 1067 - 1072
geniculatus	127 - 515 - 773 - 830 - 948 - 949 - 1055 - 1067 - 1077 - 1079
nigrinus	773
pulchritarsis	515 - 948 - 949
punctor	515 - 773 - 1056 - 1067 - 1072
rusticus	210 - 515 - 538 - 1058 - 1071 - 1072
sticticus	773
surcoufi	1055 - 1067 - 1071 - 1072
vexans	515 - 773
An. claviger	283 - 515 - 538 - 595 - 596 - 744 - 773 - 830 - 1052 - 1067 - 1086 - 1087 - 1104
maculipennis	105 - 115 - 283 - 512 - 515 - 595 - 596 - 678 - 744 - 773 - 830 877 - 881 - 882 - 884 - 900 - 977 - 1052 - 1067 - 1079 - 1086 - 1096 1097 - 1104
plumbeus	511 - 515 - 773 - 1052 - 1067 - 1071 - 1077 - 1086 - 1087
Cq. richiardii	210 - 357 - 773 - 1057 - 1067 - 1088
Cx hortensis	353 - 515 - 773 - 1067 - 1088
pipiens	59 - 60 - 62 - 197 - 256 - 374 - 375 - 515 - 527 - 538 - 595 - 596 744 - 773 - 924 - 934 - 962 - 1096 - 1168
territans	151 - 515 - 773 - 1067 - 1088
torrentium	773
Cs. annulata	455 - 513 - 515 - 538 - 595 - 596 - 744 - 773 - 830 - 1096
fumipennis	515 - 773 - 1057 - 1067 - 1072 - 1088
longiareolata	773 - 1067
morsitans	515 - 538 - 773 - 1057 - 1067 - 1072 - 1088
Or. pulchripalpis	773
Récapitulatif	59 - 60 - 62 - 105 - 115 - 127 - 151 - 197 - 210 - 256 - 283 - 353 - 357 - 374 - 375 - 455 - 511 à 513 - 515 - 527 - 538 -595 - 596 678 - 744 - 773 - 830 - 877 - 881 - 882 - 884 - 900 - 924 - 934 948 - 949 - 962 - 1052 - 1053 - 1055 à 1060 - 1067 - 1071 - 1072 - 1076 - 1077 - 1079 - 1086 à 1088 - 1090 - 1096 - 1097 - 1104 - 1168

Source : MNHN, Paris

INDEX MATIERES

Source : MNHN, Paris

Source : MNHN, Paris

A. Accouplement : 43, 73, 103, 129, 161, 257, 347, 376, 416, 429, 476, 505, 640, 690, 905, 906, 917, 928, 930, 931, 935, 947, 969, 970, 983, 1016, 1064, 1066, 1077, 1079.
Alimentation
adulte : 35, 416, 418, 419, 505, 1211.
larve : 35, 43, 82, 161, 163, 367, 414, 416, 418, 419, 422, 476, 509, 914, 928, 930, 944, 958, 962, 967, 1057, 1064, 1066, 1067, 1077, 1079, 1211.
Appareil digestif
adulte : 28, 73, 319, 320, 541, 759, 762.
larve : 73, 74, 75, 198, 199, 322, 414, 415, 1014, 1016, 1211.
Appareil respiratoire (adulte) : 321
larve : 322, 357, 415, 1038, 1067.
nymphe : 10, 322, 1028.
Asphyxie (larve) : 547, 1036, 1037, 1039.
Autogenèse : 43, 66, 71, 72, 73, 76, 82, 83, 103, 257, 258, 259, 260, 261, 376, 412, 413, 416, 418, 419, 420, 423, 642, 712, 717, 807, 823, 824, 825, 826, 873, 897, 899, 902, 903, 905, 921, 962, 964, 1077, 1205.

C. Cellules sanguines : 19.
Chondriome : 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 475.
Clé de détermination
adulte : 10, 23, 66, 88, 240, 298, 447, 690, 742, 797, 801, 992, 993, 1054, 1056, 1057, 1060, 1061, 1063, 1067, 1068, 1072, 1086, 1087, 1088, 1162, 1187.
ailes : 1187. chromosomes : 1146.
genitalia femelle : 1139.
hypopygium : 10, 23, 66, 303, 447, 797, 801, 992, 993, 1061, 1086, 1087, 1088, 1093, 1162.
larve : 10, 23, 66, 88, 175, 274, 447, 456, 476, 520, 634, 690, 797, 801, 992, 993, 1052, 1059, 1063, 1067, 1072, 1086, 1087, 1088, 1126, 1162.
nymphe : 10, 1086, 1087, 1088, 1142.
oeuf : 10, 1087.
Colibacille : 1219, 1220.
Comportement anormal (larve) : 497.
Consanguinité : 68, 69.
Corps gras
adulte : 73, 77, 78, 80, 903, 968.
larve : 73, 80.

D. Développement embryonnaire : 72, 210, 408, 416, 420, 476, 640, 1079, 1154.
Dispersion : 163, 228, 240, 266, 383, 416, 442, 447, 570, 571, 627, 735, 736, 751, 772, 797, 801, 840, 873, 884, 1086, 1087, 1100, 1211.
Dormance (oeuf) : 690, 920, 926, 929, 934, 938, 950, 970, 974, 1066, 1137, 1155, 1211.

E. Eclosion : 90, 105, 347, 505, 853, 920, 934, 946, 950, 972, 974, 1013, 1016, 1064, 1077, 1079, 1154, 1156, 1211, 1223.
Emergence (adulte) : 58, 111, 358, 413, 488, 1077.
Enzymes : 245, 372, 419, 424, 647, 648, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 720, 721, 722, 892, 894, 1049, 1050, 1166, 1167, 1205.
Essaim : 163, 347, 416, 751, 1056, 1072, 1079.

F. Fécondité : 43, 68, 129, 257, 258, 259, 367, 376, 412, 413, 418, 422, 423, 429, 476, 505, 540, 642, 910, 918, 921, 922, 923, 955, 956, 961, 964, 983, 1154.
Fossile : 652, 653, 755.

Source : MNHN, Paris

H. Hibernation
adulte : 71, 73, 76, 79, 83, 86, 88, 90, 105, 136, 144, 163, 298, 299, 380, 387, 390, 391, 447, 505, 513, 529, 563, 577, 578, 585, 615, 624, 627, 660, 678, 751, 766, 772, 801, 862, 890, 892, 900, 903, 925, 931, 936, 937, 938, 951, 964, 968, 983, 993, 1004, 1012, 1066, 1067, 1072, 1077, 1079, 1086, 1087, 1088.
larve : 5, 86, 136, 175, 299, 381, 447, 585, 586, 588, 639, 818, 846, 892, 894, 898, 929, 940, 942, 943, 970, 993, 1004, 1007, 1057, 1064, 1066, 1067, 1072, 1077, 1086, 1087, 1096, 1122, 1154, 1155, 1157, 1211.

I. Insémination : 680.

L. Longévité (adulte) : 72, 73, 76, 81, 416, 505, 559, 663, 690, 1077, 1079, 1154.

M. Maturation des oeufs : 73, 81.

N. Nymphose : 357.

P. Papilles anales : 130, 136, 137, 154, 1016, 1037, 1039.
Parasites et maladies des moustiques : 1067.
acariens : 73, 296, 1051.
champignons : 70, 73, 110, 112, 175, 450, 518, 797, 799, 965, 1098, 1199.
ciliés : 73, 296, 402, 639, 1114.
flagellés : 73, 580, 584.
grégarines : 463, 464, 1108.
mermithidés : 286, 287, 1205.
microsporidies : 421, 461, 1183, 1184.
virus irisant : 451, 452.
autres : 11, 145, 296, 304, 340, 365, 536, 817, 1051.
Phototropisme (larve) : 158.
Piqûre : 18, 61, 90, 139, 209, 324, 512, 598, 1077, 1202.
Ponte : 105, 161, 163, 260, 318, 376, 416, 505, 555, 640, 641, 690, 901, 937, 974, 991,1012, 1064, 1066, 1077, 1154, 1211.
gîtes de ponte : 347, 820, 822, 890, 988, 1068, 1077, 1079, 1137.
Prédateurs : 34, 266, 326, 398, 416, 460, 639, 691, 758, 990, 1066, 1067, 1072, 1095, 1096.
Préférences trophiques : 5, 6, 31, 86, 90, 107, 129, 133, 136, 146, 161, 162, 163, 170, 264, 265, 302, 363, 366, 383, 388, 390, 412, 444, 447, 505, 538, 548, 549, 550, 552, 553, 556, 559, 560, 569, 578, 690, 719, 731, 751, 766, 772, 795, 805, 852, 854, 857, 885, 886, 887, 891, 895, 904, 905, 906, 931, 933, 934, 941, 959, 961, 979, 983, 993, 1016, 1018, 1026, 1077, 1079, 1088, 1122, 1129, 1203.
Repas sanguin : 129, 416, 505, 772, 891, 900, 901, 951, 1016, 1077, 1079, 1103.

S. Sex ratio : 347, 376, 429.
Système excréteur
tubes de Malpighi : 474.
Système neuro-endocrinien : 192, 418, 419, 420, 424.

T. Techniques
appareil photopériodique : 1155.
biométrie : 35, 66, 67, 69, 88, 140, 150, 153, 258, 259, 261, 272, 360, 363, 376, 448, 476, 681, 797, 802, 805, 809, 810, 812, 816, 895, 901, 1089, 1117, 1169, 1171, 1194, 1195.
carte écologique : 5, 14, 15, 16, 32, 39, 52, 204, 230, 231, 285, 345, 346, 347, 348, 379, 389, 392, 491, 605, 634, 638, 649, 651, 699, 700, 725, 726, 727,729, 730, 731, 751, 766, 767, 819, 820, 822, 988, 1149, 1150.
échantillonnage (larve) : 239, 335, 609, 706, 708.

Source : MNHN, Paris

électrophorèse : 265, 419, 476, 647, 711, 712, 718, 720, 769, 1049, 1050, 1166, 1167, 1205.
élevage : 35, 43, 66, 72, 73, 82, 103, 129, 161, 259, 413, 414, 415, 419, 489, 505, 525, 544, 571, 614, 640, 647, 676, 712, 759, 856, 884, 900, 914, 917, 928, 930, 931, 939, 941, 944, 947, 958, 963, 970, 983, 991, 1007, 1154, 1196, 1205.
extraction (oeuf) : 347, 819.
lutte
biologique : 11, 26, 53, 106, 108, 113, 218, 342, 508, 556, 607, 615, 619, 691, 759, 866, 1000, 1004.
chimique
sensibilité aux insecticides : 89, 401, 500, 661, 715, 768, 860, 867, 868, 1159.
résistance aux insecticides : 245, 372, 713, 715, 716, 717, 721, 722, 859, 874, 875, 1160, 1161, 1186.
génétique : 225, 226, 244, 525, 526.
physique : 11, 22, 26, 53, 93, 232, 328, 342, 343, 410, 545, 546, 558, 564, 607, 615, 671, 740, 756, 759, 786, 1000, 1004, 1044.
marquage : 239, 240, 627, 680, 706, 707, 821.
montage (adulte) : 329, 872.
piège : 339, 545, 546.
autres : 239, 329, 335, 609, 676, 714, 819, 872, 1049, 1050.
V. Vecteurs
Dirofilaria immitis : 777, 945, 978, 1067.
Dirofilaria repens : 33, 1067.
encéphalomyélite équine vénézuelienne : 982.
fièvre jaune : 979.
myxomatose : 120, 383, 387, 389, 390, 391, 438, 478, 479, 480, 489, 492, 495, 496, 614, 751, 766, 814.
paludisme (voir aussi annexe "répartition du paludisme humain par région")
aviaire : 109, 923, 960, 981.
humain : 1, 3, 4, 9, 11, 17, 20 à 22, 25 à 27, 29, 30, 36, 37, 40, 44 à 46, 48, 49, 55, 56, 64, 65, 84, 85, 91, 94 à 96, 104, 113, 114, 116, 117, 119, 121 à 124, 126, 142, 143, 169, 171, 180 à 188, 191, 193 à195, 200, 201, 206, 207, 211, 213, 215 à 217, 220, 221, 236 à 238, 241 à 243, 246, 251, 252, 254, 255, 262 à 264, 267, 268, 270, 271, 276, 283, 288, 289, 291 à 296, 308, 311 à 316, 323, 325,327, 333, 334, 336, 338, 341, 342, 344, 351, 352, 361, 364, 368 à 371, 377, 378, 380, 396, 397, 399, 400, 404, 411, 430, 431, 440, 449, 457 à 459, 466, 482 à 487, 498, 503, 504, 506, 507, 512, 521 à 523, 527, 530, 532 à 534, 583, 584 589, 590, 592 à 594, 597, 599, 600 à 603, 607, 611 à 613, 615, 616, 620 à 623, 625, 626, 630, 631, 633, 644 à 646, 654, 655, 658, 659, 670, 671, 673, 677, 679, 682, 683, 686, 693, 695, 697, 702 à 704, 709, 710, 723, 724, 733 à 737, 739, 741, 743, 746 à 748, 750, 752, 753, 756, 757, 759, 761, 765, 769 à 771, 776, 778 à 783, 785, 787 à 789, 792 à 794, 827 à 829, 831 à 835, 837, 838, 876, 878, 880 à 882, 884, 886, 888, 895, 896, 915, 959, 984, 985, 989, 994 à 996, 998, 999, 1002 à 1006, 1008 à 1012, 1015, 1018, 1019, 1021 à 1030, 1032 à 1035, 1040, 1042, 1043, 1048, 1051, 1083, 1084, 1099, 1101 à 1103, 1107, 1120, 1147, 1148, 1163, 1165, 1173 à 1176, 1178, 1179, 1182, 1193, 1197, 1200, 1208, 1218, 1222, 1224, 1226 à 1228. 92.
Tahyna : 24, 202, 435, 439, 490, 495, 657, 698, 732, 738, 747, 836.
West Nile : 434, 435, 436, 437, 490, 493, 494, 495, 663, 698, 705, 732, 738, 747, 772, 836.
Wuchereria bancrofti : 173.
Viabilité (oeuf) : 68.
Vol : 5, 113, 161, 512, 734, 1067, 1077, 1079.

Source : MNHN, Paris

ANNEXE : Répartition du paludisme humain par région.

ALSACE : 143, 169, 397, 503, 683, 834, 1083, 1193, 1197.

AQUITAINE : 238, 254, 270, 291 à 293, 333, 334, 338, 615, 682, 746, 999, 1084, 1147.

AUVERGNE : 832.

BOURGOGNE : 833.

BRETAGNE : 126, 193, 252, 431, 613.

CENTRE : 201, 985.

CHAMPAGNE : 91, 600, 734 à 737, 989, 1176.

CORSE : 3, 4, 17, 21, 29, 36, 64, 94, 121, 186, 188, 191, 194, 215 à 218, 294, 361, 370, 482 à 486, 504, 520, 530, 532, 583, 584, 592, 593, 601, 622, 623, 625, 626, 633, 644, 671, 673, 686, 697, 704, 750, 756, 757, 769, 771, 778, 785, 787, 788, 959, 1004 à 1006, 1009 à 1012, 1015, 1030, 1035, 1040, 1042, 1051, 1101, 1102, 1182, 1228.

FRANCHE-COMTE : 84, 96, 221, 344, 620, 625, 677, 748, 1178.

LANGUEDOC-ROUSSILLON : 26, 182 à 185, 316, 440, 506, 522, 527, 654, 655, 733, 794, 838, 1021, 1165.

LIMOUSIN : 1107.

LORRAINE : 45, 48, 143, 220, 311 à 313, 315, 352, 457, 503, 600, 743, 1048, 1222.

NORD : 37, 44, 49, 195, 236, 237, 255, 271, 288, 399, 400, 458, 521, 597, 752, 753, 776, 779, 789, 828.

NORMANDIE : 246, 646.

PAYS DE LOIRE : 40, 55, 56, 264, 267, 341, 607, 1099, 1208.

PICARDIE : 124, 268, 487, 752, 783, 878.

POITOU-CHARENTE : 9, 85, 323, 342, 534, 599, 710, 984, 1147.

PROVENCE-COTE D'AZUR : 1, 25, 368, 369, 396, 590, 611, 645, 695, 765, 781, 1034, 1173, 1179.

Camargue : 113, 263, 527, 534, 620, 654, 1003, 1022, 1026, 1027, 1163, 1218.

REGION PARISIENNE : 30, 46, 95, 116, 187, 200, 207, 276, 289, 308, 327, 336, 411, 449, 523, 631, 659, 693, 723, 780, 827, 829, 831, 998, 1200, 1226.

RHONE-ALPES : 27, 213, 380, 579, 589, 591.

Source : MNHN, Paris

INDEX DES AUTEURS

Source : MNHN, Paris

Source : MNHN, Paris

A. ABATUCCI C. 4
ABATUCCI S. 3 - 4
ABONNENC E. 438 - 773 - 774
ACHARD F. 799
ADAM J.P. 191 - 484
AHRARY F.A. 863 - 864
AIN G. 5 à 8 - 384 - 386 - 387 - 610 - 726 - 727 - 729 à 731
AIRIEAU L. 9
AITKEN T.H.G. 10
ALANDRY G. 998
ALEXANDRE E. 458
ALINAT A. 11
ALLAIN G. 12
ALLUAUD C. 13
AMBIT D. 14 à 16
AMBROISE-THOMAS P. 17
AMOREUX P.J. 18
AMOURIQ L. 19
ANDARELLI L. 1087 à 1091
ANDRIEU J. 20
ANGLADE F. 1170
Anonyme 1 - 2
ANSELME-MARTIN G. 794
ANTONETTI M. 21 - 485
ANTONI P. 98
ANTONIOTTI J.P. 22
ARLO 583
ARMENGAUD M. 30 - 200
ARNAUD D. 239 - 240
ARNAUD J.D. 23
ARNOLD M. 800 - 801
ARRIGHI M.F. 24
ASTROS L. d' 25
ATGER E. 26
ATTISSO M. 444 - 448
AUBERT P. 27
AUBERTOT M. 28
AUDIBERT Y. 1036 à 1039
AUDIBERT-CAILLE DU BOURGET 29
AUVERGNAT J.C. 30

B. BABAULT G. 31
BABINOT M. 32
BAIN O. 33 - 287
BALARD G. 34
BARRABES A. 123
BASTOS P. 523
BASTOS R. 35
BATTESTI F. 36
BAUDE J.E. 37
BAUDIERE A. 38 - 39
BAUDOUIN M. 40
BEAUCHAMP P.de 41
BEAUCOURNU J.C. 42
BELMONTE A. 43 - 422 - 823 - 825 - 826

Source : MNHN, Paris

BELS J.	44
BENECH J.	45
BEN OSMAN F.	825
BENTATA-PESSAYRE M.	46
BERGER A.	47
BERNARD A.	48 - 49
BERNARD L.	191
BERNER L	50 - 51
BERTHEZ G.	52
BERTHEZ M.	53
BEYTOUT D.	438 - 663 - 705
BIGOT M.J.	54
BIGUET J.	236 - 288
BIHAN-FAOU P.	657
BIZARD	55 - 56
BLANCHARD C.	57
BLANCHARD E.	58
BLANCHARD R.	59 à 65
BLATGER J.	66 - 67
BLOCH S.	876
BOESIGER B.	68 - 69
BOESIGER E.	427
BOISSEZON P. de	70 à 83 - 402
BONDET	84
BONNARD	613
BONNIN H.	85
BORDES S.	86
BOU C.	87
BOUCHET C.	88
BOUDON P.	377 - 378
BOUISSET L.	89 - 90
BOUISSOU	91
BOUREE P.	92
BOURGEADE A.	738
BOYER J.	93
BOYER M.	94
BREGOU M.	95
BRELET G.	96
BRENGUES J.	661
BRES A.	814
BRESSLAU E.	97
BRIDE M.	98
BROLEMANN H.W.	99 à 102
BRONDEL F.	103 - 429
BROUSSAL J.	401
BRUAIRE M.	187 - 596
BRULE M.	104
BRUMPT E.	105 à 115
BRUMPT L.C.	116 à 119 - 780
BRUN A.	120
BRUNET F.H.	121
BUFFARD B.	122 - 123
BURDIN E.	124

Source : MNHN, Paris

C. CABES J.L. 125 - 680
CAILLE E. 126
CALLARD P. 46
CALLOT J. 127 à 174 - 261 - 501 - 537 - 826
CAMAIN R. 191 - 484
CAMBEFORT Y. 175 à 179
CAMPINCHI S. 180
CARNOT P. 181
CARRERE L. 182
CARRIEU 183 à 185
CASABIANCA D.P. 186
CASALTA 188
CASSAIGNE R. 187 - 596
CASTEL P. 445
CATANEI A. 189 - 190 - 1103
CAVAILLON A. 191 - 630
CAZAL P. 192
CAZENEUVE H.J. 193
CHALLAN DE BELVAL 194
CHAMPEAU A. 47
CHARMOT G. 835
CHASSAING J. 1118
CHASSIGNEUX 631
CHATENOUD P. 195
CHATIN J. 196 - 197
CHAUDONNERET J. 198 - 199
CHAUVAGNAT J.C. 200
CHAVANNE D. 201
CHENE 399 - 400
CHIPPAUX A. 202 - 339 - 496 - 662 - 663
CHOPARD P. 203
CHURLAUD J. 204
CLAISSE R. 449
CLASTRIER J. 1092 à 1094
CLAUDE J. 205
CLEMENT J. 206
CLEMENT R. 207
CLERC A. 208
COLAS-BELCOUR J. 209 - 210 - 938 à 951 - 975 - 976 - 978 à 981 - 983
COLOIGNER M. 211
COLUZZI M. 212
CONAT M . 1046
CONTE A. 213
CORDIER E. 214 - 736 - 737
CORDOLIANI S. 1040
CORNIOU B. 436 - 439 - 663
COURNUAUD M. de 618
CORRE J.J. 819 - 820 - 822
CORRE L. 93
COSTA DE BASTELICA 215
COUDERT J. 366
COULAUD J.P. 724 - 732
COULON G. 216 à 218
COUPAYE E.L. 220

Source : MNHN, Paris

	COURMONT J.	221
	COUSSERANS J.	222 à 235 - 239 - 350 - 525 - 526 - 730 - 824 - 825 - 997 - 1159
	COUTELEN F.	236 - 288 - 359
	COZ J.	403 - 433
	CRAMPON P.	237
	CRASTE	238
	CRESPO O.	1159 - 1160
	CRISTAU P.	998
	CROIZIER G.	451
	CROSET H.	23 - 239 - 240 - 350 - 401 - 707 - 708 - 815 à 825 - 1184
	CROSNIER H.	241
	CROSNIER R.	242 - 243
	CURTIS C.F.	244 - 245
D.	DAINVILLE F.	246
	DALIBON L.	38 - 39 - 247 à 250
	DALLOT J.Y.	251 - 371
	DALY J.P.	998
	DANIS M.	370 - 371
	DANO L.	252
	DANTAGNAN A.	14 à 16
	DAO VAN TY	115 - 160 à 163 - 538
	DASSONVILLE C.	253
	DASSONVILLE G.	253
	DAURIOS J.M.J.J.	254
	DAVID A.	255
	DAVID F.	280 - 281
	DEBOVE M.	256
	DEDUIT Y.	257 à 261
	DEGLAIRE D.	262
	DEGUIGNAND L.	693
	DELAMARE P.	263
	DELECOLLE J.C.	164
	DELMONT J.	739
	DELZANT G.	46
	DEMAS M.	658
	DENIAUD J.	264
	DEPIEDS R.	265 - 777
	DEPIERRIS P.	393
	DEROT M.	780
	DERUAZ D.	749
	DESBANS A.	266
	DESMIER L.	267
	DESOIL P.	268 - 269
	DESPUJOLS B.P.	270
	DIBLE J.H.	271
	DIEMER J.	272
	DOBY J.M.	236 - 273 à 281
	DOBY-DUBOIS M.	275
	DOLL J.	20
	DOLLFUS R.P.	282
	DONATIEN A.	1101 - 1102
	DOPTER	283
	DORGELO J.	284 - 285
	DORGELOT Y.	386
	DOUCET M.M.	286 - 287

Source : MNHN, Paris

	DOUMER L.	288
	DOVILLE J.	289
	DROUET L.	411
	DUBOIS P.	658
	DUBOS M.	618
	DUBOSC O.	584
	DUCHATELIER B.	664
	DUFOUGERE W.	290
	DUMARCHEY G.	873 - 874
	DUMOUCHEL P.	377
	DUONG T.H.	122 - 123 - 201
	DUPERIE	293
	DUPERIE R.	291 - 292
	DUPUCH M.H.	294
	DUPURT	1200
	DUROSOIR J.L.	998
	DUROZOY	295
	DURUY	723
	DUTHOIT J.L.	451
	DYE L.	296 - 297
E.	ECKSTEIN F.	298 à 305
	EDWARDS F.W.	306 - 307
	ELOUARD J.M.	403
	EMILE-WEIL P.	308
	Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral Méditerranéen	309 - 310
	EOUZAN J.P.	437
	ESCANDE F.	1131 à 1133
	ESSIOUX H.	998
	ETIENNE G.	311 à 315
F.	FABIANI G.	1118
	FABRE J.	485
	FABREGAS-REAL M.	316
	FARABEUF	317
	FARRERAS E.	318
	FARROY G.	1193
	FAUCHEUX M.J.	319 à 322
	FAYOLLE J.	323
	FELICIANGELI D.	212
	FELIX H.	371
	FERE C.	324
	FERRABOUC L.	325
	FERRAND G.	596 - 744
	FERTON C.	326
	FERVAL E.	327
	FEYTAUD J.	328 à 332 - 1206
	FONTAN A.	333 - 334
	FOOT M.	1095
	FORGE P.	335
	FOUGERAT	336
	FOURCROY A.F.	337
	FOURNIALS M.J.V.A.	338
	FRAISSIGNES B.	339
	FRANCHINI G.	340
	FRANCOIS J.	341

Source : MNHN, Paris

	FRANCOIS J.	342
	FREREBEAU L.G.	343
	FROMENT J.	344
G.	GABINAUD A.	47 - 230 à 232 - 235 - 239 - 240 - 345 à 350 - 721 - 730 - 818 - 823 à 825 - 1158
	GALLAIS G.	351 - 352
	GALLIARD H.	353 à 363 - 519
	GLATIER M.	364
	GARDON J.D.	20
	GARIN C.	365 - 366
	GARIN Y.	411
	GASCHEN H.	367 - 952 à 954 - 975
	GAVEN B.	1161
	GAYTE M.J.	368 - 369
	GEISS J.L.	174
	GENDRE E.	329 à 332
	GENIN	723 - 1200
	GENTILINI M.	370 - 371
	GEORGHIOU G.P.	372 - 713 - 714 - 722
	GERBEAUX J.	207
	GHELELOVITCH S.	373 à 375 - 955 à 957 - 983
	GHOGOMU TAMOUH R.	376
	GIACOMINI T.	119 - 377 - 378
	GILLET J.F.	379
	GILOT B.	8 - 380 à 392 - 610 - 726 - 727 - 729 à 731 - 767
	GINESTOUS E.	393
	GIREL J.	392 - 767
	GLASER F.	394
	GLAUD Y.	395
	GOIRAN P.	396
	GOLDSCHMIDT D.	397
	GOLVAN Y.J.	398
	GOUDAL H.	377 - 378
	GOUGET	399 - 400
	GRANDIDIER G.	678
	GRAS G.	401 - 816 - 819 - 822
	GRASSE P.	402
	GRENIER P.	958
	GRJEBINE A.	403 - 433
	GROS H.	404
	GROUSSIN P.	201
	GRUFFAZ R.	285 - 385 - 387 - 388 - 728
	GRYSEZ V.	783
	GUIART J.	405 à 407
	GUICHARD M.	408
	GUIGUEN C.	276
	GUILLAUME A.	409 - 410
	GUILLAUSSEAU P.J.	411
	GUILLE G.	225 à 227 - 232 - 234 - 412 à 416 - 525 - 526
	GUILLOTEAU J.	417
	GUILVARD E.	23 - 47 - 240 - 418 à 424 - 648 - 719 - 720
	GUY Y.	425 à 429 - 997 - 1171
H.	HACKETT L.W.	430
	HAMEL A.	431

Source : MNHN, Paris

	HAMON J.	432 - 433 - 486
	HANNOUN C.	434 à 439 - 495 - 663 - 705 - 836
	HARANT H.	440 à 448
	HARVIER P.	449
	HASAN S.	450 à 452
	HAUSWALD	171
	HAYET M.	658
	HEDEEN R.A.	453 à 456
	HEIM G.	47
	HELLUY J.R.	457
	HENNINOT E.	458
	HENRI G.	459
	HENRY C.	460
	HESSE E.	461 à 464
	HIDROT D.	465
	HIRTZEL C.	174
	HORN S.	466
	HOSSELET C.	467 à 475
	HUMPHRYS H.E.	789
I.	IBRAHIM O.F.	476 - 681
	ISEKI A.	722
	IZARD M.	477
J.	JACOTOT H.	478 à 480
	JARRY D.	447 - 810
	JARRY D.M.	481
	JARRY D.T.	481
	JAUJOU C.	191 - 482 à 486
	JEANSELME E.	487
	JOBLOT	488
	JOFFRE F.	489
	JOUBERT L.	383 - 388 à 391 - 438 - 490 à 496 - 698
	JOURDAIN S.	497
	JOYEUX C.	498 - 499
	JULLIEN J.L.	1160 - 1161
	JUMINER B.	816
K.	KEMPF	171
	KERDREL A. de	590
	KIENER A.	1047
	KLEIN J.M.	433 - 500
	KREMER M.	165 à 167 - 172 à 174 - 501
	KRIVITZKY A.	46
	KUHL G.	452
	KULA H.	502
	KUNLIN H.	503
L.	LACARRIERE	504
	LACOUR P.	505
	LAGRIFFOUL A.	185 - 506 - 507 - 630
	LAHSINAT K.	658
	LALESQUE J.	508
	LAMBERT M.	826
	LANGERON M.	509 à 519
	LANZALAVI P.	520 - 689
	LANZENBERG A.	521

Source : MNHN, Paris

LAPEYSONNIE L. 522
LAPREVOTE-HEULLY M.C. 523
LARCAN A. 523
LARIVIERE M. 411
LARROQUE P. 998
LARROUSSE F. 524
LARROUY G. 67 - 179 - 426 - 1134 à 1139 - 1170 à 1172
LAUGA J. 681
LAUMOND C. 287 - 663
LAVEN H. 525 - 526
LAVERAN A. 527 à 535
LAVIER G. 536 à 538
LEACH W.E. 539
LE BIHAN G. 211
LECAILLON A. 540 à 542
LEDANTEC 543
LE GAC A. 211
LEGENDRE J. 544 à 576
LEGENDRE L. 577 - 578
LEGER L. 579 à 590
LEGER M. 591 à 594 - 959
LEGER N. 187 - 595 - 596 - 744
LEMOINE G. 597
LEPINE J. 598
LEPINE P. 982
LEPROUX P.H. 85 - 599
LERMOYEZ J. 104
LESIEUR 600
LETELLIER F. 601
LEVAVASSEUR G. 1044 - 1223
LLORY J. 813
LONJARET R. 602
LORRIAUX A. 288
LOUBRIEU G. 603 - 702 - 703
LOUMAGNE C. 604
LUBETSKI J. 411
LUMARET R. 428
LUONG DINH GIAP G. 605
M. MACQUART J. 606
MAIGRE P. 607
MAIRE A. 608 à 610
MAISTRE O. 802
MALBEC D. 411
MALEVILLE J.A. 611
MALLOIZEL 613
MALLOIZEL M. 612
MALRIEU-JOFFRE F. 614
MANDOUL H. 615 à 617
MANDOUL M. 618
MANIER J.F. 421 - 1198 - 1199
MARCHALANT L. 619
MARCHOUX E. 620 à 625
MARCOU H. 626
MARGUET S. 1210
MARJOLET M. 395 - 627 à 629

Source : MNHN, Paris

	MARTIAL	630
	MARTIN C.	333 - 334
	MARTIN R.	631
	MARTINE J.	632
	MARZOCCHI J.B.	633
	MAS J.P.	39 - 231 - 248 - 250 - 417 - 634 à 638
	MAS P.	794
	MASSE J.P.	664
	MASSIP P.	30 - 200
	MASSOT E.	639
	MATHIS M.	640 à 644 - 981
	MATILE L.	42
	MATTEI M.C.	645
	MAY E.	104
	MAZEL P.	344
	McGILL C.M.	776
	McROUGHT	646
	MECHALI D.	724
	MENARD M.F.	395
	MERIAUDEAU R.	731
	MERLE F.	243
	MERLEN J.	288
	MERY A.	647 - 648
	METGE G.	649 à 651
	MEUNIER F.	652 - 653
	MEYER A.	410
	MEZGER J.	960 à 962
	MIARA M.	654 - 655
	MICHEL L.	486
	MICHEL R.	433 - 500 - 779
	MIR MOAYEDI A.N.	656
	MISSIROLI A.	430
	MOIGNOUX J.B.	777
	MONCADA E.	385
	MOREAU J.P.	657
	MOREL P.	865
	MORETTI G.F.	85
	MORIN C.	658
	MOSNY	659
	MOUCHET J.	202 - 339 - 403 - 437 - 438 - 495 - 496 - 660 à 663 - 705 - 772 à 774
	MOULIES A.	333 - 334
	MOULINIER C.	618 - 664
	MOURIQUAND G.	585 à 590
	MOUSSIEGT O.	665 à 669
	MUNERA M.	670
	MUSELLI P.	671
N.	NADJAH S.	672
	NEBBIA F.	673
	NETIEN G.	866
	NEUBURGER M.C.	8 - 729 - 731
	NEVEU-LEMAIRE M.	674 à 679
	NGUYEN T.X.	680 - 681
	NICLOT V.	682 - 683
	NICOLI J.	684 - 685 - 687 à 689

Source : MNHN, Paris

	NICOLI M.	803 - 804
	NICOLI R.M.	369 - 684 à 689 - 770 - 778
	NOELDNER E.	690
	NOIR J.	691 - 692
O.	OETTINGER W.	693
	OHM P.	694
	OLIVEAU A.	578 - 695
	OLIVIER G.A.	696
	ORTICONI A.	697
	ORTOLI M.F. d'	1041
	OUDAR J.	493 à 496 - 663 - 698
	OZENDA P.	699 - 700
P.	PAGES M.V.	701
	PAISSEAU G.	702 - 703
	PANNETON B.	704
	PANTHIER R.	436 - 437 - 439 - 705
	PAPIEROK B.	239 - 706 à 708 - 823
	PAPPAS J.	445
	PARIS P.	709
	PARROT L.	1101 - 1102
	PASCAL L.	710
	PASTEUR N.	47 - 245 - 372 - 648 - 711 à 722
	PASTEUR VALERY-RADOT	723
	PASTICIER A.	724
	PASTUREAU	293
	PAUTOU G.	5 - 7 - 8 - 285 - 384 à 389 - 610 - 700 - 725 à 731
	PAUTRIZEL R.	1147
	PAYET M.	724 - 732
	PAYRE H.	733
	PECH J.	805 à 807 - 812 à 814
	PECH-PERIERES J.	421 - 719 - 720
	PEJU	295
	PEJU G.	734 à 737
	PENE P.	738 - 739
	PERDRIEL G.F.J.	740
	PERIERES J.	826
	PERRIER	741
	PERRIER R.	742
	PERRIN	91 - 743
	PESSON B.	744
	PESSON R.	595 - 596
	PETIT G.	745 - 746
	PETITHORY J.C.	119 - 377
	PICARD	185
	PICARD F.	506 - 507
	PICHERAL H.	747
	PICHOT J.	748 - 749 - 867 à 872
	PIERANGELI H.	750
	PIERMONT L.	388 - 751
	PIERRET R.	752
	PIET P.	753
	PIPONNIER M.	754
	PITON L.	755
	PITTI-FERANDI F.	756 - 757

Source : MNHN, Paris

PLICHET 308
PLICQUE A.F. 758
PLOMB C.M.L. 759
POINSOT-BALAGUER N. 47
POLAILLON H. 760
PORRY 761
POUCHET F.A. 762
PRINGAULT E. 763 à 765 - 1201
PUECH M. 390 à 392 - 766 - 767

Q. QUERMEL J.M. 1158
QUILICI M. 17 - 265 - 686 à 689 - 768 à 770 - 778 - 1042 - 1043
QUILLIOT 771

R. RAABE M. 420
RAGEAU J. 202 - 403 - 660 à 663 - 772 à 774
RAMBAUD J.P. 775
RANKIN A.C. 776
RANQUE J. 265 - 689 - 777 - 778 - 1044
RANQUE P. 17 - 265 - 778
RATHERY F. 779 - 780
RATIGNIER A. 173
RAULT B. 277 à 281
RAVAUT P. 781
RAYMOND V. 782 - 783
RAZAKANDISA R.N. 1047
REAUMUR R. de 784
REGGI M. de 424
REGNAULT F. 785 à 788
REHEL H. 1209 - 1210
REID J.M.H. 789
REMMERT H. 432 - 694 - 790 - 791
RENARD J.P. 201
RENNES C. 377
RIBRIOUX R. 411
RICHARD-LENOBLE D. 371
RICHE F. 792
RIEUX M. 793
RIMBAUD L. 794
RINAUDO 875
RIOUX J.A. 23 - 47 - 168 - 239 - 350 - 401 - 420 à 424 - 440 à 444 - 446 à 448 - 687 - 688 - 707 - 708 - 719 - 720 - 778 - 795 à 826 - 1146 1162 - 1184 - 1199
RISS 6
RIST 827
RIVET L. 828
ROBERT J. 829
ROBINEAU-DESVOIDY J.B. 830
ROBLIN 831
ROCHAIX A. 832
ROCHE L. 833
ROCHEDIEU J.V. 834
ROCHEDIEU-ASSENMACKER V. 169
RODHAIN F. 835 à 837
ROGER H. 838
ROKECKA 600

Source : MNHN, Paris

ROLLAND 827
ROMAN E. 366 - 839 à 875 - 1212 à 1214
ROSENTHAL G. 876
ROSSET J.P. 390 - 391
ROUBAUD E. 877 à 983
ROUCHE 984
ROUESSE 631
ROUSSEAU L. 1164
ROUSSEAU P. 985
ROUX G. 986 - 987
ROUX J. 808
ROUZAUD C. 232 - 988
ROYER M. 989 à 991
ROZE J.M. 837
RUFFIE J. 89 - 90 - 448 - 809 à 812 - 992 - 993 - 1140 à 1143 - 1146

S. SACCA G. 212
SACQUEPEE E.E.J. 994
SAIMOT G. 724 - 732
SAINTON P. 995
SALANQUE-IPIN 996
SALGADO J. 1162
SALIERES A. 228 - 233 - 234 - 427 - 428 - 997
SALIOU P. 998
SANSARRICQ H. 999 - 1147
SAPIN-JALOUSTRE H. 1000
SARDOU R. 1001 - 1144 - 1145
SARRAND P. 1002
SASPORTAS L. 1003
SATGE P. 207
SAUTET J. 216 à 218 - 360 à 363 - 499 - 757 - 1004 à 1044 - 1203 - 1219 - 1220
SAUTTER V. 982
SCHACHTER D. 745 - 1045 à 1047
SCHNEIDER 1048
SCHNURMANN D. 46
SCHUMANN W. 1049 - 1050
SEGUI V. 1051
SEGUY E. 1052 à 1082
SEIDMAN M. 1083
SENEVET G. 1084 à 1094
SERGENT Ed. 1095 à 1103
SERGENT Et. 1096 à 1118
SERRA-TOSIO B. 1119
SERVAJEAN F. 1120
SEVIN A. 1169
SICART M. 89 - 90 - 811 - 1121 à 1146
SIGALAS R. 508 - 1147
SIGUIER F. 780
SIMEON 184
SIMON L.M. 1148
SIMONNEAU J. 1151
SIMONNEAU P. 14 à 16 - 38 - 39 - 229 à 231 - 249 - 250 - 348 - 637 - 638 - 730 819 - 820 - 822 - 1149 à 1151
SINEGRE G. 230 - 232 - 235 - 349 - 657 - 715 à 717 - 721 - 815 - 817 - 818 825 - 1152 à 1162

Source : MNHN, Paris

	SOLLIER N.	1163
	SOREL F.	1164
	STEPHANOPOULOS G.J.	979
	STILLMUNKES	1165
	STO RDEUR E. de	718 - 1166 - 1167
	SUBRA R.	661
	SUQUET P.	821
	SURCOUF J.	1168
	SUZZONI J.P.	1172
	SUZZONI-BLATGER J.	429 - 997 - 1169 à 1172
T.	TABUSSE L.	243
	TANGUY Y.	1173
	TANON L.	1174
	TAPIE J.	1176
	TESSON G.	816
	TESSON R.	233 - 429
	TETART J.	8
	THEODORIDES J.	398
	THIRY	399 - 400
	THOMAS A.	1177
	THOMAS J.	8 - 731
	THUREL F.	1178
	TIMBAL J.	595 - 596
	TIMON-DAVID J.	1179 - 1180
	TISSET J.P.	1181
	TOUMANOFF C.	478 à 480 - 483 - 963 à 966 - 977 - 978 - 1182
	TOUR S.	401 - 821 - 1183 - 1184
	TOURNAIRE P.	746
	TOUSSAINT A.	1185
	TRAN TRUNG SON	1186
	TREG UER H.	211
	TREILLARD M.	967 à 974 - 976 à 978 - 980 - 982 - 1187 à 1192
	TREMOLIERES F.	1193
	TRENSZ F.	1116 - 1117 - 1194 à 1197
	TRINQUIER E.	191
	TUZET O.	1198 - 1199
U.	UZAC S.	446
V.	VAGO C.	450 à 452
	VALLEE A.	478 à 480
	VALLERY-RADOT P.	1200
	VANDAMME R.	596 - 744
	VANEY C.	213
	VAN GAVER F.	1201
	VAN THIEL P.	1202 à 1204
	VERDIER J.M.	47 - 423 - 720 - 1205
	VERDUN P.	1206
	VERGEAU B.	998
	VERGER P.	333 - 334
	VERMEIL C.	170 - 172 - 501 - 1207 à 1210
	VERNIER M.	1211
	VIGNE P.	1212 à 1214
	VIGNY F.	7 - 384 - 728
	VIGO G.	1158 - 1159 - 1215

Source : MNHN, Paris

	VILLENEUVE J.	1216 - 1217
	VILLON P.	1218
	VIOLET P.	873 à 875
	VIOLLE H.	1219 - 1220
	VIRAT B.	478 à 480
	VIVIER A.	658
	VOELCKEL C.	14 à 16 - 1221
	VOIRIN M.	1222
	VOYDEVILLE G.	523
	VUILLET J.	1044 - 1223
W.	WARNET A.	411
	WEBER R.	1224
	WEURMAN C.	1204
	WURST R.	1225
	WURTZ R.	1226
Z.	ZEGHERS A.	49
	ZEMBOULIS E.	679
	ZIEGLER H.	366
	ZUCCARELLI	1227 - 1228

BIBL. DU MUSEUM PARIS

Source : MNHN, Paris

ANNEXE CARTOGRAPHIQUE

Remarques: les espèces du complexe *Anopheles maculipennis* ont fait l'objet d'une carte unique.

les cartes ont été réalisées par le Secrétariat de la Faune et de la Flore ; fond de carte J.L. Dommanget -INRA.

BIBLIOTHEQUE MUSEUM PARIS

Source : MNHN, Paris

Source : MNHN, Paris



Aedes (Ochlerotatus) annulipes (Meigen, 1830)



Aedes (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771)



Aedes (Ochlerotatus) berlandi Séguy, 1921

Aedes (Ochlerotatus) cataphylla Dyar, 1916



Aedes (Ochlerotatus) cantans (Meigen, 1818)



Aedes (Aedes) cinereus Meigen, 1818

Source : MNHN, Paris



Aedes (Ochlerotatus) communis (De Geer, 1776)



Aedes (Ochlerotatus) dorsalis (Meigen, 1830)



Aedes (Ochlerotatus) detritus (Haliday, 1833)



Aedes (Finlaya) echinus (Edwards, 1920)

Aedes (Ochlerotatus) dianteus Howard, Dyar et Knab, 1912

Aedes (Ochlerotatus) excrucians (Walker, 1856)

Source : MNHN, Paris



Aedes (Ochlerotatus) flavescens (Müller, 1764)



Aedes (Ochlerotatus) mariae (Sergent et Sergent, 19

Aedes (Aedes) geminus Peus, 1970



Aedes (Ochlerotatus) nigrinus (Eckstein, 1918)



Aedes (Finlaya) geniculatus (Olivier, 1791)



Aedes (Ochlerotatus) pulchritarsis (Rondani, 1872)

Source : MNHN, Paris

Aedes (Ochlerotatus) pullatus (Coquillet, 1904)



Aedes (Rusticoidus) rusticus (Rossi, 1790)



Aedes (Ochlerotatus) punctor (Kirby, 1837)



Aedes (Rusticoidus) sticticus (Meigen, 1838)

Aedes (Rusticoidus) refiki Medschid, 1928



Aedes (Rusticoidus) surcoufi (Théobald, 1912)

Source : MNHN, Paris



Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830)



Anopheles (Anopheles) claviger (Meigen, 1804)

Aedes (Aedimorphus) vittatus (Bigot, 1861)



Anopheles (Anopheles) hyrcanus (Pallas, 1771)



Anopheles (Anopheles) algeriensis Theobald, 1903

Anopheles (Anopheles) maculipennis Meigen, 1818

Source : MNHN, Paris

Anopheles (Anopheles) marteri Senevet et Prunelle, 1927



Coquillettidia (Coquillettidia) buxtoni (Edwards, 1923)



Anopheles (Anopheles) plumbeus Stephens, 1828



Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii (Ficalbi, 1889)

Anopheles (Cellia) superpictus Grassi, 1899



Culex (Culex) brumpti Galliard, 1931

Source : MNHN, Paris



Culex (Maillotia) hortensis Ficalbi, 1889

Culex (Neoculex) martinii Medschid, 1930

Culex (Neoculex) impudicus Ficalbi, 1890



Culex (Culex) mimeticus Noë, 1899



Culex (Culex) laticinctus Edwards, 1913



Culex (Barraudius) modestus Ficalbi, 1889

Source : MNHN, Paris



Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 1758



Culex (Culex) torrentium Martini, 1925



Culex (Neoculex) territans Walker, 1856



Culex (Culex) univittatus Theobald, 1901



Culex (Culex) theileri Theobald, 1903

Culiseta (Culiseta) alaskaensis (Ludlow, 1906)

Source : MNHN, Paris



Culiseta (Culiseta) annulata (Schranck, 1776)



Culiseta (Culicella) litorea (Shute, 1928)



Culiseta (Culicella) fumipennis (Stephens, 1825)



Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata (Macquart, 1

Culiseta (Culiseta) glaphyroptera (Schiner, 1864)



Culiseta (Culicella) morsitans (Theobald, 1901)

Source : MNHN, Paris



Culiseta (Culiseta) subochrea (Edwards, 1921)



Orthopodomyia pulchripalpis (Rondani, 1872)



Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata Edwards, 1913

MUSEUM PARIS

Source : MNHN, Paris

Source : MNHN, Paris

Source : MNHN, Paris

Source : MNHN, Paris

Source : MNHN, Paris